比率型亚硫酸氢根荧光探针的构建及其生物成像研究

张伟杰¹, 刘涛¹, 霍方俊², 宁鹏³, 温莹¹, 孟祥明³, 阴彩霞^{1*}

1. 生物化学和分子工程教育部重点实验室, 山西省能源材料转储重点实验室, 山西大学分子科学研究所, 太原 030006

2. 山西大学应用化学研究所, 太原 030006

3. 安徽大学化学化工学院, 合肥 230601

*通讯作者, E-mail: yincx@sxu.edu.cn

收稿日期: 2017-03-21; 接受日期: 2017-05-02; 网络版发表日期: 2017-07-18

国家自然科学基金(编号: 21672131)和山西省人才支持计划(编号: 2014401)资助项目

摘要 本文基于萘并吡喃-吡啶盐共轭体系设计合成了能够检测亚硫酸氢根(HSO_3^-)的新型近红外比率型荧光探针. 该探针对 HSO_3^- 识别显示出优异的选择性、较高的灵敏度和超快速的荧光响应. 加入 HSO_3^- 后, 探针展现出21.6倍(I_{520}/I_{653})的相对荧光强度的增强, 并伴随着溶液颜色由紫色转变为无色. 此外, 高分辨率质谱和核磁氢谱滴定共同证实了该探针对 HSO_3^- 的检测机制是 HSO_3^- 与探针的不饱和碳碳双键发生了亲核加成反应. 最后, 探针被成功地应用于活细胞和斑马鱼幼体中 HSO_3^- 的原位示踪.

关键词 近红外, 比率型, 亚硫酸氢根, 荧光探针, 生物成像

1 引言

作为主要的大气污染物之一, 二氧化硫(SO_2)极易溶于水并转变成亚硫酸盐和亚硫酸氢盐(HSO_3^-), 对人体健康和生态环境造成严重影响^[1-7]. 同时, 亚硫酸氢钠广泛应用于食品添加剂, 由于其潜在的细胞毒性, 因此对其添加量的控制必须要有严格的要求. 美国食品药品监督管理局已经明确规定, 食品标签上应注明 HSO_3^- 的含量, 且其含量不得超过 $10 \mu\text{g}/\text{mL}$ ^[8-11]. 因此, 开发有效的方法用于监测 HSO_3^- 具有极为重要的意义. 荧光探针由于兼具高灵敏度、实时监测和操作简便等优点, 在环境和生物系统中检测待分析物时具有明显的优势^[12,13]. 已有很多能够专一性识别 HSO_3^- 的探针被设计并开发, 其中还包括一些可以靶向定位

的^[14-16]和可逆的^[17]探针. 然而, 这些探针中绝大多数都是属于荧光增强型(turn-on). 而与这种单一发射波长变化的探针相比, 比率型荧光探针由于具有双波长发射特征、受环境因素影响小、响应范围宽、准确度高且可以实现半定量分析等特性^[18-22], 而受到广泛关注. 目前识别 HSO_3^- 的比率型荧光探针比较少. 在本文中, 基于半花菁染料开发设计了具有较高选择性和灵敏度, 能够用于专一性检测溶液、细胞及活体中 HSO_3^- 的比率型荧光探针**1** (图1).

2 实验部分

所有实验药品除非特别说明, 均购自阿拉丁试剂公司(美国), 各种分析物包括 Na_2SO_3 和 NaHSO_3 购自上

引用格式: 张伟杰, 刘涛, 霍方俊, 宁鹏, 温莹, 孟祥明, 阴彩霞. 比率型亚硫酸氢根荧光探针的构建及其生物成像研究. 中国科学: 化学, 2017, 47: 1022-1028
Zhang W, Liu T, Huo F, Ning P, Wen Y, Meng X, Yin C. A ratiometric fluorescent probe for sensing bisulphate and its application in living cells and zebrafish. *Sci Sin Chim*, 2017, 47: 1022-1028, doi: 10.1360/N032017-00057

图1 探针1的合成路线

海实验试剂有限公司(中国). 所有检测实验均在室温(25℃), 二甲基亚砜-磷酸盐缓冲溶液(DMSO-PBS) (10.0 mM, pH 7.4, 1:1, v/v)中进行.

U-3900型紫外-可见分光光度计(Hitachi公司, 日本), F-7000型荧光光谱仪(Hitachi公司), Bruker AVANCE-600 MHz超导核磁共振波谱仪(德国), AB SCIEX Triple TOF 5600plus高分辨飞行时间质谱仪(美国), PO-120石英比色皿(上海华美实验仪器厂, 中国), GL-9406型手提式紫外分析仪(郑州明天仪器有限公司, 中国), 梅特勒-托利多pH计(梅特勒, 瑞士), Olympus FV1200激光共聚焦扫描显微镜(日本).

3 结果与讨论

3.1 探针1的合成与表征

探针1的合成(图1). 取化合物2 (0.105 g, 0.5 mmol)和1,2,3,3-四甲基-3H-吡啶鎓碘化物(0.21 g, 0.7 mmol)溶于10 mL 无水乙醇中, 加入催化剂哌啶30 μ L. 78℃搅拌回流12 h, 然后冷却至室温, 过滤并用冰乙醇洗涤得墨绿色固体, 真空干燥. 产量为0.202 g, 产率为82%. 核磁共振氢谱(^1H NMR) (600 MHz, DMSO) δ 8.64 (s, 1H), 8.32 (d, $J=16.1$ Hz, 1H), 8.23 (d, $J=8.5$ Hz, 1H), 8.02 (d, $J=8.9$ Hz, 1H), 7.95 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.91~7.84 (m, 2H), 7.69 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.65~7.58 (m, 2H), 7.51 (t, $J=7.5$ Hz, 1H), 7.25 (d, $J=8.9$ Hz, 1H), 6.97 (d, $J=16.2$ Hz, 1H), 5.43 (s, 2H), 4.09 (s, 3H), 1.81 (s, 6H). 核磁共振碳谱(^{13}C NMR) (151 MHz, DMSO) δ 180.10 (s), 154.73 (s), 149.52 (s), 142.79 (s), 141.30 (s), 135.50 (s), 133.71 (s), 129.62 (s), 128.49 (s), 127.99 (s), 127.63 (s), 124.30 (s), 122.24 (s), 120.94 (s), 116.86 (s), 114.90 (s), 114.30 (s), 110.74 (s), 63.45 (s), 51.17 (s), 33.51 (s), 24.86 (s). ESI-MS: m/z Calcd 366.1862, Found 366.1858.

化合物2的合成. 将丙烯醛(0.5 mL, 7.5 mmol)和

2-羟基-1-萘甲醛(0.516 g, 3.0 mmol)溶解在含有碳酸钾(1.035 g, 7.5 mmol)的1,4-二氧六环溶液中. 将混合物在105℃加热反应72 h. 反应完成后, 冷却至室温, 倒入冰水中搅拌30 min. 混合物用乙酸乙酯萃取3次. 合并有机层并用饱和氯化钠洗涤两次, 然后用无水硫酸钠干燥, 减压旋转蒸发除去溶剂, 所得粗产物经硅胶柱色谱分离纯化, 洗脱剂为乙酸乙酯和石油醚(v/v, 1:5)混合液, 得到浅黄色固体2, 质量为0.126 g, 产率为20%. ^1H NMR (600 MHz, DMSO) δ 9.72 (s, 1H), 8.46 (s, 1H), 8.24 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 8.00 (d, $J=8.9$ Hz, 1H), 7.92 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.65 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.48 (t, $J=7.5$ Hz, 1H), 7.19 (d, $J=8.9$ Hz, 1H), 5.06 (s, 2H). ^{13}C NMR (151 MHz, DMSO) δ 190.9 (s), 155.4 (s), 138.4 (s), 134.5 (s), 130.8 (s), 129.9 (s), 129.5 (s), 129.2 (s), 128.6 (s), 125.1 (s), 122.1 (s), 117.9 (s), 114.4 (s), 63.0 (s). ESI-MS: m/z Calcd 211.0754, Found 211.0755.

3.2 光谱性能研究

3.2.1 探针1对 HSO_3^- 的紫外、荧光光谱滴定研究

首先, 测试了探针1的紫外吸收和荧光发射光谱. 图2(a)显示当将 HSO_3^- 溶液加入到含有探针1 (10 μM)的DMSO:PBS缓冲液(1:1, v/v, pH 7.4)中时, 对应紫外吸收光谱的变化. 随着 HSO_3^- 浓度(0~40 μM)的增加, 探针在520 nm处的吸收峰逐渐减小, 350 nm处的吸收峰逐渐增强, 并且在360 nm处形成了等吸收点. 这表明 HSO_3^- 的加入, 使探针生成了新的化合物. 溶液颜色从红色变为无色, 表明探针1可以实现“裸眼”检测 HSO_3^- .

相应的荧光光谱变化如图2(b)所示, 探针1本身在653 nm处显示近红外荧光发射. 随着 HSO_3^- (0~40 μM)的加入, 探针1在653 nm处的荧光强度逐渐降低, 伴随有520 nm处的荧光强度显著增强, 表明探针的 π 共轭被破坏. 此外, 如图2(c)所示, 520 nm处与653 nm处相对荧光强度的比值(I_{520}/I_{653})与 HSO_3^- 浓度(0~40 μM)呈现

图2 探针1 (10 μM) 随 HSO_3^- (0~40 μM)浓度变化的紫外-可见吸收光谱图(a)和荧光发射光谱图(b); (c) 探针1与 HSO_3^- 作用后相对荧光强度与浓度的线性关系, 激发波长为402 nm, 狭缝: 5 nm/10 nm (网络版彩图)

良好的线性相关($R^2=0.9962$). 利用国际纯粹和应用化学联合会(IUPAC)给出的检出限计算公式 ($\text{CDL}=3S_b/m$)^[23-26]可知, 探针1对 HSO_3^- 的检测限为76 nM. 这明显低于目前已经报道的类似结构的荧光探针^[27-29].

3.2.2 探针1对 HSO_3^- 的选择性识别研究

探针的重要特征是对一种分析物具有特异性识别功能. 为了检测探针1对 HSO_3^- 的特异性识别能力, 考察了在DMSO:PBS (1:1, v/v, pH 7.4)缓冲液中加入 HSO_3^- (40 μM)和其他分析物(400 μM)后荧光强度比值的变化(图3). 我们发现, 在402 nm的激发波长下, 只有 SO_3^{2-} 和 HSO_3^- 的加入引起了明显的相对荧光强度(I_{520}/I_{653})变化, 而其他阴离子没有引起明显的荧光强度比值变化. 该结果证明探针1对 HSO_3^- 具有良好的选择性识别能力.

图3 探针1与各类分析物作用后的相对荧光强度比值(I_{520}/I_{653})变化(网络版彩图)

3.2.3 探针1识别 HSO_3^- 的最适pH研究

我们对探针1在不同pH (2.0~9.0)条件下的识别性

能做了进一步研究(图4). 结果表明, 探针1 (10 μM) 本身的荧光强度比值(I_{520}/I_{653})在pH 2.0~9.0基本保持不变. 在加入 HSO_3^- (40 μM)后, 探针1在pH 5~9范围内的荧光强度比值(I_{520}/I_{653})明显增加. 并且在生理环境(pH 7.4)下具有良好的稳定性和识别效果. 因此, 预测探针1能够在生理条件下完成对 HSO_3^- 的识别检测.

3.2.4 探针1对 HSO_3^- 识别动力学研究

此外, 考察了探针1对 HSO_3^- 的动力学响应过程, 如图5所示, 在400 μM HSO_3^- 存在下, 探针1与 HSO_3^- 的反应在20 s内基本完成, 并且荧光强度在1 min内基本保持稳定, 表明探针1能够快速地对 HSO_3^- 进行检测.

图4 探针1与 HSO_3^- 在不同pH条件下荧光强度比值(I_{520}/I_{653})的变化(网络版彩图)

图5 探针1与 HSO_3^- 作用的动力学研究(网络版彩图)

3.3 探针1对 HSO_3^- 识别机理的研究

为了进一步证实探针1对 HSO_3^- 的响应机理(图6(a)), 选择核磁、质谱等分析手段进行研究. 当在探针储备液($\text{DMSO}-d_6$)中加入 HSO_3^- (D_2O)时, 发现 δ 8.62 (a1)、 δ 5.42 (b1)和 δ 4.09 (e1)处的H质子向高场移动(a2、b2、e2分别在 δ 7.08, δ 3.09和 δ 3.03 ppm). 同时探针1碳碳双键的H质子(c1, 7.26, 7.24和d1, 6.98, 6.95 ppm)也分别转移到5.37, 5.35和5.30, 5.28 ppm, c2, d2 (图6(b)). 此外, 从探针1与 HSO_3^- 反应后的质谱结果可以发现, 质谱中两个主要峰366.18和448.15分别归于 $[\text{M}]^+$ 和 $[\text{M}+\text{HSO}_3^-]^+$ (图6(c)). 由此表明, 探针1对 HSO_3^- 的响应机制是基于图6(a)所示的亲核加成反应.

3.4 细胞成像和斑马鱼成像研究

为了检测探针1的细胞通透性和选择性识别细胞内 HSO_3^- 的能力, 探针1被用于活细胞成像研究. 如图7所示, 将探针1 (10 μM)与人乳腺癌细胞(MCF-7)在37°C下孵育30 min, 此时在红色通道中显示红色荧光, 而绿色通道只有很微弱的荧光信号. 由此表明, 探针1具有良好的细胞通透性. 此外, 在对照实验中, 将 HSO_3^- 与探针1预处理过的MCF-7细胞再温育30 min后, MCF-7细胞显示较强的绿色荧光, 同时红色通道的荧光基本消失. 结果表明, 探针能够检测活细胞中外源性的 HSO_3^- .

为了进一步研究探针1检测活体内 HSO_3^- 的浓度变化, 将探针1进行了活体成像实验. 选用斑马鱼作为实验对象, 如图8所示, 当斑马鱼与探针1 (10 μM)孵育30 min时, 发现红色通道中显示出的明亮红色荧光, 而在绿色通道中基本上没有荧光. 相比之下, 当用探针1预处理过的斑马鱼再与 HSO_3^- 一起孵育30 min后, 之前红色通道中的红色荧光显著的减少, 绿色通道表现出强烈的绿色荧光. 结果表明, 探针1可以用于检测斑马鱼幼体体内的 HSO_3^- .

4 结论

综上所述, 设计并合成了一种新型比率型荧光探针用于识别 HSO_3^- . 该探针具有较好的选择性、较高的灵敏度以及较宽的pH响应范围. 此外, 活细胞成像和斑马鱼幼体成像表明, 探针1具有较好的细胞穿透性, 并且可以用于检测生物体内 HSO_3^- 浓度的变化. 研究结果为设计其他生物分子的检测和成像提供了有益的参考.

图6 (a) 探针1对 HSO_3^- 的荧光响应机理示意图; (b) 探针1与 HSO_3^- 加成产物质谱图; (c) 探针1与 HSO_3^- 加成产物质谱图(网络版彩图)

图 7 激光共聚焦细胞成像. (a1~d1) 探针 1 本身; (a2~d2) 探针 1 加入 HSO_3^- 后. (绿色通道: 激发波长 405 nm, 收集发射信号 520 ± 20 nm. 红色通道: 激发波长 488 nm, 收集发射信号 650 ± 20 nm) (网络版彩图)

图 8 激光共聚焦斑马鱼成像. (a1~d1) 探针 1 本身; (a2~d2) 探针 1 加入 HSO_3^- 后. (绿色通道: 激发波长 405 nm, 收集发射信号 520 ± 20 nm. 红色通道: 激发波长 488 nm, 收集发射信号 650 ± 20 nm) (网络版彩图)

参考文献

- Meng Z, Qin G, Zhang B, Bai J. *Mutagenesis*, 2004, 19: 465–468
- Shi X. *J Inorg Biochem*, 1994, 56: 155–165
- Cardwell TJ, Christophersen MJ. *Anal Chim Acta*, 2000, 416: 105–110
- Ekkad N, Huber CO. *Anal Chim Acta*, 1996, 332: 155–160
- Fatibello-Filho O, da Cruz Vieira I. *Anal Chim Acta*, 1997, 354: 51–57
- Leontiev AV, Rudkevich DM. *J Am Chem Soc*, 2005, 127: 14126–14127
- Papkovsky D, Uskova MA, Ponomarev GV, Korpela T, Kulmala S, Guilbault GG. *Anal Chim Acta*, 1998, 374: 1–9
- Fazio T, Warner CR. *Addit Contam*, 1990, 7: 433–454
- Taylor SL, Higley NA, Bush RK. *Adv Food Res*, 1986, 30: 71–76
- Yilmaz UT, Somer G. *Anal Chim Acta*, 2007, 603: 30–35
- Sun Y, Zhao D, Fan S, Duan L, Li R. *J Agric Food Chem*, 2014, 62: 3405–3409
- Chan J, Dodani SC, Chang CJ. *Nat Chem*, 2012, 4: 973–948
- Liu C, Chen W, Shi W, Peng B, Zhao Y, Ma H, Xian M. *J Am Chem Soc*, 2014, 136: 7257–7260
- Liu Y, Li K, Wu MY, Liu YH, Xie YM, Yu XQ. *Chem Commun*, 2015, 51: 10236–10239
- Liu Y, Li K, Xie KX, Li LL, Yu KK, Wang X, Yu XQ. *Chem Commun*, 2016, 52: 3430–3433
- Yang J, Li K, Hou JT, Li LL, Lu CY, Xie YM, Wang X, Yu XQ. *ACS Sens*, 2016, 1: 166–172
- Zhang Y, Guan L, Yu H, Yan Y, Du L, Liu Y, Sun M, Huang D, Wang S. *Anal Chem*, 2016, 88: 4426–4431
- Liu Z, Zhang C, Wang X, He W, Guo Z. *Org Lett*, 2012, 14: 4378–4381
- Qu Y, Hua J, Tian H. *Org Lett*, 2010, 12: 3320–3323
- Chen XY, Englert U, Bolm C. *Chem Eur J*, 2015, 21: 13221–13224

- 21 Sreejith S, Divya KP, Ajayaghosh A. *Angew Chem Int Ed*, 2008, 47: 7883–7887
- 22 Ajayaghosh A, Carol P, Sreejith S. *J Am Chem Soc*, 2005, 127: 14962–14963
- 23 Xu M, Huo F, Yin C. *Sensors Actuat B-Chem*, 2017, 240: 1245–1250
- 24 Kang J, Huo F, Yue Y, Wen Y, Chao J, Zhang Y, Yin C. *Dyes Pigments*, 2017, 136: 852–858
- 25 Liu T, Huo F, Li J, Cheng F, Yin C. *Sensors Actuat B-Chem*, 2017, 239: 526–535
- 26 Yue Y, Huo F, Zhang Y, Chao J, Martínez-Máñez R, Yin C. *Anal Chem*, 2016, 88: 10499–10503
- 27 Wu MY, He T, Li K, Wu MB, Huang Z, Yu XQ. *Analyst*, 2013, 138: 3018–3025
- 28 Dai X, Zhang T, Du ZF, Cao XJ, Chen MY, Hu SW, Miao JY, Zhao BX. *Anal Chim Acta*, 2015, 888: 138–145
- 29 Geng L, Yang XF, Zhong Y, Li Z, Li H. *Dyes Pigments*, 2015, 120: 213–219

A ratiometric fluorescent probe for sensing bisulphate and its application in living cells and zebrafish

Weijie Zhang¹, Tao Liu¹, Fangjun Huo², Peng Ning³, Ying Wen¹, Xiangming Meng³, Caixia Yin^{1*}

¹ Key Laboratory of Chemical Biology and Molecular Engineering of Ministry of Education, Key Laboratory of Materials for Energy Conversion and Storage of Shanxi Province, Institute of Molecular Science, Shanxi University, Taiyuan 030006, China

² Research Institute of Applied Chemistry, Shanxi University, Taiyuan 030006, China

³ Department of Chemistry, Anhui University, Hefei 230601, China

*Corresponding author (email: yincx@sxu.edu.cn)

Abstract: A novel near-infrared fluorescent probe for detection of bisulfite was designed and developed based on a conjugated naphthopyran-indolium system. The sensor showed excellent selectivity, high sensitivity and a rapid response toward bisulfite in aqueous solution. Upon the addition of HSO_3^- , the sensor displayed 21.6-fold (I_{520}/I_{653}) fluorescence intensity enhancement, accompanied with an apparent color change from violet to colorless, suggesting that the sensor can be used to detect HSO_3^- with “naked-eye”. The lowest detection limit for the above measurement was found to be 76 nM, and it was sensitive enough for the detection of endogenously produced bisulfite in biological system. Furthermore, the sensing mechanism was confirmed by high-resolution mass spectroscopy analysis and ^1H NMR spectrometry analysis, which was based on the strong nucleophilic addition reaction of bisulfite towards the sensor. Moreover, as a biocompatible molecule, the probe was successfully used for fluorescence imaging of bisulfite in MCF-7 cells and zebrafish, demonstrating that the probe is a novel ratiometric fluorescent probe to image SO_2 derivatives in biosystem.

Keywords: near infrared, ratiometric, bisulfite/sulfite, fluorescent probes, bioimaging

doi: [10.1360/N032017-00057](https://doi.org/10.1360/N032017-00057)