齐型空间上的指数平方类的刻画与应用

献给王斯雷教授 85 华诞

吴良川¹, 颜立新^{2*}

1. 北京大学北京国际数学研究中心, 北京 100871;

2. 中山大学数学学院, 广州 510275

E-mail: wulchuan@bicmr.pku.edu.cn, mcsylx@mail.sysu.edu.cn

收稿日期: 2017-06-23; 接受日期: 2017-11-14; 网络出版日期: 2018-10-11; * 通信作者

国家自然科学基金 (批准号: 11371378) 和广东特支计划资助项目

摘要 本文在齐型空间 (X, d, μ) 上建立与经典二进平方函数相联系的指数平方类的三个等价刻画, 即指数平方可积性、好 λ 不等式及二进平方函数的 L^p 下界最佳估计. 该工作推广了著名的 $\mathbb{R}^n$ 上 Chang-Wilson-Wolff 定理. 作为应用, 本文建立了非负 Ricci 曲率 Riemann 流形上与 Laplace-Beltrami 算子相联系的平方函数的 L^p 下界最佳估计.

关键词 指数平方类 平方函数 好 λ 不等式 Laplace-Beltrami 算子 齐型空间

MSC (2010) 主题分类 42B20, 42B25, 47B38, 58G35

1 引言与主要结果

设 $0 < \alpha < \infty$, Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 上经典的平方函数 (Lusin 面积积分) $S_\alpha(f)$ 定义为

$$S_\alpha(f)(x) = \left(\iint_{|x-y| < \alpha t} |\psi_t * f(y)|^2 t^{-1-n} dy dt \right)^{1/2}, \quad (1.1)$$

其中 $\psi_t(x) := t \nabla_x p_t(x)$ 是向量值函数,

$$p_t(x) = c_n \frac{t}{(|x|^2 + t^2)^{(n+1)/2}}$$

为经典 Poisson 核. 著名的 Chang-Wilson-Wolff 定理 (参见文献 [1, 定理 3.2]) 表明, 当 $S_\alpha(f) \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 时, 函数 f 满足

$$\sup_Q \frac{1}{|Q|} \int_Q \exp \left(c \frac{|f - f_Q|^2}{\|S_\alpha f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^2} \right) dx < C, \quad (1.2)$$

英文引用格式: Wu L C, Yan L X. Characterizations of the exponential square class on spaces of homogeneous type and applications (in Chinese). Sci Sin Math, 2018, 48: 1457–1480, doi: 10.1360/N012017-00136

其中 Q 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的方体, $f_Q = \frac{1}{|Q|} \int_Q f dx$, c 与 C 是仅依赖于维数 n 和辐角 α 的常数. 称满足 (1.2) 的函数 f 属于指数平方类 (exponential square class). Chang-Wilson-Wolff 的结果有众多重要应用, 例如, Fefferman 和 Pipher^[2] 关于奇异积分如 Hilbert 变换的 L^p 上界估计; 经典 Lusin 面积函数的 L^p 下界估计^[3,4]; 乘子的极大函数的 L^p 上界估计^[5].

在 Chang-Wilson-Wolff^[1] 的文章中, $\mathbb{R}^n$ 的几何结构在 (1.2) 的证明中起到了关键的作用. 一个自然的问题是, 能否在齐型空间 (X, d, μ) 上建立与 (1.2) 类似的结论? 本文对该问题给出了一个肯定的回答. 进一步, 我们在齐型空间 (X, d, μ) 上建立与经典二进平方函数相联系的指数平方类的等价刻画: 指数平方可积性、好 λ 不等式和二进平方函数的 L^p 下界最佳估计.

首先回忆齐型空间和二进平方函数的定义. 令 (X, d) 是拟度量空间, 即 $d: X \times X \rightarrow [0, \infty)$ 满足: (i) $d(x, y) = d(y, x) \geq 0$, $\forall x, y \in X$; (ii) $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$; (iii) 对任意的 $x, y, z \in X$, 有

$$d(x, y) \leq A_0(d(x, z) + d(z, y)), \quad (1.3)$$

其中常数 $A_0 \geq 1$. 令 μ 是 X 上非负双倍 Borel 测度: 存在常数 C_μ 使得对任意 $x \in X$ 和 $r > 0$, 有

$$0 < V(x, 2r) \leq C_\mu V(x, r) < \infty, \quad (1.4)$$

其中 $B(x, r) := \{y \in X : d(x, y) < r\}$, 且 $V(x, r) := \mu(B(x, r))$. 由 (1.4) 知, 存在依赖 C_μ 的常数 C 和 n , 使得对任意的 $\lambda \geq 1$ 和 $x \in X$, 有

$$0 < V(x, \lambda r) \leq C \lambda^n V(x, r) < \infty. \quad (1.5)$$

称配备非负双倍 Borel 测度 μ 的拟度量空间 (X, d) 为 Coifman-Weiss 意义下的齐型空间^[6]. 下文总是令 A_0 、 C_μ 和 n 分别为 (1.3)–(1.5) 中的常数.

令 $\mathcal{D} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{D}_k$ 是 (X, d, μ) 上的二进方体族^[7], 则其满足如下性质:

(i) 对任意的 $k \in \mathbb{Z}$, 有 $X = \bigcup_{Q \in \mathcal{D}_k} Q$, 且对每个 $Q \in \mathcal{D}_k$, 有 $c_1 \delta^k \leq \text{diam}(Q) \leq C_1 \delta^k$, 其中 $\delta \in (0, 1)$, c_1 和 C_1 是不依赖于 k 和 Q 的固定参数.

(ii) 对任意的 $k \in \mathbb{Z}$ 和 $Q \in \mathcal{D}_k$, 记 $Ch(Q) = \{P \in \mathcal{D}_{k+1} : P \subset Q\}$, 则 $Q = \bigcup_{P \in Ch(Q)} P$.

令 $f \in L^1_{\text{loc}}(X, d\mu)$, 经典二进平方函数 $S_d(f)$ 定义为

$$S_d(f)(x) := \left(\sum_{Q \ni x, Q \in \mathcal{D}} \frac{\|a_Q(f)\|_{L^2(X)}^2}{\mu(Q)} \right)^{1/2},$$

其中

$$a_Q(f)(x) := \sum_{P \in Ch(Q)} (f_P - f_Q) \chi_P(x),$$

χ_P 表示 P 上的特征函数. 下文中, 当 $\mu(X) < \infty$ 时, 记 $f_X := \mu(X)^{-1} \int_X f d\mu$; 否则记 $f_X := 0$.

本文的第一个结果如下.

定理 A (与二进平方函数相联系的指数平方类的等价刻画) 令 (X, d, μ) 是一个齐型空间, A_0 和 C_μ 分别是 (1.3) 和 (1.4) 中的常数. 对任意的 $f \in L^1_{\text{loc}}(X, d\mu)$, 下述性质成立且相互等价:

(i) (指数平方可积性) 若 $0 \neq \|S_d(f)\|_{L^\infty(X)} < \infty$, 则存在不依赖于 f 的常数 $\beta_1 = \beta_1(A_0, C_\mu)$ 和 C_2 , 使得

$$\sup_{Q \in \mathcal{D}} \frac{1}{\mu(Q)} \int_Q \exp \left(\beta_1 \frac{|f(x) - f_Q|^2}{\|S_d(f)\|_{L^\infty(X)}^2} \right) d\mu(x) \leq C_2. \quad (1.6)$$

(ii) (好 λ 不等式) 存在不依赖于 f 的常数 $C_3 = C_3(A_0, C_\mu)$ 、 $C_4 = C_4(A_0, C_\mu)$ 和充分小的 $\gamma_1 = \gamma_1(A_0, C_\mu)$, 使得

$$\begin{aligned} & \mu(\{x \in X : (f - f_X)^*(x) > 2\lambda, S_d(f)(x) \leq \gamma_1 \lambda\}) \\ & \leq C_3 \exp\left(-\frac{C_4}{\gamma_1^2}\right) \mu(\{x \in X : (f - f_X)^*(x) > \lambda\}), \quad \forall \lambda > 0, \end{aligned} \quad (1.7)$$

其中 $f^*(x) = \sup_{P \ni x, P \in \mathcal{D}} |f_P|$ 是 f 的二进极大函数.

(iii) (二进平方函数的 L^p 下界最佳估计) 存在不依赖于 f 的常数 $C_5 = C_5(A_0, C_\mu)$, 使得

$$\|f - f_X\|_{L^p(X, d\mu)} \leq C_5 p^{1/2} \|S_d(f)\|_{L^p(X, d\mu)}, \quad p \rightarrow \infty. \quad (1.8)$$

定理 A 证明的关键是利用齐型空间上的 Haar 基理论 [8]. 本文第 3 节先运用 Haar 函数的性质来证明定理 A(i); 再利用二进方体族的结构与性质来刻画定理 A(i) 与 A(ii) 的等价性; 最后使用 Fefferman-Pipher 的方法 [2] 和 Stirling 公式来论证定理 A(i) 与 A(iii) 是等价的.

利用定理 A, 我们研究 Riemann 流形上 Laplace-Beltrami 算子相联系的平方函数. 具体地, 令 M 是完备非紧且连通的 Riemann 流形, 记 μ 和 ∇ 分别是 M 上的测度和梯度. 假设 M 满足测度双倍条件 (1.4) 且 $\mu(M) = \infty$. 记 $|\cdot|$ 为切空间上的模, 定义 Laplace-Beltrami 算子 Δ 为 $L^2(M, d\mu)$ 上的自伴算子:

$$(\Delta f, f) = \|\nabla f\|_{L^2(X, d\mu)}^2.$$

记热半群 $e^{-t\Delta}$ 对应的核为 $p_t(x, y)$, $t > 0$, $x, y \in M$. 假设热核满足 Gauss 上界:

$$p_t(x, y) \leq \frac{C}{V(y, \sqrt{t})} \exp\left(-c \frac{d^2(x, y)}{t}\right), \quad \forall t > 0, \quad x, y \in M, \quad (1.9)$$

且有如下梯度估计:

$$|\nabla p_t(x, y)| \leq C \frac{C}{\sqrt{t} V(x, \sqrt{t})} \exp\left(-c \frac{d^2(x, y)}{t}\right), \quad \forall t > 0, \quad x, y \in M. \quad (1.10)$$

注意到满足上述条件 (1.4)、(1.9) 和 (1.10) 的流形总是存在的, 如 Ricci 曲率非负的完备非紧 Riemann 流形, 参见文献 [9, 10]. 定义与算子 Δ 相联系的平方函数 $S_{\Delta, \alpha}(f)$ 为

$$S_{\Delta, \alpha}(f)(x) := \left(\int_0^\infty \int_{d(y, x) < \alpha t} |t^2 \Delta e^{-t\sqrt{\Delta}} f(y)|^2 \frac{d\mu(y)}{V(x, t)} \frac{dt}{t} \right)^{1/2}, \quad \alpha > 0. \quad (1.11)$$

一个已知的事实是, 由于热核 $p_t(x, y)$ 满足 Gauss 上界 (1.9), 因此, 对任意的 $1 < p < \infty$ 和 $\alpha > 0$, 平方函数 $S_{\Delta, \alpha}$ 是 L^p 有界的, 且 $\|S_{\Delta, \alpha}(f)\|_p \leq Cp^{1/2} \|f\|_p$, 参见文献 [11–13]. 自然地, 我们关心 $S_{\Delta, \alpha}$ 的 L^p 下界有界性对 p 的依赖关系如何? 我们有如下结果.

定理 B 令 M 是完备非紧且连通的 Riemann 流形, 其测度 μ 满足双倍性质 (1.4), 且 M 上的热核 $p_t(x, y)$ 满足 Gauss 上界 (1.9) 和梯度估计 (1.10), 则存在正常数 $C = C(C_\mu, \alpha)$ 使得

$$\|f\|_{L^p(M, d\mu)} \leq Cp^{1/2} \|S_{\Delta, \alpha}(f)\|_{L^p(M, d\mu)}, \quad p \rightarrow \infty. \quad (1.12)$$

2 预备知识

本节介绍齐型空间 (X, d, μ) 上的二进方体族和 Haar 基理论. 需要指出的是, 这些理论在更一般的空间上也成立, 参见文献 [7, 8]. 为与后文论证保持一致, 本节总限制在齐型空间的框架下来叙述.

2.1 齐型空间上的二进方体族

我们先回顾二进方体族的结构与性质.

定理 2.1 (参见文献 [7, 定理 2.2]) 假设常数 $0 < c_0 \leq C_0 < \infty$ 和 $\delta \in (0, 1)$ 满足

$$12A_0^3 C_0 \delta \leq c_0,$$

其中 A_0 是 (1.3) 中的常数. 给定点集 $\{z_\beta^k\}$, $\beta \in \mathcal{J}_k$, 且对任意的 $k \in \mathbb{Z}$, 满足

$$d(z_{\beta_1}^k, z_{\beta_2}^k) \geq c_0 \delta^k \quad (\beta_1 \neq \beta_2), \quad \min_{\beta} d(x, z_\beta^k) < C_0 \delta^k, \quad \forall x \in X,$$

则可以构造 Borel 集 $Q_\beta^k \subset X$, 使得

- (i) 若 $\ell \geq k$, 则 $Q_{\beta_2}^\ell \subseteq Q_{\beta_1}^k$ 或 $Q_{\beta_1}^k \cap Q_{\beta_2}^\ell = \emptyset$;
- (ii) $X = \bigcup_{\beta \in \mathcal{J}_k} Q_\beta^k, \forall k \in \mathbb{Z}$;
- (iii) $B(z_\beta^k, c_1 \delta^k) \subset Q_\beta^k \subset B(z_\beta^k, C_1 \delta^k)$, 其中 $c_1 := (3A_0^2)^{-1} c_0$, $C_1 := 2A_0 C_0$;
- (iv) 若 $\ell \geq k$ 且 $Q_{\beta_2}^\ell \subseteq Q_{\beta_1}^k$, 则 $B(z_{\beta_2}^\ell, C_1 \delta^\ell) \subset B(z_{\beta_1}^k, C_1 \delta^k)$.

称 Q_β^k 是以 z_β^k 为中心、 $\ell(Q_\beta^k) := \delta^k$ 为边长的第 k 代二进方体, 并称集合 $\{Q_\beta^k\}_{\beta, k}$ 是 (与参数 c_1 、 C_1 和 δ 相关联的) 二进方体族.

为方便进一步讨论, 须要求参数 $\delta > 0$ 充分小, 本文与文献 [14, 第 2.2 小节] 一致, 总是固定 $\delta \leq 10^{-3} A_0^{-10}$. 运用文献 [14, 第 2 节] 中的相关结论 (或参见文献 [7, 第 4 节]), 我们有如下结果.

定理 2.2 令 (X, d, μ) 为齐型空间并给定 $\delta \leq 10^{-3} A_0^{-10}$.

(i) 存在二进方体族

$$\mathcal{D} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{D}_k, \quad \mathcal{D}_k = \{Q_\beta^k : \beta \in \mathcal{J}_k\},$$

其对应的参数为 $c_1 = (3A_0)^{-1}$ 、 $C_1 = (4A_0)^2$ 和 δ , 且 Q_β^k 的中心 x_β^k 满足

$$d(x_{\beta_1}^k, x_{\beta_2}^k) \geq \delta^k \quad (\beta_1 \neq \beta_2), \quad \min_{\beta} d(x, x_\beta^k) < 2A_0 \delta^k, \quad \forall x \in X.$$

(ii) 存在相邻二进方体族 $\{\mathcal{D}^b : b = 1, 2, \dots, L\}$, 它们对应的参数均为 $c_1 = 6^{-1} A_0^{-5}$ 、 $C_1 = 6A_0^4$ 和 δ , 其中 $L = L(A_0, A_1, \delta)$ 是一个几何常数. 记 ${}^b Q_\beta^k \in \mathcal{D}^b$ 的中心为 ${}^b z_\beta^k$, 则有

$$d({}^b z_{\beta_1}^k, {}^b z_{\beta_2}^k) \geq (2A_0)^{-1} \delta^k, \quad \min_{\alpha} d(x, {}^b z_\beta^k) < 4A_0^2 \delta^k,$$

并且存在正常数 $c = c(c_1, C_1, \delta)$, 使得对每个球 $B = B(x, r_B) \subset X$, 存在 $b \in \{1, 2, \dots, L\}$ 和 ${}^b Q \in \mathcal{D}^b$, 使得

$$B \subset {}^b Q \quad \text{且} \quad \text{diam}({}^b Q) \leq c r_B.$$

对任意的 $\ell \geq 0$ 和 $Q \in \mathcal{D}_k$, 记

$$Ch^{(\ell)}(Q) = \{P \subset Q : P \in \mathcal{D}_{k+\ell}\}.$$

显然, $Ch^{(0)}(Q) = \{Q\}$. 当 $\ell = 1$ 时, 我们略去上标 “(1)”, 即 $Ch(Q) = Ch^{(1)}(Q)$, 且称 $Ch(Q)$ 中的每个方体 P 是 Q 在 $\mathcal{D}$ 中的二进子方体. 同理, 对任意的 $b \in \{1, 2, \dots, L\}$ 和 ${}^b Q \in \mathcal{D}^b$, 我们可类似地定义 $Ch^{(\ell)}({}^b Q)$.

2.2 齐型空间上 Haar 函数的构造与性质

令 $\mathcal{D} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{D}_k$, $\mathcal{D}_k = \{Q_\beta^k : \beta \in \mathcal{J}_k\}$ 为齐型空间 (X, d, μ) 上一组二进方体族, 如定理 2.2(i) 所示. 对每个第 k 代二进方体 $Q \in \mathcal{D}_k$, 令

$$M_Q := \#Ch(Q) = \#\{P \in \mathcal{D}_{k+1} : P \subset Q\}$$

表示 Q 的二进子方体的个数. 由定理 2.1(iii) 和几何双倍性质知, 存在一个几何常数 $M = M(A_0, A_1, \delta)$, 使得对任意的 $Q \in \mathcal{D}$, 有

$$1 \leq M_Q \leq M. \quad (2.1)$$

进一步, 集合 $Ch(Q)$ 中元素存在一个排序 $\{Q_1, Q_2, \dots, Q_{M_Q}\}$ 满足

$$\sum_{k=j}^{M_Q} \mu(Q_j) \geq [1 - (j-1)M_Q^{-1}] \mu(Q), \quad \forall j = 1, 2, \dots, M_Q, \quad (2.2)$$

参见文献 [8, 引理 4.5]. 对任意 $1 \leq p \leq +\infty$, 记 $f \in L^p(X, d\mu)$ 的 L^p 模为 $\|f\|_p$, 并记 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 $L^2(X, d\mu)$ 空间上的内积. 另外, 符号 $A \simeq B$ 表示存在正常数 C , 使得 $C^{-1}A \leq B \leq CA$.

下面介绍 Haar 函数的一些基本性质.

定理 2.3 (参见文献 [8, 定理 4.2]) 对每个 $Q \in \mathcal{D}$, 令

$$h_0^Q := \mu(Q)^{-1/2} \chi_Q,$$

其中 χ_Q 表示 Q 上的特征函数. 对 $u = 1, 2, \dots, M_Q - 1$, 定义 Haar 函数

$$h_u^Q := \begin{cases} 0, & \text{若 } \mu(Q_u) = 0, \\ a_u \chi_{Q_u} - b_u \chi_{E_{u+1}}, & \text{若 } \mu(Q_u) > 0, \end{cases}$$

其中

$$a_u := \frac{\mu(E_{u+1})^{1/2}}{\mu(Q_u)^{1/2} \mu(E_u)^{1/2}}, \quad b_u := \frac{\mu(Q_u)^{1/2}}{\mu(E_u)^{1/2} \mu(E_{u+1})^{1/2}},$$

且 $E_u = E_u(Q) := \bigcup_{j=u}^{M_Q} Q_j$, $Q_j \in Ch(Q)$ 并满足 (2.2). 上述函数 $h_u^Q : Q \in \mathcal{D}$ ($u = 1, 2, \dots, M_Q - 1$) 满足如下性质:

- (i) h_u^Q 是 X 上的 Borel 可测简单函数;
- (ii) h_u^Q 紧支撑于 Q ;
- (iii) h_u^Q 在每个 $R \in Ch(Q)$ 上是常数;
- (iv) $\int h_u^Q d\mu = 0$, $\forall u = 1, 2, \dots, M_Q - 1$;
- (v) $\langle h_u^Q, h_{u'}^Q \rangle = 0$, 其中 $u \neq u'$, $u' \in \{0, 1, \dots, M_Q - 1\}$;
- (vi) 函数集 $\{h_u^Q : u = 0, 1, \dots, M_Q - 1\}$ 是空间 $V(Q)$ 上的正交基, 其中 $V(Q)$ 表示定义在 Q 上且在每个子方体 $P \in Ch(Q)$ 上为常数的函数全体组成的集合;
- (vii) 对每个 $u = 1, 2, \dots, M_Q - 1$, 若 $h_u^Q \neq 0$, 则

$$\|h_u^Q\|_{L^p(X, d\mu)} \simeq \mu(Q_u)^{1/p-1/2}, \quad \text{当 } 1 \leq p \leq \infty;$$

- (viii) 对每个 $u = 0, 1, 2, \dots, M_Q - 1$, 有

$$\|h_u^Q\|_{L^1(X, d\mu)} \cdot \|h_u^Q\|_{L^\infty(X, d\mu)} \simeq 1.$$

下面回顾 $L^p(X, d\mu)$ 函数的 Haar 基表示.

定理 2.4 (参见文献 [8, 定理 4.1]) 令 (X, d, μ) 为齐型空间. 当 $1 < p < \infty$ 时, 对每个 $f \in L^p(X, d\mu)$, 有

$$f(x) = f_X + \sum_{Q \in \mathcal{D}} \sum_{u=1}^{M_Q-1} \langle f, h_u^Q \rangle h_u^Q(x),$$

其中级数在 L^p 范数和几乎处处意义下收敛.

注 2.5 对每个 $b \in \{1, 2, \dots, L\}$, 当二进方体族 $\mathcal{D}$ 被替换成 $\mathcal{D}^b$ 时, 对每个 ${}^bQ \in \mathcal{D}^b$, 同样可定义 Haar 函数 $h_u^{{}^bQ}$, 且相应的定理 2.3 和 2.4 亦成立.

3 与二进平方函数相联系的指数平方类的三个等价刻画

本节仍令 (X, d, μ) 是 Coifman 与 Weiss 意义下的 (拟度量) 齐型空间, 记 A_0 、 C_μ 和 n 分别为 (1.3)–(1.5) 中的常数. 此外, 对 d 和 μ 不附加其他条件, 也不要求全空间 X 的测度是否有限.

固定参数 $\delta \leq 10^{-3}A_0^{-10}$, 令 $\mathcal{D} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{D}_k$, $\mathcal{D}_k = \{Q_\beta^k\}_{\beta \in \mathcal{J}_k}$ 是 X 上的二进方体族, 如定理 2.2(i) 所示, 且记 $\ell(Q_\beta^k) := \delta^k$. 令 $f \in L^1_{\text{loc}}(X, d\mu)$, 回顾 (与 $\mathcal{D}$ 相联系的) 经典二进平方函数为

$$S_d(f)(x) = \left(\sum_{Q \ni x, Q \in \mathcal{D}} \frac{\|a_Q(f)\|_{L^2(X)}^2}{\mu(Q)} \right)^{1/2}, \quad (3.1)$$

其中鞅差 $a_Q(f)(x) = \sum_{P \in Ch(Q)} (f_P - f_Q)\chi_P(x)$.

本节的主要内容是证明定理 A, 即在齐型空间上证明, 若 $S_d(f)$ 有界, 则 f 属于指数平方类函数空间, 并且给出该性质的等价刻画: 好 λ 不等式及平方函数的 L^p 下界最佳估计. 为论证方便, 考虑由鞅差的 L^∞ 范数定义的二进平方函数

$$S(f)(x) = \left(\sum_{Q \ni x, Q \in \mathcal{D}} \|a_Q(f)\|_{L^\infty(Q)}^2 \right)^{1/2}. \quad (3.2)$$

显然由定义知, $S_d(f)(x) \leq S(f)(x)$, $\forall x \in X$. 另一方面, 对每个 $Q_{\beta_1}^k \in \mathcal{D}$, 存在某个 $Q_{\beta_2}^{k+1} \in Ch(Q_{\beta_1}^k)$ 使得 $\|a_{Q_{\beta_1}^k}(f)\|_{L^\infty} = a_{Q_{\beta_1}^k}(f)(x)$, $\forall x \in Q_{\beta_2}^{k+1}$. 因此, 结合 μ 的双倍性质和定理 2.2(i) 可知,

$$\begin{aligned} \frac{\|a_{Q_{\beta_1}^k}(f)\|_{L^2(Q_{\beta_1}^k)}^2}{\mu(Q_{\beta_1}^k)} &\geq \|a_{Q_{\beta_1}^k}(f)\|_{L^\infty}^2 \frac{\mu(Q_{\beta_2}^{k+1})}{\mu(Q_{\beta_1}^k)} \\ &\geq \|a_{Q_{\beta_1}^k}(f)\|_{L^\infty}^2 \frac{V(x_{\beta_2}^{k+1}, (3A_0)^{-1}\delta^{k+1})}{V(x_{\beta_1}^k, (4A_0)^2\delta^k)} \\ &\geq C(A_0, C_\mu, \delta) \|a_{Q_{\beta_1}^k}(f)\|_{L^\infty}^2. \end{aligned}$$

注意到参数 δ 已经固定, 故存在正常数 $C_6 = C_6(A_0, C_\mu) < 1$ 使得

$$C_6 S(f)(x) \leq S_d(f)(x) \leq S(f)(x), \quad \forall x \in X. \quad (3.3)$$

因此, 为证明定理 A, 只需论证当平方函数 $S_d(f)$ 被替换成 $S(f)$ 时, 定理 A 仍成立即可.

进一步, 一个重要的事实是对每个 $Q \in \mathcal{D}$, 有

$$a_Q(f)(x) = \sum_{u=1}^{M_Q-1} \langle f, h_u^Q \rangle h_u^Q, \quad (3.4)$$

参见文献 [8, (4.6)].

利用 (3.3) 和 (3.4), 定理 A 的证明结构安排如下. 我们先证明指数平方可积性 (1.6), 然后依次证明 (1.6) 与好 λ 不等式 (1.7) 和二进平方函数的 L^p 下界最佳估计 (1.8) 分别等价. 证明的关键是利用 Haar 函数的基本性质及二进方体的结构和性质.

3.1 与二进平方函数相联系联系的指数平方可积定理

为证明定理 A(i), 我们需要下述两个结果.

引理 3.1 (参见文献 [4, 引理 4.2]) 令 (Ω, ν) 是一个概率空间, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个可测函数. 若 $|f(x)| \leq t, \forall x \in \Omega$, 且

$$\int_{\Omega} f(x) d\nu(x) = 0,$$

则

$$\int_{\Omega} \exp(f(x)) d\nu(x) \leq \cosh(t).$$

命题 3.2 令 (X, d, μ) 是齐型空间. 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(X, d\mu)$ 且 $0 \neq \|S(f)\|_{L^\infty(X)} < \infty$, 则对任意的二进方体 $Q \in \mathcal{D}$, $\lambda > 0$ 和 $0 < v \leq \|S(f)\|_{L^\infty}$, 有

$$\mu(\{x \in Q : |f - f_Q| > \lambda, S(f)(x) \leq v\}) \leq 2 \exp\left(-\frac{\lambda^2}{2v^2}\right) \mu(Q). \quad (3.5)$$

证明 运用 Haar 函数的性质 (见定理 2.3), 我们将修正文献 [4, 定理 3.2] 的论证方法来证明本命题.

步骤 1 任给 $g \in L^1_{\text{loc}}(X, d\mu)$ 且 $0 \neq \|S(g)\|_{L^\infty(X)} < \infty$, 证明

$$\int_Q \exp\left(g(x) - g_Q - \frac{1}{2} S^2(g)(x)\right) d\mu(x) \leq \mu(Q) \quad (3.6)$$

对每个 $Q \in \mathcal{D}$ 恒成立. 注意到存在某个 $k_0 \in \mathbb{Z}$ 使得 $Q \in \mathcal{D}_{k_0}$. 令 $\tilde{g} := (g - g_Q)\chi_Q$, 则 $g(x) - g_Q = \tilde{g}(x)$, $x \in Q$. 利用定理 2.3(iii) 和 2.3(iv) 知,

$$\begin{aligned} \langle \tilde{g}, h_u^R \rangle &= 0, \quad R \in \mathcal{D}_j, \quad j < k_0, \quad u = 1, 2, \dots, M_R - 1, \\ \langle \tilde{g}, h_u^P \rangle &= \langle g, h_u^P \rangle, \quad P \in \mathcal{D}_j, \quad j \geq k_0, \quad P \subset Q, \quad u = 1, 2, \dots, M_P - 1, \end{aligned}$$

且

$$\langle \tilde{g}, h_u^P \rangle = 0, \quad P \in \mathcal{D}_j, \quad j \geq k_0, \quad P \cap Q = \emptyset, \quad u = 1, 2, \dots, M_P - 1,$$

故结合定义可知, $\text{supp } S(\tilde{g}) \subset Q$, 且

$$S(\tilde{g})(x) \leq S(g)(x), \quad x \in Q.$$

另外, 令 $g_0 \equiv 0$ 并作

$$g_k := g_{k-1} + \sum_{P \in Ch^{(k-1)}(Q)} \sum_{u=1}^{M_P-1} \langle \tilde{g}, h_u^P \rangle h_u^P, \quad k \geq 1.$$

我们有如下性质:

(P1) 对任意的 $k \geq 0$, g_k 在每个 $R \in Ch^{(k)}(Q)$ 上取常数, 且

$$g_{k+1}(x) - g_k(x) \equiv \sum_{u=1}^{M_R-1} \langle \tilde{g}, h_u^R \rangle h_u^R, \quad x \in R, \quad R \in Ch^{(k)}(Q).$$

再结合定理 2.3(iv) 可知,

$$\int_R g_{k+1}(x) - g_k(x) d\mu(x) = 0, \quad R \in Ch^{(k)}(Q).$$

同时, 由定理 2.3(iii) 得 $g_{k+1} - g_k$ 在每个 $R_i \in Ch(R)$ 上取常数, 其中 $R \in Ch^{(k)}(Q)$. 不妨设 x_{R_i} 为 R_i 的中心, 则有

$$g_{k+1}(x) - g_k(x) = \sum_{u=1}^{M_R-1} \langle \tilde{g}, h_u^R \rangle h_u^R(x_{R_i}) =: c_{R_i}, \quad x \in R_i, \quad i = 1, 2, \dots, M_R.$$

(P2) 对任意的 $k \geq 1$, $S(g_k)$ 在每个 $P \in Ch^{(k-1)}(Q)$ 上取常数. 进一步, 对每个 $x \in R$, 其中 $R \in Ch^{(k)}(Q)$, $k \geq 0$, 有

$$S^2(g_{k+1})(x) - S^2(g_k)(x) \equiv \left\| \sum_{u=1}^{M_R-1} \langle \tilde{g}, h_u^R \rangle h_u^R \right\|_{L^\infty(R)}^2 = \max_{1 \leq i \leq M_R} \{c_{R_i}^2\}.$$

(P3) 对任意的 $k \geq 1$ 和 $x \in Q$, 有 $g_k(x) = (\tilde{g})_P$, 其中 $P \in Ch^{(k)}(Q)$ 且 $x \in P$. 由 $\tilde{g} \in L^1(X, d\mu)$ 且 μ 满足双倍性质, 易知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = \tilde{g}(x), \quad \text{a.e. } x \in Q.$$

又由 $\{S(g_k)(x)\}$ 是单调非减数列且 $S(\tilde{g}) \in L^\infty$ 知,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S(g_k)(x) = S(\tilde{g})(x), \quad \text{a.e. } x \in Q.$$

由引理 3.1 及上述性质 (P1)–(P3) 知, 对任意的 $R \in Ch^{(k)}(Q)$, $k \geq 0$, 有

$$\begin{aligned} & \int_R \exp \left(g_{k+1} - g_k - \frac{1}{2} (S^2(g_{k+1}) - S^2(g_k)) \right) d\mu(x) \\ &= \exp \left(-\frac{1}{2} \max_{1 \leq i \leq M_R} \{c_{R_i}^2\} \right) \int_R \exp(g_{k+1} - g_k) d\mu(x) \\ &\leq \exp \left(-\frac{1}{2} \max_{1 \leq i \leq M_R} \{c_{R_i}^2\} \right) \cosh \left(\max_{1 \leq i \leq M_R} \{c_{R_i}\} \right) \mu(R) \\ &\leq \mu(R), \end{aligned} \tag{3.7}$$

其中最后一个不等式利用了 $\cosh(c) \leq e^{c^2/2}$.

由 (P1) 和 (P2) 可知, $g_k - \frac{1}{2}S^2(g_k)$ 在每个 $R \in Ch^{(k)}(Q)$ 上都是常数, 再结合 (3.7) 知, 对每个 $k \geq 0$, 有

$$\begin{aligned} \int_Q \exp\left(g_{k+1} - \frac{1}{2}S^2(g_{k+1})\right) d\mu(x) &= \sum_{R \in Ch^{(k)}(Q)} \int_R \exp\left(g_{k+1} - \frac{1}{2}S^2(g_{k+1})\right) d\mu(x) \\ &\leq \sum_{R \in Ch^{(k)}(Q)} \int_R \exp\left(g_k - \frac{1}{2}S^2(g_k)\right) d\mu(x) \\ &= \int_Q \exp\left(g_k - \frac{1}{2}S^2(g_k)\right) d\mu(x), \end{aligned}$$

即数列 $\{\int_Q \exp(g_{k+1} - \frac{1}{2}S^2(g_{k+1}))d\mu(x)\}_{k \geq 0}$ 是非增的. 因此, 利用 Fatou 引理可得

$$\begin{aligned} \int_Q \exp\left(g(x) - g_Q - \frac{1}{2}S^2(g)(x)\right) d\mu(x) &\leq \int_Q \exp\left(\tilde{g}(x) - \frac{1}{2}S^2(\tilde{g})(x)\right) d\mu(x) \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_Q \exp\left(g_k(x) - \frac{1}{2}S^2(g_k)(x)\right) d\mu(x) \\ &\leq \int_Q \exp\left(g_0(x) - \frac{1}{2}S^2(g_0)(x)\right) d\mu(x) \\ &= \mu(Q), \end{aligned}$$

从而 (3.6) 获证.

步骤 2 令 $g = \lambda v^{-2}f$ 并代入 (3.6) 得

$$\begin{aligned} \mu(Q) &\geq \int_{\{x \in Q: f - f_Q > \lambda, S(f)(x) \leq v\}} \exp\left(\frac{\lambda}{v^2}(f - f_Q) - \frac{\lambda^2}{2v^4}S^2(f)(x)\right) d\mu(x) \\ &\geq \exp\left(\frac{\lambda^2}{2v^2}\right) \mu(\{x \in Q: f - f_Q > \lambda, S(f)(x) \leq v\}). \end{aligned}$$

同理, 令 $g = -\lambda v^{-2}f$, 同样有

$$\mu(\{x \in Q: f - f_Q < -\lambda, S(f)(x) \leq v\}) \leq \exp\left(-\frac{\lambda^2}{2v^2}\right) \mu(Q).$$

至此, (3.5) 成立, 命题 3.2 得证. □

利用上述命题 3.2, 下面证明定理 A(i).

定理 A(i) 的证明 由命题 3.2 可知, 若 $0 \neq \|S(f)\|_{L^\infty(Q)} < \infty$, 则

$$\mu(\{x \in Q: |f - f_Q| > \lambda\}) \leq 2 \exp\left(-\frac{\lambda^2}{2\|S(f)\|_{L^\infty(Q)}^2}\right) \mu(Q), \quad \forall \lambda > 0.$$

运用 L^p 范数的分布表示公式 (参见文献 [15, 定理 1.13]) 知, 存在 $\beta_2 \in (0, 1/2)$ 和 $C_7 = C_7(\beta_2)$, 使得

$$\sup_{Q \in \mathcal{Q}} \frac{1}{\mu(Q)} \int_Q \exp\left(\beta_2 \frac{|f(x) - f_Q|^2}{\|S(f)\|_{L^\infty(Q)}^2}\right) d\mu(x) \leq C_7. \quad (3.8)$$

再结合 (3.3) 中的第一个不等式知, 当取 $C_2 = C_7$ 且 $\beta_1 = \beta_2 C_6^2$ 时, (1.6) 成立, 其中 C_6 是 (3.3) 中的常数. 至此我们完成定理 A(i) 的证明. □

3.2 指数平方可积与好 λ 不等式的等价性

本小节将证明指数平方可积性 (1.6) 与好 λ 不等式 (1.7) 是等价的. 由于 (1.6) 与 (3.8) 是等价的, 我们通过修正文献 [1, 4] 中的论证方法来证明 (3.8) 蕴含 (1.7). 反过来, 我们可证明 (1.7) 蕴含 (1.6).

为论证需要, 我们定义截断型二进极大函数 $f^{*,Q}$ 为

$$f^{*,Q}(x) = \sup_{P \ni x, P \in \mathcal{D}, P \subset Q} |f_P|,$$

其中 $f \in L^1_{\text{loc}}(X)$, $Q \in \mathcal{D}$.

定理 A(i) $\Rightarrow$ A(ii) 的证明 首先考虑 $\mu(X) = \infty$ 的情形, 此时对 $f \in L^1_{\text{loc}}(X, d\mu)$, 按约定 $f_X = 0$.

由 (3.3) 知, 要证定理 A(ii) 是成立的, 只需论证下述与 $S(f)$ 相联系的好 λ 不等式: 存在正常数 $C_8 = C_8(A_0, C_\mu, C_7)$ 和 $C_9 = C_9(\beta_2)$, 其中 β_2 和 C_7 是 (3.8) 中的常数, 使得对任意的 $\lambda > 0$ 和 $\gamma_2 \in (0, 1/10)$, 有

$$\begin{aligned} \mu(\{x \in X : f^*(x) > 2\lambda, S(f)(x) \leq \gamma_2 \lambda\}) \\ \leq C_8 \exp\left(-\frac{C_9}{\gamma_2^2}\right) \mu(\{x \in X : f^*(x) > \lambda\}). \end{aligned} \quad (3.9)$$

为证明 (3.9), 不妨假设

$$0 < \mu(\{x \in X : f^*(x) > \lambda\}) < \infty. \quad (3.10)$$

令 $\{Q_{\lambda,i}\}$ 是 $\mathcal{D}$ 中使得 $|f_{Q_{\lambda,i}}| > \lambda$ 成立的极大二进方体集, 由 (3.10) 知这样的 $Q_{\lambda,i}$ 是存在的. 进一步, 由二进方体族的结构可知这些 $Q_{\lambda,i}$ 是互不相交的, 且

$$\{x \in X : f^*(x) > \lambda\} = \bigcup_i Q_{\lambda,i}.$$

因此, 为证 (3.9), 只需证明

$$\mu(\{x \in Q_{\lambda,i} : f^*(x) > 2\lambda, S(f)(x) \leq \gamma_2 \lambda\}) \leq C_8 \exp\left(-\frac{C_9}{\gamma_2^2}\right) \mu(Q_{\lambda,i}). \quad (3.11)$$

对上述每个 $Q_{\lambda,i}$ 都成立.

对每个点 $x \in Q_{\lambda,i}$, $Q_{\lambda,i}$ 的选取方式蕴含着 $|f_Q| \leq \lambda$ 对每个真包含 $Q_{\lambda,i}$ 的方体 $Q \in \mathcal{D}$ 都成立. 因此,

$$f^*(x) = \sup_{P \ni x, P \in \mathcal{D}} |f_P| = \sup_{P \ni x, P \in \mathcal{D}, P \subset Q_{\lambda,i}} |f_P| =: f^{*,Q_{\lambda,i}}(x), \quad x \in Q_{\lambda,i}. \quad (3.12)$$

对每个 $P \in \mathcal{D}$, 记 P 的二进父方体为 $\hat{P}$, 即 $P \in Ch(\hat{P})$. 若 $|f_{Q_{\lambda,i}}| \geq 1.1\lambda$, 则

$$\|a_{\hat{Q}_{\lambda,i}}(f)\|_{L^\infty} \geq |f_{Q_{\lambda,i}} - f_{\hat{Q}_{\lambda,i}}| \geq |f_{Q_{\lambda,i}}| - |f_{\hat{Q}_{\lambda,i}}| \geq 0.1\lambda.$$

从而, 对任意的 $x \in Q_{\lambda,i}$, 恒有 $S(f)(x) \geq 0.1\lambda > \gamma_2 \lambda$, 则 (3.11) 中左边的点集是空集. 因此, 我们只需考虑 $|f_{Q_{\lambda,i}}| < 1.1\lambda$. 再结合 (3.12) 可得

$$\begin{aligned} \{x \in Q_{\lambda,i} : f^*(x) > 2\lambda, S(f)(x) \leq \gamma_2 \lambda\} \\ = \{x \in Q_{\lambda,i} : f^{*,Q_{\lambda,i}}(x) > 2\lambda, S(f)(x) \leq \gamma_2 \lambda\} \end{aligned}$$

$$\subset \{x \in Q_{\lambda,i} : (f - f_{Q_{\lambda,i}})^{*,Q_{\lambda,i}}(x) > 0.9\lambda, S(f)(x) \leq \gamma_2\lambda\}.$$

为证明 (3.11), 我们只需证对每个 $Q_{\lambda,i}$, 有

$$\mu(\{x \in Q_{\lambda,i} : (f - f_{Q_{\lambda,i}})^{*,Q_{\lambda,i}}(x) > 0.9\lambda, S(f)(x) \leq \gamma_2\lambda\}) \leq C_8 \exp\left(-\frac{C_9}{\gamma_2^2}\right) \mu(Q_{\lambda,i}).$$

令

$$g(x) = (f(x) - f_{Q_{\lambda,i}}) \chi_{Q_{\lambda,i}}(x).$$

由定理 2.3(iv) 知,

$$\langle g, h_u^R \rangle = \langle f, h_u^R \rangle, \quad R \in \mathcal{D}, \quad R \subset Q_{\lambda,i}, \quad u = 1, 2, \dots, M_R - 1,$$

进一步, 运用定理 2.3(iii) 可得

$$\langle g, h_u^R \rangle = 0, \quad R \in \mathcal{D}, \quad Q_{\lambda,i} \subsetneq R, \quad u = 1, 2, \dots, M_R - 1.$$

因此, 当 $x \in Q_{\lambda,i}$ 时, $S(g)(x) \leq S(f)(x)$; 且 $x \notin Q_{\lambda,i}$ 时, $S(g)(x) = 0$. 同时,

$$g^*(x) = g^{*,Q_{\lambda,i}}(x) = (f - f_{Q_{\lambda,i}})^{*,Q_{\lambda,i}}(x), \quad x \in Q_{\lambda,i}.$$

综上所述, 下面只需证

$$\mu(\{x \in Q_{\lambda,i} : g^{*,Q_{\lambda,i}}(x) > 0.9\lambda, S(g)(x) \leq \gamma_2\lambda\}) \leq C_8 \exp\left(-\frac{C_9}{\gamma_2^2}\right) \mu(Q_{\lambda,i}).$$

记 $\{Q_{\lambda,i}^j\}$ 为 $Q_{\lambda,i}$ 的子方体集 (称 $Q_{\lambda,i}^j$ 是 $Q_{\lambda,i}$ 的一个子方体, 如果存在 $\ell_j \geq 1$ 使得 $Q_{\lambda,i}^j \in Ch^{(\ell_j)}(Q_{\lambda,i})$), 使得

$$\begin{aligned} \sum_{P: Q_{\lambda,i}^j \subsetneq P} \left\| \sum_{u=1}^{M_P-1} \langle g, h_u^P \rangle h_u^P \right\|_{L^\infty}^2 &\leq (\gamma_2\lambda)^2, \\ \sum_{P: Q_{\lambda,i}^j \subset P} \left\| \sum_{u=1}^{M_P-1} \langle g, h_u^P \rangle h_u^P \right\|_{L^\infty}^2 &> (\gamma_2\lambda)^2. \end{aligned} \quad (3.13)$$

不妨假设 $\mathcal{R}_{\lambda,i} := Q_{\lambda,i} \setminus \bigcup_j Q_{\lambda,i}^j$ 是非空集. 显然, $S(g)(x) \leq \gamma_2\lambda$ 当且仅当 $x \in \mathcal{R}_{\lambda,i}$, 从而,

$$\{x \in Q_{\lambda,i} : g^{*,Q_{\lambda,i}}(x) > 0.9\lambda, S(g)(x) \leq \gamma_2\lambda\} = \{x \in \mathcal{R}_{\lambda,i} : g^{*,Q_{\lambda,i}}(x) > 0.9\lambda\}.$$

定义

$$g_s(x) = \begin{cases} g_{Q_{\lambda,i}^j}, & x \in Q_{\lambda,i}^j, \\ g(x), & \text{其他}. \end{cases}$$

给定 $x \in \mathcal{R}_{\lambda,i}$, 对每个包含 x 的二进方体 $P \in \mathcal{D}$, 要么 $Q_{\lambda,i}^j \cap P = \emptyset$, 要么 $Q_{\lambda,i}^j \subset P$, 故

$$(g_s)_P = \frac{1}{\mu(P)} \left\{ \int_{P \cap \mathcal{R}_{\lambda,i}} g(x) d\mu(x) + \sum_{j: Q_{\lambda,i}^j \subset P} \int_{Q_{\lambda,i}^j} g_{Q_{\lambda,i}^j} d\mu(x) \right\} = g_P. \quad (3.14)$$

从而, 当 $x \in \mathcal{R}_{\lambda,i}$ 时, $g^{*,Q_{\lambda,i}}(x) = (g_s)^{*,Q_{\lambda,i}}(x)$, 因此,

$$\begin{aligned} \{x \in \mathcal{R}_{\lambda,i} : g^{*,Q_{\lambda,i}}(x) > 0.9\lambda\} &= \{x \in \mathcal{R}_{\lambda,i} : (g_s)^{*,Q_{\lambda,i}}(x) > 0.9\lambda\} \\ &\subset \{x \in Q_{\lambda,i} : (g_s)^{*,Q_{\lambda,i}}(x) > 0.9\lambda\}. \end{aligned}$$

下面估计 $S(g_s)(x)$, 其中 $x \in Q_{\lambda,i}$.

情形 1 存在 j 使得 $x \in Q_{\lambda,i}^j$.

由定理 2.3(iv) 及 g_s 的定义可知,

$$S(g_s)(x)^2 = \sum_{P \ni x, P \in \mathcal{D}, Q_{\lambda,i}^j \subsetneq P} \left\| \sum_{u=1}^{M_P-1} \langle g_s, h_u^P \rangle h_u^P \right\|_{L^\infty}^2.$$

对每个满足 $Q_{\lambda,i}^j \subsetneq P$ 的方体 $P \in \mathcal{D}$, 注意到这些 $Q_{\lambda,i}^j$ 互不相交, 故要么 $Q_{\lambda,i}^k \cap P = \emptyset$, 要么 $Q_{\lambda,i}^k \subsetneq P$, 其中 $k \neq j$. 再结合定理 2.3(iii) 可推导出

$$\langle g_s, h_u^P \rangle = \langle g, h_u^P \rangle, \quad u = 1, 2, \dots, M_P - 1.$$

故利用 (3.13) 知 $S(g_s)(x) \leq \gamma_2 \lambda$, 其中 $x \in Q_{\lambda,i}$.

情形 2 $x \in \mathcal{R}_{\lambda,i}$.

易验证对每个包含 x 的 $P \in \mathcal{D}$, 有

$$\langle g_s, h_u^P \rangle = \langle g, h_u^P \rangle, \quad u = 1, 2, \dots, M_P - 1.$$

这说明了当 $x \in \mathcal{R}_{\lambda,i}$ 时, 有 $S(g_s)(x) = S(g)(x) \leq \gamma_2 \lambda$.

由上述情形 1 和 2 知, 任给 $x \in Q_{\lambda,i}$, 恒有 $S(g_s)(x) \leq \gamma_2 \lambda$. 进一步, 运用定理 3.2 可推出

$$\{x \in Q_{\lambda,i} : (g_s)^{*,Q_{\lambda,i}}(x) > 0.9\lambda\} = \{x \in Q_{\lambda,i} : (g_s)^{*,Q_{\lambda,i}}(x) > 0.9\lambda, S(g_s)(x) \leq \gamma_2 \lambda\}.$$

另外, 注意到对每个 $\theta > 0$ 和 $x \in Q_{\lambda,i}$, 由指数函数的凸性可知, 对任意的 $P \in \mathcal{D}$, 其中 P 满足 $x \in P$ 且 $P \subset Q_{\lambda,i}$, 则有

$$\begin{aligned} \exp(\theta |(g_s)_P|^2) &\leq \exp(\theta (|g_s|^2)_P) \leq (\exp(\theta |g_s|^2))_P \leq [\exp(\theta |g_s|^2)]^{*,Q_{\lambda,i}}(x) \\ &= [\exp(\theta |g_s|^2) \chi_{Q_{\lambda,i}}]^{*,Q_{\lambda,i}}(x) \leq [\exp(\theta |g_s|^2) \chi_{Q_{\lambda,i}}]^*(x). \end{aligned}$$

因此,

$$\exp\{\theta [(g_s)^{*,Q_{\lambda,i}}(x)]^2\} \leq [\exp(\theta |g_s|^2) \chi_{Q_{\lambda,i}}]^*(x), \quad x \in Q_{\lambda,i}, \quad \theta > 0.$$

故取定

$$\theta = \frac{\beta_2}{2 \|S(g_s)\|_{L^\infty(Q_{\lambda,i})}^2},$$

其中 β_2 是 (3.8) 中的常数, 可得

$$\begin{aligned} &\mu(\{x \in Q_{\lambda,i} : (g_s)^{*,Q_{\lambda,i}}(x) > 0.9\lambda, S(g_s)(x) \leq \gamma_2 \lambda\}) \\ &\leq \mu\left(\left\{x \in Q_{\lambda,i} : \exp\left(\frac{\beta_2}{2} \frac{[(g_s)^{*,Q_{\lambda,i}}(x)]^2}{\|S(g_s)\|_{L^\infty(Q_{\lambda,i})}^2}\right) > \exp\left(\frac{0.81\beta_2}{2\gamma_2^2}\right)\right\}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \mu\left(\left\{x \in Q_{\lambda,i} : \left[\exp\left(\frac{\beta_2}{2} \frac{|g_s|^2}{\|S(g_s)\|_{L^\infty(Q_{\lambda,i})}^2}\right) \chi_{Q_{\lambda,i}}\right]^*(x) > \exp\left(\frac{0.81\beta_2}{2\gamma_2^2}\right)\right\}\right) \\
&\leq \exp\left(-\frac{0.81\beta_2}{\gamma_2^2}\right) \int_{Q_{\lambda,i}} \left\{\left[\exp\left(\frac{\beta_2}{2} \frac{|g_s|^2}{\|S(g_s)\|_{L^\infty(Q_{\lambda,i})}^2}\right) \chi_{Q_{\lambda,i}}\right]^*\right\}^2(x) d\mu(x) \\
&\leq C_{10} \exp\left(-\frac{0.81\beta_2}{\gamma_2^2}\right) \int_X \left[\exp\left(\frac{\beta_2}{2} \frac{|g_s|^2}{\|S(g_s)\|_{L^\infty(Q_{\lambda,i})}^2}\right) \chi_{Q_{\lambda,i}}\right]^2(x) d\mu(x),
\end{aligned}$$

其中最后一个不等式利用了二进极大函数的 L^2 有界性, 且 $C_{10} = C_{10}(A_0, C_\mu)$ 仅依赖于常数 A_0 和 C_μ , 参见文献 [16, 定理 1.3].

接下来, 注意到 $(g_s)_{Q_{\lambda,i}} = 0$, 且利用定理 A(i) 证明中的 (3.8) 可推知,

$$\begin{aligned}
&\mu(\{x \in Q_{\lambda,i} : (g_s)^{*,Q_{\lambda,i}}(x) > 0.9\lambda, S(g_s)(x) \leq \gamma_2\lambda\}) \\
&\leq C_{10} \exp\left(-\frac{0.81\beta_2}{\gamma_2^2}\right) \int_{Q_{\lambda,i}} \left[\exp\left(\beta_2 \frac{|g_s - (g_s)_{Q_{\lambda,i}}|^2}{\|S(g_s)\|_{L^\infty(Q_{\lambda,i})}^2}\right)\right]^2(x) d\mu(x) \\
&\leq C_7 C_{10} \exp\left(-\frac{0.81\beta_2}{\gamma_2^2}\right) \mu(Q_{\lambda,i}).
\end{aligned}$$

故当 $\mu(X) = \infty$ 时, 取 $C_8 = C_7 C_{10}$ 且 $C_9 = 0.81\beta_2$, 则 (3.9) 成立.

当 $\mu(X) < \infty$ 时, 令 $h = f - f_X$, 由定义知 $S(f) = S(h)$. 不妨令 $\{x \in X : h^*(x) > \lambda\} \neq \emptyset$, 并作 $\{P_{\lambda,i}\}$ 是满足 $|h_{P_{\lambda,i}}| > \lambda$ 的 $\mathcal{D}$ 中的极大二进方体集. 由 $\int_X h d\mu = 0$ 知 $P_{\lambda,i} \neq X$. 该事实允许我们利用 $\mu(X) = \infty$ 时的论证方法来证明 (3.9) 在 $\mu(X) < \infty$ 时亦成立, 不再赘述.

综上所述, (3.9) 成立, 故定理 A(i) 可推导出定理 A(ii). $\square$

为说明定理 A(i) 与 A(ii) 是等价的, 下面只需证明定理 A(ii) 蕴含 A(i).

定理 A(ii) $\Rightarrow$ A(i) 的证明 因为 (3.9) 与定理 A(ii) 是等价的, 我们只需证明 (3.9) 蕴含了 (3.8) 即可.

对每个 $\lambda > 0$ 和 $\gamma_3 \in [2, \infty)$, 有 $2\gamma_2/\gamma_3 \in (0, 1/10)$, 其中 $\gamma_2 \in (0, 1/10)$ 是 (3.9) 中的常数. 运用 (3.9) 可知,

$$\begin{aligned}
&\mu(\{x \in X : (f - f_X)^*(x) > \gamma_3\lambda, S(f)(x) \leq \gamma_2\lambda\}) \\
&= \mu\left(\left\{x \in X : (f - f_X)^*(x) > 2\frac{\gamma_3\lambda}{2}, S(f)(x) \leq \frac{2\gamma_2}{\gamma_3} \frac{\gamma_3\lambda}{2}\right\}\right) \\
&\leq C_8 \exp\left(-\frac{C_9\gamma_3^2}{4\gamma_2^2}\right) \mu\left(\left\{x \in X : (f - f_X)^*(x) > \frac{\gamma_3\lambda}{2}\right\}\right). \tag{3.15}
\end{aligned}$$

对任意满足 $0 \neq \|S(f)\|_{L^\infty(Q)} < \infty$ 的 $Q \in \mathcal{D}$, 令 $\tilde{f} = (f - f_Q)\chi_Q$. 显然有

$$\|S(\tilde{f})\|_{L^\infty(Q)} \leq \|S(f)\|_{L^\infty(Q)}, \quad (\tilde{f})_X = 0,$$

且对任意 $\lambda > 0$, 有

$$\{x \in X : (\tilde{f})^*(x) > \lambda\} \subset Q.$$

利用这些估计和 (3.15), 并取 $\gamma_2 = 1/20$, $\lambda = 20\|S(f)\|_{L^\infty(Q)}$, 易验证对 $\gamma_3 \geq 2$, 有

$$\mu(\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > 20\gamma_3\|S(f)\|_{L^\infty(X)}\})$$

$$\begin{aligned}
 &\leq \mu\left(\left\{x \in X : (\tilde{f} - (\tilde{f})_X)^*(x) > 20\gamma_3 \|S(f)\|_{L^\infty(X)}, S(\tilde{f})(x) \leq \frac{1}{10\gamma_3}(10\gamma_3 \|S(f)\|_{L^\infty(Q)})\right\}\right) \\
 &\leq C_8 \exp(-100 C_9 \gamma_3^2) \mu(\{x \in X : (\tilde{f} - (\tilde{f})_X)^*(x) > 10\gamma_3 \|S(f)\|_{L^\infty(X)}\}) \\
 &\leq C_8 \exp(-100 C_9 \gamma_3^2) \mu(Q).
 \end{aligned}$$

因此, 可取 $\beta_3 \in (0, C_9/4)$, 从而可得

$$\begin{aligned}
 &\int_Q \exp\left(\beta_3 \frac{|f(x) - f_Q|^2}{\|S(f)\|_{L^\infty(Q)}^2}\right) d\mu(x) \\
 &\leq \exp(1,600\beta_3) \mu(\{x \in Q : |f - f_Q| \leq 40 \|S(f)\|_{L^\infty(Q)}\}) \\
 &\quad + \int_2^\infty 800 \beta_3 \gamma_3 \exp(400 \beta_3 \gamma_3^2) \mu(\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > 20\gamma_3 \|S(f)\|_{L^\infty(X)}\}) d\gamma_3 \\
 &\leq C_{11} \mu(Q),
 \end{aligned}$$

其中 $C_{11} = C_{11}(C_8, C_9, \beta_3)$, 故 (3.8) 成立, 证明完毕. $\square$

3.3 指数平方可积与平方函数的 L^p 下界最佳估计的等价性

本小节将证明指数平方可积性 (1.6) 与二进平方函数 S_d 的 L^p 下界最佳估计 (1.8) 是等价的. 为此, 先运用 Fefferman-Pipher 方法^[2] 来证明好 λ 不等式 (1.7) 可推导出 (1.8), 从而, (1.6) 蕴含了 (1.8). 然后使用 Stirling 公式证明 (1.8) 可推导出 (1.6).

为论证需要, 我们介绍下述辅助泛函和估计. 对任意 $Q \in \mathcal{D}$ 和非负可测函数 $W \in L^1_{\text{loc}}(X, d\mu)$, $0 < \eta \leq 1$, 定义泛函 $Y_\eta(Q, W)$ 如下:

$$Y_\eta(Q, W) = \begin{cases} \frac{\int_Q W(x) \log^\eta(e + W(x)/W_Q) d\mu(x)}{\int_Q W(x) d\mu(x)}, & \int_Q W(x) d\mu(x) > 0, \\ 1, & \int_Q W(x) d\mu(x) = 0. \end{cases} \quad (3.16)$$

泛函 $Y_\eta(Q, W)$ 首次出现在文献 [17] 中 ($\eta = 1$ 情形), 并在文献 [3] 中被进一步研究, 所涉底空间均为配备 Lebesgue 测度的 Euclid 空间. 如文献 [3] 中所示, 该泛函反映了函数 W 在 Q 上的“峰度系数”(非 A_∞ 行为).

引理 3.3 给定 $Q \in \mathcal{D}$ 和 $E \subset Q$. 若 $Y_\eta(Q, W) \leq y_0$ 且 $a > 0$ 使得

$$\mu(E) \leq C_{12} \exp(-a) \mu(Q),$$

则存在正常数 $C_{13} = C_{13}(C_{12}, \eta)$, 使得

$$W(E) \leq C_{13} a^{-\eta} y_0 W(Q), \quad (3.17)$$

其中 $W(E) := \int_E W(x) d\mu(x)$.

证明 该引理的证明可参见文献 [4, 第 45 页]. 事实上, 若 $W(Q) = 0$, 则 $W(E) = W(Q) = 0$, 从而, 显然有 (3.17). 因此, 只需考虑 $W(Q) > 0$ 的情形. 任给 $\lambda > 0$, 令

$$Q_\lambda := \{x \in Q : W(x) > \exp(\lambda) W_Q\}.$$

则有

$$W(E) = W(E \cap Q_{a/2}) + W(E \setminus Q_{a/2}).$$

由 (3.16) 知, $(a/2)^\eta W(E \cap Q_{a/2}) \leq y_0 W(Q)$, 即 $W(E \cap Q_{a/2}) \leq 2^\eta a^{-\eta} y_0 W(Q)$.

另一方面, 注意到 $y_0 = Y_\eta(Q, W) \geq 1$, 则

$$W(E \setminus Q_{a/2}) \leq \exp\left(\frac{a}{2}\right) \mu(Q)^{-1} W(Q) \mu(E) \leq C_{12} \exp\left(-\frac{a}{2}\right) W(Q) \leq C_{14} a^{-\eta} y_0 W(Q),$$

其中 $C_{14} = C_{14}(C_{12}, \eta)$. 取 $C_{13} = 2^\eta + C_{14}$, (3.17) 成立, 得证. $\square$

利用上述引理, 下面证明定理 A(i) 蕴含定理 A(iii).

定理 A(i) $\Rightarrow$ A(iii) 的证明 由 Fefferman-Pipher 证明 Hilbert 变换 L^p 有界性的方法 (参见文献 [2, 第 356 和 357 页]) 知, 为证定理 A(iii), 只需如下加权估计成立:

$$\|f - f_X\|_{L^2(X, W d\mu)} \leq C \|W\|_{A_1}^{1/2} \|S_d(f)\|_{L^2(X, W d\mu)}, \quad (3.18)$$

其中 A_1 是经典的 Muckenhoupt 权空间. 事实上, 对任意的 $f \in L^p(X, d\mu)$, $p > 2$, 有

$$\|f - f_X\|_{L^p(X, d\mu)}^2 = \sup_{\substack{\|\varphi\|_{L^{(p/2)'}(X, d\mu)}=1 \\ \varphi \geq 0}} \int_X |f - f_X|^2 \varphi d\mu. \quad (3.19)$$

对任意非负的 $L^{(p/2)'}(X, d\mu)$ 函数 φ 且 $\|\varphi\|_{L^{(p/2)'}(X, d\mu)} = 1$, 令

$$v = \varphi + \frac{M(\varphi)}{2\|M\|_{L^{(p/2)'}(X, d\mu)}} + \frac{M \circ M(\varphi)}{(2\|M\|_{L^{(p/2)'}(X, d\mu)})^2} + \cdots,$$

其中 M 是经典 Hardy-Littlewood 极大函数. 显然, $\|v\|_{L^{(p/2)'}(X, d\mu)} \leq 2$ 且

$$\|v\|_{A_1} \leq 2\|M\|_{L^{(p/2)'}(X, d\mu) \rightarrow L^{(p/2)'}(X, d\mu)} = O(p), \quad \text{当 } p \rightarrow \infty.$$

若 (3.18) 成立, 则

$$\int_X |f - f_X|^2 \varphi d\mu \leq \int_X |f - f_X|^2 v d\mu \leq C \|v\|_{A_1} \int_X |S_d(f)|^2 v d\mu \leq Cp \|S_d(f)\|_{L^p(X, d\mu)}^2.$$

结合 (3.19) 知定理 A(iii) 成立. 故我们只需证明 (3.18) 成立.

注意到对每个 $\lambda > 0$ 和 $\gamma_1 \in (0, C_6/10)$, 由 (3.3) 知,

$$\begin{aligned} & W(\{x \in X : (f - f_X)^*(x) > 2\lambda, S_d(f)(x) \leq \gamma_1 \lambda\}) \\ & \leq \sum_i W\left(\left\{x \in Q_{\lambda, i} : (f - f_X)^*(x) > 2\lambda, S(f)(x) \leq \left(\frac{\gamma_1}{C_6}\right)\lambda\right\}\right), \end{aligned} \quad (3.20)$$

其中 $\{Q_{\lambda, i}\}$ 是 $\mathcal{D}$ 中使得 $|(f - f_X)_{Q_{\lambda, i}}| > \lambda$ 成立的极大二进方体集. 注意到我们已证明定理 A(i) 可推导出 (3.11), 则对每个 $Q_{\lambda, i}$, 有

$$\mu\left(\left\{x \in Q_{\lambda, i} : (f - f_X)^*(x) > 2\lambda, S(f)(x) \leq \left(\frac{\gamma_1}{C_6}\right)\lambda\right\}\right) \leq C_8 \exp\left(-\frac{C_6^2 C_9}{\gamma_1^2}\right) \mu(Q_{\lambda, i}). \quad (3.21)$$

另一方面, 易验证存在常数 $C_{15} = C_{15}(A_0, C_\mu) \geq 1$, 使得对每个二进方体 $Q \in \mathcal{D}$, 如果 $W(Q) \neq 0$, 那么,

$$\int_Q W(x) \log \left(e + \frac{W(x)}{W_Q} \right) d\mu(x) \leq C_{15} \int_Q M(W\chi_Q) d\mu(x) \leq C_{15} \|W\|_{A_1} W(Q).$$

又 $\|W\|_{A_1} \geq 1$ 恒成立, 故结合泛函 $Y_1(Q, W)$ 的定义知,

$$Y_1(Q, W) \leq C_{15} \|W\|_{A_1}, \quad \forall Q \in \mathcal{D}. \quad (3.22)$$

将 (3.21) 和 (3.22) 代入引理 3.3 知, 对每个 $Q_{\lambda,i}$, 有

$$W \left(\left\{ x \in Q_{\lambda,i} : (f - f_X)^*(x) > 2\lambda, S(f)(x) \leq \left(\frac{\gamma_1}{C_6} \right) \lambda \right\} \right) \leq C_{16} \gamma_1^2 \|W\|_{A_1} W(Q_{\lambda,i}),$$

其中 $C_{16} = C_{16}(C_6, C_8, C_9)$. 取 $\gamma_1 = \frac{C_6}{\sqrt{100(1+C_{16})\|W\|_{A_1}}} \in (0, C_6/10)$ 并将上式代入 (3.20) 得

$$\begin{aligned} & W \left(\left\{ x \in X : (f - f_X)^*(x) > 2\lambda, S_d(f)(x) \leq \frac{C_6}{\sqrt{100(1+C_{16})\|W\|_{A_1}}} \lambda \right\} \right) \\ & \leq \frac{C_6^2}{100} W(\{x \in X : (f - f_X)^*(x) > \lambda\}) \\ & < \frac{1}{100} W(\{x \in X : (f - f_X)^*(x) > \lambda\}). \end{aligned}$$

再结合经典的好 λ 不等式^[18] 可知 (3.18) 成立, 证明完毕. $\square$

为证明定理 A(i) 与 A(iii) 等价, 下面只需证定理 A(iii) 蕴含定理 A(i).

定理 A(iii) $\Rightarrow$ A(i) 的证明 为说明当 $0 \neq \|S_d(f)\|_{L^\infty(X)} < \infty$ 时 (1.6) 成立, 对每个 $Q \in \mathcal{D}$, 令 $g = (f - f_Q)\chi_Q$. 易验证: 当 $P \in Ch^{(\ell)}(Q)$ ($\ell \geq 1$) 时, $g_P = f_P - f_Q$; 否则, 若 $R \in \mathcal{D}$ 不是 Q 的真子集, 则 $g_R = 0$. 这些事实结合 S_d 的定义可知, 当 $x \in Q$ 时, $S_d(g)(x) \leq S_d(f)(x)$, 且当 $x \notin Q$ 时, $S_d(g)(x) = 0$.

因此, 对任意的 $k \geq 2$, 有

$$\|S_d(g)\|_{L^k(X)} \leq \|S_d(f)\|_{L^\infty(X)} \mu(Q)^{1/k}.$$

进一步, 由定理 A(iii) 可知, 存在正常数 $C_{17} = C_{17}(C_5)$ 使得

$$\|g - g_X\|_{L^k(X)} = \|f - f_Q\|_{L^k(Q)} \leq C_{17} k^{1/2} \|S_d(f)\|_{L^\infty(X)} \mu(Q)^{1/k}, \quad \forall k \geq 2.$$

再结合 Chebyshev 不等式可知,

$$\begin{aligned} \int_Q \exp(|f - f_Q|) d\mu(x) & \leq e^2 \mu(Q) + \sum_{k=2}^{\infty} e^{k+1} \mu(\{x \in Q : k \leq |f - f_Q| < k+1\}) \\ & \leq e^2 \mu(Q) + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{e^{k+1}}{k^{2k}} C_{17}^{2k} (2k)^k \|S_d(f)\|_{L^\infty(X)}^{2k} \mu(Q) \\ & = e^2 \mu(Q) + e \mu(Q) \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(2C_{17}^2 \|S_d(f)\|_{L^\infty(X)}^2)^k}{(k/e)^k}. \end{aligned} \quad (3.23)$$

回顾 Stirling 公式

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k!}{\sqrt{2\pi k} (k/e)^k} = 1,$$

故存在正常数 C_{18} , 使得对每个正整数 k , 有

$$\frac{k!}{\sqrt{k}} \leq C_{18} \left(\frac{k}{e}\right)^k.$$

将之代入 (3.23) 可推出

$$\begin{aligned} \int_Q \exp(|f - f_Q|) d\mu(x) &\leq e^2 \mu(Q) + 2eC_{17}^2 C_{18} \|S_d(f)\|_{L^\infty(X)}^2 \mu(Q) \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(2C_{17}^2 \|S_d(f)\|_{L^\infty(X)}^2)^{k-1}}{(k-1)!} \\ &\leq e^2 \mu(Q) + eC_{18} (2C_{17}^2 \|S_d(f)\|_{L^\infty(X)}^2) \exp(2C_{17}^2 \|S_d(f)\|_{L^\infty(X)}^2) \mu(Q) \\ &\leq (e^2 + eC_{18}) \exp(4C_{17}^2 \|S_d(f)\|_{L^\infty(X)}^2) \mu(Q), \end{aligned}$$

其中第二个不等式运用了指数的 Taylor 展开公式, 第三个不等式成立是因为 $t < e^t, \forall t \in \mathbb{R}$.

因此,

$$\int_Q \exp(|f - f_Q| - 4C_{17}^2 \|S_d(f)\|_{L^\infty(X)}^2) d\mu(x) \leq (e^2 + eC_{18}) \mu(Q).$$

由命题 3.2 证明中步骤 2 可得定理 A(i), 证毕. $\square$

注 3.4 由定理 2.2(ii) 知, X 上存在相邻二进方体族 $\{\mathcal{D}^b : b = 1, 2, \dots, L\}$, 且每个 $\mathcal{D}^b$ 是与参数 $c_1 = 6^{-1}A_0^{-5}$, $C_1 = 6A_0^4$ 和 δ 相联系的二进方体族. 故与 S_d 和 S 相类似, 我们可以定义与 $\mathcal{D}^b$ 相联系的二进平方函数 S_d^b 和 S^b , 例如,

$$S^b(f)(x) = \left(\sum_{bQ \ni x, bQ \in \mathcal{D}^b} \|a_{bQ}(f)\|_{L^\infty(bQ)}^2 \right)^{1/2} = \left(\sum_{bQ \ni x, bQ \in \mathcal{D}^b} \left\| \sum_{u=1}^{M_{bQ}-1} \langle f, h_u^{bQ} \rangle h_u^{bQ} \right\|_{L^\infty(bQ)}^2 \right)^{1/2}. \quad (3.24)$$

显然, 存在正常数 $C_b < 1$ 使得

$$C_b S^b(f)(x) \leq S_d^b(f)(x) \leq S^b(f)(x).$$

由于定理 A 的证明仅依赖于 Haar 函数和二进方体的性质, 故结合注 2.5 知, 将定理 A 中的方体 $Q \in \mathcal{D}$ 、极大函数 f^* 和平方函数 $S_d(f)$ 分别替换成 $bQ \in \mathcal{D}^b$ 、 $f^{b*}(x) := \sup_{bP \ni x, bP \in \mathcal{D}^b} |f_{bP}|$ 和 $S_d^b(f)$ (或 $S^b(f)$) 时, 定理 A 仍成立.

4 非紧流形上平方函数的 L^p 下界最佳估计

令 M 是完备非紧且连通的 Riemann 流形, μ 和 ∇ 分别是 M 上的测度和梯度. 假设 M 满足测度双倍条件 (1.4), $\mu(M) = \infty$, 且 M 上的热核 $p_t(x, y)$ 满足 Gauss 上界 (1.9) 和梯度估计 (1.10).

本节的目的是证明定理 B. 为此一个重要的观察是 M 上的 Laplace-Beltrami 算子 Δ 满足守恒律

$$e^{-t\Delta} 1 = 1, \quad \forall t > 0, \quad (4.1)$$

参见文献 [19, (1.5)]. 另外, 算子 Δ 满足有限速度传播性质, 即存在正常数 c_0 , 使得 $\cos(t\sqrt{\Delta})$ 对应的核 $K_{\cos(t\sqrt{\Delta})}$ 满足

$$(FS) \quad \text{supp } K_{\cos(t\sqrt{\Delta})} \subset \{(x, y) \in M \times M : d(x, y) \leq c_0 t\},$$

参见文献 [20–22]. 由于 c_0 的具体的数值不是本质的, 本节总是令 $c_0 = 1$.

由 Fourier 逆变换公式知, 若 F 是有界 Borel 偶函数且 $\hat{F} \in L^1(\mathbb{R})$, 可用 $\cos(t\sqrt{\Delta})$ 来表示 $F(\sqrt{\Delta})$. 具体地,

$$F(\sqrt{\Delta}) = (2\pi)^{-1} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{F}(t) \cos(t\sqrt{\Delta}) dt,$$

再结合有限速度传播性质知,

$$K_{F(\sqrt{\Delta})}(x, y) = (2\pi)^{-1} \int_{d(x, y) \leq |t|} \hat{F}(t) K_{\cos(t\sqrt{\Delta})}(x, y) dt.$$

引理 4.1 令 M 是完备非紧且连通的 Riemann 流形, 其测度 μ 满足双倍性质 (1.4), 且 M 上的热核 $p_t(x, y)$ 满足 Gauss 上界 (1.9) 和梯度估计 (1.10). 令 $\rho > 0$, $\phi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ 是实值偶函数并满足 $\text{supp } \phi \in (-\rho, \rho)$, 作 $\varphi = \hat{\phi}$. 对每个 $t > 0$ 及 $k = 0, 1, 2, \dots$, 令 $\psi_k(t\sqrt{\Delta}) = (t^2\Delta)^k \varphi(t\sqrt{\Delta})$, 则有

(i) 算子 $\psi_k(t\sqrt{\Delta})$ 对应的核 $K_{\psi_k(t\sqrt{\Delta})}(x, y)$ 满足

$$\text{supp } K_{\psi_k(t\sqrt{\Delta})} \subset \{(x, y) \in M \times M : d(x, y) \leq \rho t\},$$

且

$$|K_{\psi_k(t\sqrt{\Delta})}(x, y)| \leq \frac{C(C_\mu, k, \rho)}{V(x, t)}, \quad \forall t > 0, \quad \forall x, y \in M;$$

(ii) 算子 $\psi_k(s\sqrt{\Delta})\psi_k(t\sqrt{\Delta})$ 对应的核 $K_{\psi_k(s\sqrt{\Delta})\psi_k(t\sqrt{\Delta})}(x, y)$ 满足

$$|K_{\psi_k(s\sqrt{\Delta})\psi_k(t\sqrt{\Delta})}(x, y)| \leq \min\left(\frac{s}{t}, \frac{t}{s}\right) \frac{C(C_\mu, k, \rho)}{V(x, \max(s, t))}, \quad \forall s, t > 0, \quad \forall x, y \in M;$$

(iii) 对任意的 $x, x', y \in M$ 和 $t > 0$, 有

$$|K_{\psi_k(t\sqrt{\Delta})}(x, y) - K_{\psi_k(t\sqrt{\Delta})}(x', y)| \leq \min\left\{\frac{d(x, x')}{t}, 1\right\} \frac{C(C_\mu, k, \rho)}{V(y, t)}. \quad (4.2)$$

证明 引理 4.1(i) 的证明是标准的, 可参见文献 [21, 23]. 引理 4.1(ii) 可利用文献 [24, 引理 2.3] 的论证技巧得到. 另外, 运用梯度估计 (1.10) 并直接计算即可得引理 4.1(iii). $\square$

令 $\psi := \psi_1$ 如引理 4.1 所示, 即对参数 $\rho > 0$, 令 $\phi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ 是实值偶函数, 且 $\text{supp } \phi \in (-\rho, \rho)$, 并作 $\psi(s) := s^2 \hat{\phi}(s)$, $s \in \mathbb{R}$. 由谱理论 [25, 26] 知, 对每个 $f \in L^2(M)$, 如下 Calderón 再生公式:

$$f = c_\psi \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0+ \\ N \rightarrow \infty}} \int_\varepsilon^N \psi(t\sqrt{\Delta}) t^2 \Delta e^{-t\sqrt{\Delta}} f \frac{dt}{t} \quad (4.3)$$

在 $L^2(M)$ 范数意义下收敛.

注意到 (M, d, μ) 是齐型空间且相应常数 $A_0 = 1$, 故可构造 M 上与参数 $\delta \leq 10^{-3}$ 相联系的二进方体族

$$\mathcal{D} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{D}_k, \quad \mathcal{D}_k = \{Q_\beta^k : \beta \in \mathcal{J}_k\}.$$

对每个 $Q_\beta^k \in \mathcal{D}_k$, $k \in \mathbb{Z}$, $\beta \in \mathcal{J}_k$, 定义

$$T_\rho(Q_\beta^k) := \{(x, t) \in M \times (0, \infty) : x \in Q_\beta^k, \rho^{-1}\delta^{k+1} \leq t < \rho^{-1}\delta^k\}, \quad (4.4)$$

其中 $\rho > 0$ 是 ϕ 支撑集中相关的参数, 见引理 4.1. 从而,

$$M \times (0, \infty) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \bigcup_{\beta \in \mathcal{J}_k} T_\rho(Q_\beta^k).$$

对任意的 $Q_{\beta_1}^k, Q_{\beta_2}^\ell \in \mathcal{D}$, 其中 $\beta_1 \neq \beta_2$ 或 $k \neq \ell$, 显然有 $T_\rho(Q_{\beta_1}^k) \cap T_\rho(Q_{\beta_2}^\ell) = \emptyset$. 因此, 由 (4.3) 知, 对每个 $f \in L^2(M)$, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= c_\psi \iint_{X \times (0, \infty)} K_{\psi(t\sqrt{\Delta})}(x, y) (t^2 \Delta e^{-t\sqrt{\Delta}} f(y)) \frac{d\mu(y)dt}{t} \\ &= c_\psi \sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{\beta \in \mathcal{J}_k} \iint_{T_\rho(Q_\beta^k)} K_{\psi(t\sqrt{\Delta})}(x, y) (t^2 \Delta e^{-t\sqrt{\Delta}} f(y)) \frac{d\mu(y)dt}{t} \\ &=: \sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{\beta \in \mathcal{J}_k} a_{\rho, Q_\beta^k}(f)(x) \\ &=: \sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{\beta \in \mathcal{J}_k} \lambda_{\rho, Q_\beta^k} b_{\rho, Q_\beta^k}(f)(x), \end{aligned} \quad (4.5)$$

其中

$$a_{\rho, Q_\beta^k}(f)(x) = c_\psi \iint_{T_\rho(Q_\beta^k)} K_{\psi(t\sqrt{\Delta})}(x, y) (t^2 \Delta e^{-t\sqrt{\Delta}} f(y)) \frac{d\mu(y)dt}{t}, \quad (4.6)$$

$$\lambda_{\rho, Q_\beta^k} = \left(\iint_{T_\rho(Q_\beta^k)} |t^2 \Delta e^{-t\sqrt{\Delta}} f(y)|^2 \frac{d\mu(y)dt}{t} \right)^{1/2}, \quad (4.7)$$

且

$$b_{\rho, Q_\beta^k}(f) = \begin{cases} 0, & \lambda_{\rho, Q_\beta^k} = 0, \\ \lambda_{\rho, Q_\beta^k}^{-1} a_{\rho, Q_\beta^k}(f), & \lambda_{\rho, Q_\beta^k} \neq 0. \end{cases} \quad (4.8)$$

我们有如下关于 $b_{\rho, Q_\beta^k}(f)$ 的基本性质.

引理 4.2 令 M 是完备非紧且连通的 Riemann 流形, 其测度 μ 满足双倍性质 (1.4), 且 M 上的热核 $p_t(x, y)$ 满足 Gauss 上界 (1.9) 和梯度估计 (1.10). 任给 $k \in \mathbb{Z}$ 和 $\beta \in \mathcal{J}_k$, 由 (4.8) 定义的函数 $b_{\rho, Q_\beta^k}(f)$ 满足如下性质:

- (i) $\text{supp } b_{\rho, Q_\beta^k}(f) \subset B(x_\beta^k, 17\delta^k)$;
- (ii) $\|b_{\rho, Q_\beta^k}(f)\|_\infty \leq C(C_\mu, \rho) \mu(Q_\beta^k)^{-1/2}$;
- (iii) 对任意的 $x, x' \in M$, 有

$$|b_{\rho, Q_\beta^k}(f)(x) - b_{\rho, Q_\beta^k}(f)(x')| \leq C(C_\mu, \rho) \min \left\{ \frac{d(x, x')}{\delta^k}, 1 \right\} \mu(Q_\beta^k)^{-1/2};$$

- (iv) $\int_M b_{\rho, Q_\beta^k}(f)(x) d\mu(x) = 0$.

证明 由 $T_\rho(Q_\beta^k)$ 和 $b_{\rho, Q_\beta^k}(f)$ 的定义, 结合引理 4.1(i) 和定理 2.2(i) 可知,

$$\text{supp } b_{\rho, Q_\beta^k}(f) \subset \{x \in M : d(x, x_\beta^k) \leq \delta^k\} \subset \{x \in M : d(x, B(x_\beta^k, 16\delta^k)) \leq \delta^k\} = B(x_\beta^k, 17\delta^k),$$

故引理 4.2(i) 得证.

关于引理 4.2(ii) 和 4.2(iii), 运用引理 4.1(i) 和 4.1(iii) 并结合双倍性质 (1.4), 直接计算可得, 也可参见文献 [27].

下面证明引理 4.2(iv). 记 $K_{t^2\Delta e^{-t\Delta}}(x, y)$ 为 $t\Delta e^{-t\Delta}$ 对应的核, 结合热核守恒律 (4.1) 及

$$t\Delta e^{-t\Delta} = -t \frac{d}{dt} e^{-t\Delta}$$

可知

$$\int_M K_{t\Delta e^{-t\Delta}}(x, y) d\mu(y) = 0, \quad \forall t > 0, \quad x \in M. \quad (4.9)$$

回顾 $\psi(s) = \psi_1(s) = s^2 \widehat{\phi}(s) = s^2 \psi_0(s)$, $s \in \mathbb{R}$, 其中 ψ_0 、 ψ_1 和 ϕ 是引理 4.1 中定义的函数. 任给 $m \geq n/2 + 1$ 和 $t > 0$, 其中 n 是 (1.5) 中常数. 由谱理论知,

$$\psi(t\sqrt{\Delta}) = (t\sqrt{\Delta})^2 (1 + t^2\Delta)^{-m} ((1 + t^2\Delta)^m \psi_0(t\sqrt{\Delta})),$$

且

$$(t\sqrt{\Delta})^2 (1 + t^2\Delta)^{-m} = \frac{1}{(m-1)!} \int_0^\infty (t^2 s \Delta e^{-t^2 s \Delta}) e^{-s} s^{m-2} ds.$$

再结合 (4.9) 和 Fubini 定理可推导出, 对任意的 $t > 0$ 和 $y \in M$, 有

$$\int_M K_{\psi(t\sqrt{\Delta})}(x, y) d\mu(x) = 0.$$

从而引理 4.2(iv) 得证. 综上, 引理 4.2 证毕. □

结合定理 2.1(iii)、2.2(i) 和引理 4.2(i) 可知, 当 $\lambda_{\rho, Q_\beta^k} \neq 0$ 时,

$$B\left(x_\beta^k, \frac{\delta^k}{3}\right) \subset Q_\beta^k \subset \text{supp } b_{\rho, Q_\beta^k}(f) \subset B(x_\beta^k, 17\delta^k).$$

再运用定理 2.2(ii) 可推知, 存在某个映射

$$E_1 : \mathcal{D} \rightarrow \bigcup_{b=1}^L \mathcal{D}^b$$

满足: 对每个 $Q_\beta^k \in \mathcal{D}$, 存在 $b \in \{1, 2, \dots, L\}$ 使得 $E_1(Q_\beta^k) \in \mathcal{D}^b$, $\text{supp } b_{Q_\beta^k}(f) \subset E_1(Q_\beta^k)$ 且 $\text{diam}(E_1(Q)) \leq C_\delta \delta^k$, 其中常数 C_δ 不依赖于 Q_β^k 和参数 ρ . 在此基础上, 我们可定义与 Δ 相联系的离散型平方函数

$$\mathcal{A}_{\Delta, \rho}(f)(x) := \left(\sum_{Q \in \mathcal{D}} \frac{|\lambda_{\rho, Q}|^2}{\mu(Q)} \chi_{E_1(Q)}(x) \right)^{1/2}. \quad (4.10)$$

另外注意到 $\mathcal{A}_{\Delta, \rho}(f)$ 的定义与引理 4.1 中的参数 ρ 相关. 进一步, 利用双倍性质 (1.4) 可知,

$$\mathcal{A}_{\Delta, \rho}(f)(x) \simeq \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{\rho^{-1}\delta^{k+1}}^{\rho^{-1}\delta^k} \int_{\Omega_k(x)} |t^2 \Delta e^{-t\sqrt{\Delta}} f(y)|^2 \frac{d\mu(y)}{V(x, t)} \frac{dt}{t} \right)^{1/2},$$

其中

$$\Omega_k(x) = \bigcup_{Q \in \mathcal{D}_k, x \in E_1(Q)} Q.$$

对每个 $\alpha > 0$, 运用映射 E_1 的定义和性质可知, 可选定某个 $\rho = \rho(\alpha, \delta)$ 使得对任意的 $(y, t) \in \Omega_k(x) \times [\rho^{-1}\delta^{k+1}, \rho^{-1}\delta^k]$, 有 $d(x, y) < \alpha t$.

该事实说明, 对每个 $\alpha > 0$, 可选定参数 $\rho = \rho(\alpha, \delta)$, 使得

$$\mathcal{A}_{\Delta, \rho}(f)(x) \leq CS_{\Delta, \alpha}(f)(x), \quad \forall f \in L^2(M), \quad (4.11)$$

其中 $C = C(C_\mu, \alpha)$.

定理 B 的证明 任给 $f \in L^p(M)$, 其中 p 充分大且固定, 不妨设 $p > 2$. 显然存在子列 $\{f_k\}$, 其中每个 f_k 都是 $L^p(M) \cap L^2(M)$ 函数, 且

$$\|f\|_{L^p(M)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k\|_{L^p(M)}.$$

再结合 $S_{\Delta, \alpha}$ 的 L^p 有界性^[11-13] 可知,

$$\|S_{\Delta, \alpha} f\|_{L^p(M)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|S_{\Delta, \alpha} f_k\|_{L^p(M)}.$$

因此, 为证明定理 B, 只需考虑 $f \in L^p(M) \cap L^2(M)$ 的情形, 此时一个可利用的关键估计是 (4.11).

运用估计 (4.11), 只需证当用 $\mathcal{A}_{\Delta, \rho}(f)$ 替换 $S_{\Delta, \alpha}(f)$ 时, (1.12) 亦成立, 其中参数 $\rho = \rho(\alpha, \delta)$ 的取值满足 (4.11) 即可. 下面的论证中总是固定参数 ρ 使得 (4.11) 成立.

对每个 $b \in \{1, 2, \dots, L\}$ 、 $N \in \mathbb{N}$ 和 $f \in L^p(M) \cap L^2(M)$, 令

$$f_{b, N}(x) := \sum_{|k| \leq N} \sum_{E_1(Q) \in \mathcal{D}_k^b} \lambda_{\rho, Q} b_{\rho, Q}(f)(x),$$

并形式地定义

$$\mathcal{A}_{\Delta, \rho}(f_{b, N})(x) := \left(\sum_{|k| \leq N} \sum_{E_1(Q) \in \mathcal{D}_k^b} \frac{|\lambda_{\rho, Q}|^2}{\mu(Q)} \chi_{E_1(Q)}(x) \right)^{1/2}.$$

我们断言: 存在不依赖于 f 、 b 和 N 的常数 $C_{19} = C_{19}(C_\mu, \alpha) > 0$ 使得

$$S^b(f_{b, N})(x) \leq C_{19} \mathcal{A}_{\Delta, \rho}(f_{b, N})(x), \quad (4.12)$$

其中 S^b 的定义如注 3.4 所示. 事实上, 任给 $P \in \mathcal{D}^b$, 不妨记 $P \in \mathcal{D}_{k_P}^b$ 且令 x_P 表示 P 的中心. 结合引理 4.2、定理 2.3 和注 2.5 知,

$$\begin{aligned} |a_P(f_{b, N})(x)| &= \left| \sum_{|k| \leq N} \sum_{\substack{E_1(Q) \in \mathcal{D}_k^b \\ P \subset E_1(Q)}} \lambda_{\rho, Q} \sum_{u=1}^{M_P-1} \langle b_{\rho, Q}(f), h_u^P \rangle h_u^P(x) \right| \\ &= \left| \sum_{|k| \leq N} \sum_{\substack{E_1(Q) \in \mathcal{D}_k^b \\ P \subset E_1(Q)}} \lambda_{\rho, Q} \sum_{u=1}^{M_P-1} \langle b_{\rho, Q}(f) - b_{\rho, Q}(f)(x_P), h_u^P \rangle h_u^P(x) \right| \\ &\leq C(C_\mu, \rho) \sum_{|k| \leq N} \sum_{\substack{E_1(Q) \in \mathcal{D}_k^b \\ P \subset E_1(Q)}} (M_P - 1) |\lambda_{\rho, Q}| \frac{\text{diam}(E_1(Q))}{\text{diam}(P) \mu(E_1(Q))^{1/2}}. \end{aligned}$$

由双倍性质知, 存在正常数 $M_L = M_L(C_\mu, \delta)$ 和 $N_L = M_L(C_\mu, \delta)$ 使得

$$1 \leq M_P \leq M_L, \quad \forall P \in \mathcal{D}^b, \quad \forall b \in \{1, 2, \dots, L\},$$

且

$$0 \leq \#\{Q \in \mathcal{D} : E_1(Q) = R\} \leq N_L, \quad \forall R \in \mathcal{D}^b, \quad \forall b \in \{1, 2, \dots, L\}.$$

从而,

$$\begin{aligned} (S^b(f_{b,N}))^2(x) &= \sum_{P \in \mathcal{D}^b} \|a_P(f_{b,N})\|_\infty^2 \chi_P(x) \\ &\leq CM_L^2 \sum_{P \in \mathcal{D}^b} \left(\sum_{|k| \leq N} \sum_{\substack{E_1(Q) \in \mathcal{D}_k^b \\ P \subset E_1(Q)}} |\lambda_{\rho,Q}| \frac{\text{diam}(E_1(Q))}{\text{diam}(P)} \frac{\mu(P)^{1/2}}{\mu(E_1(Q))^{1/2}} \chi_{E_1(Q)}(x) \right)^2 \\ &\leq CM_L^2 \sum_{P \in \mathcal{D}^b} \sum_{-N \leq k \leq \min\{N, k_P\}} 2^{k_P-k} \left(\sum_{\substack{E_1(Q) \in \mathcal{D}_k^b \\ P \subset E_1(Q)}} |\lambda_{\rho,Q}| \delta^{k_P-k} \frac{1}{\mu(E_1(Q))^{1/2}} \chi_{E_1(Q)}(x) \right)^2 \\ &\leq CM_L^2 N_L \sum_{P \in \mathcal{D}^b} \sum_{-N \leq k \leq \min\{N, k_P\}} 2^{k_P-k} \sum_{\substack{E_1(Q) \in \mathcal{D}_k^b \\ P \subset E_1(Q)}} |\lambda_{\rho,Q}|^2 \delta^{2(k_P-k)} \frac{1}{\mu(E_1(Q))} \chi_{E_1(Q)}(x) \\ &= CM_L^2 N_L \sum_{|k| \leq N} \sum_{E_1(Q) \in \mathcal{D}_k^b} \left(\sum_{P \in \mathcal{D}^b: P \subset E_1(Q)} (2\delta^2)^{k_P-k} \right) \frac{|\lambda_{\rho,Q}|^2}{\mu(E_1(Q))} \chi_{E_1(Q)}(x) \\ &\leq CM_L^2 N_L \sum_{|k| \leq N} \sum_{E_1(Q) \in \mathcal{D}_k^b} \frac{|\lambda_{\rho,Q}|^2}{\mu(E_1(Q))} \chi_{E_1(Q)}(x) \\ &= CM_L^2 N_L (\mathcal{A}_{\Delta, \rho}(f_{b,N}))^2(x). \end{aligned}$$

故 (4.12) 得证.

注意到 $f = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{b=1}^L f_{b,N}$ 在 $L^2(M)$ 范数意义下收敛, 且由 Riesz 定理可知存在子序列 $\{|\sum_{b=1}^L f_{b,N_i}|^p\}_i$ 使得

$$|f(x)|^p = \lim_{i \rightarrow \infty} \left| \sum_{b=1}^L f_{b,N_i}(x) \right|^p$$

对几乎处处 $x \in M$ 成立. 进一步, 运用 Fatou 引理可知,

$$\|f\|_{L^p(M)} \leq \varliminf_{i \rightarrow \infty} \left\| \sum_{b=1}^L f_{b,N_i} \right\|_{L^p(M)},$$

且对每个 $b \in \{1, 2, \dots, L\}$ 、 $N_i \in \mathbb{N}$ 和 $x \in M$, 有

$$\mathcal{A}_{\Delta, \rho}(f_{b,N_i})(x) \leq \mathcal{A}_{\Delta, \rho}(f)(x).$$

综上, 结合定理 A(iii) 和注 3.4 知, 当 $p \rightarrow \infty$ 时,

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^p(M, d\mu)} &\leq \varliminf_{i \rightarrow \infty} \left\| \sum_{b=1}^L f_{b,N_i} \right\|_{L^p(M)} \leq \sum_{b=1}^L \varliminf_{i \rightarrow \infty} \|f_{b,N_i}\|_{L^p(M)} \\ &\leq Cp^{1/2} \sum_{b=1}^L \varliminf_{i \rightarrow \infty} \|S^b(f_{b,N_i})\|_{L^p(M)} \\ &\leq Cp^{1/2} \sum_{b=1}^L \|\mathcal{A}_{\Delta, \rho}(f_{b,N})\|_{L^p(M)} \end{aligned}$$

$$\leq Cp^{1/2}\|\mathcal{A}_{\Delta,\rho}(f)\|_{L^p(M)}.$$

结合 (4.11) 知定理 B 得证. □

致谢 作者感谢陈鹏有益的讨论.

参考文献

- 1 Chang S Y A, Wilson J M, Wolff T H. Some weighted norm inequalities concerning the Schrödinger operators. *Comment Math Helv*, 1985, 60: 217–246
- 2 Fefferman R, Pipher J. Multiparameter operators and sharp weighted inequalities. *Amer J Math*, 1997, 119: 337–369
- 3 Wilson J M. Weighted norm inequalities for the continuous square function. *Trans Amer Math Soc*, 1989, 314: 661–692
- 4 Wilson J M. Weighted Littlewood-Paley Theory and Exponential-Square Integrability. *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 1924. Berlin: Springer, 2008
- 5 Grafakos L, Honzik P, Seeger A. On maximal functions for Mihlin-Hörmander multipliers. *Adv Math*, 2006, 204: 363–378
- 6 Coifman R R, Weiss G. *Analyse Harmonique Non-Commutative Sur Certains Espaces Homogènes*. *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 242. Berlin: Springer, 1971
- 7 Hytönen T, Kairema A. Systems of dyadic cubes in a doubling metric space. *Colloq Math*, 2012, 126: 1–33
- 8 Kairema A, Li J, Pereyra M C, et al. Haar bases on quasi-metric measure spaces, and dyadic structure theorems for function spaces on product spaces of homogeneous type. *J Funct Anal*, 2016, 271: 1793–1843
- 9 Li P, Yau S T. On the parabolic kernel of the Schrödinger operator. *Acta Math*, 1986, 156: 153–201
- 10 Ouhabaz E M. *Analysis of Heat Equations on Domains*. London Mathematical Society Monographs, vol. 31. Princeton: Princeton University Press, 2005
- 11 Auscher P. On Necessary and Sufficient Conditions for L^p -Estimates of Riesz Transforms Associated to Elliptic Operators on $\mathbb{R}^n$ and Related Estimates. *Memoirs of the American Mathematical Society*, vol. 186. Providence: Amer Math Soc, 2007
- 12 Auscher P, Hofmann S, Martell J M. Vertical versus conical square functions. *Trans Amer Math Soc*, 2012, 364: 5469–5489
- 13 Gong R M, Yan L X. Weighted L^p estimates for the area integral associated to self-adjoint operators. *Manuscripta Math*, 2014, 144: 25–49
- 14 Auscher P, Hytönen T. Orthonormal bases of regular wavelets in spaces of homogeneous type. *Appl Comput Harmon Anal*, 2013, 34: 266–296
- 15 Lieb E H, Loss M. *Analysis*, 2nd ed. Providence: Amer Math Soc, 2001
- 16 Hytönen T, Pérez C, Rela E. Sharp reverse Hölder property for A_∞ weights on spaces of homogeneous type. *J Funct Anal*, 2012, 263: 3883–3899
- 17 Wilson J M. A sharp inequality for the square function. *Duke Math J*, 1987, 55: 879–887
- 18 Stein E M. *Harmonic Analysis: Real Variable Methods, Orthogonality and Oscillatory Integrals*. Princeton: Princeton University Press, 1993
- 19 Auscher P, Coulhon T, Duong X T, et al. Riesz transform on manifolds and heat kernel regularity. *Ann Sci Éc Norm Supér*, 2004, 37: 911–957
- 20 Cheeger J, Gromov M, Taylor M. Finite propagation speed, kernel estimates for functions of the Laplace operator, and the geometry of complete Riemannian manifolds. *J Differential Geom*, 1982, 17: 15–53
- 21 Sikora A. Riesz transform, Gaussian bounds and the method of wave equation. *Math Z*, 2004, 247: 643–662
- 22 Coulhon T, Sikora A. Gaussian heat kernel upper bounds via the Phragmén-Lindelöf theorem. *Proc Lond Math Soc* (3), 2008, 96: 507–544
- 23 Hofmann S, Lu G Z, Mitrea D, et al. Hardy Spaces Associated to Nonnegative Self-Adjoint Operators Satisfying Davies-Gaffney Estimates. *Memoirs of the American Mathematical Society*, vol. 214. Providence: Amer Math Soc, 2011
- 24 Song L, Yan L X. A maximal function characterization for Hardy spaces associated to nonnegative self-adjoint operators satisfying Gaussian estimates. *Adv Math*, 2016, 287: 463–484
- 25 Albrecht D, Duong X T, McIntosh A. Operator theory and harmonic analysis. In: *Proceedings of the Centre for Mathematics and its Applications, Australian National University*, vol. 34. Instructional Workshop on Analysis and Geometry, Part III (Canberra, 1995). Canberra: Australian National University, 1996, 77–136
- 26 Yosida K. *Functional Analysis*, 5th ed. Berlin: Springer-Verlag, 1978

- 27 Chen P, Duong X T, Wu L C, et al. Exponential-square integrability, weighted inequalities for the square functions associated to operators and applications. ArXiv:1609.01516, 2016

Characterizations of the exponential square class on spaces of homogeneous type and applications

Liangchuan Wu & Lixin Yan

Abstract Let (X, d, μ) be a space of homogeneous type. We establish three equivalent characterizations of the exponential square class associated to the classical dyadic square function on (X, d, μ) : exponential square integrability, improved good- λ inequalities, and the sharp L^p lower bound for the classical dyadic square function. This result generalizes the famous Chang-Wilson-Wolff theorem on $\mathbb{R}^n$. We then apply this result to obtain sharp L^p estimates for the square function associated to the Laplace-Beltrami operator on Riemannian manifolds with nonnegative Ricci curvature.

Keywords exponential square class, square functions, good- λ inequality, Laplace-Beltrami operators, spaces of homogeneous type

MSC(2010) 42B20, 42B25, 47B38, 58G35

doi: 10.1360/N012017-00136