关于 $\bar{d}$ -跟踪性质的一些注记

吴新星

电子科技大学数学学院, 成都 611731
E-mail: wuxinxing5201314@163.com

收稿日期: 2013-11-20; 接受日期: 2014-09-16

四川省教育厅基金 (批准号: 14ZB0007) 和四川理工学院科研项目 (批准号: 2014RC02) 资助项目

摘要 $\bar{d}$ -和 d -跟踪性质是 Dastjerdi 和 Hosseini 为推广伪轨跟踪性质于 2010 年提出的. 本文考察该动力性质在迭代系统和逆极限系统下的性质. 首先证明对动力系统 (X, f) , 以下三命题等价: (1) f 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质 (d -跟踪性质); (2) 对任意 $k \in \mathbb{N}$, f^k 也具有 $\bar{d}$ -跟踪性质 (d -跟踪性质); (3) 存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 f^k 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质 (d -跟踪性质). 进而证明具有 $\bar{d}$ -跟踪性质的系统是链混合的. 最后得到对于由 $\{X_i, \varphi_i, f_i\}_{i=1}^\infty$ 生成的逆极限系统 (X_∞, f_∞) , 若每个 f_i 均具有 $\bar{d}$ -跟踪性质 (或者, d -跟踪性质, 遍历跟踪性), 则诱导映射 f_∞ 也具有 $\bar{d}$ -跟踪性质 (相应地, d -跟踪性质, 遍历跟踪性).

关键词 $\bar{d}$ -跟踪性质 d -跟踪性质 链混合 逆极限系统

MSC (2010) 主题分类 54H20, 37B40, 37D45, 28D20

1 引言及基本定义

设 (X, d) 为紧致度量空间, 若映射 $f: X \rightarrow X$ 为连续满射, 则称 (X, f) 为一动力系统. 在动力系统的研究中, 由于大部分系统的精确解无法得到, 学者们常用数值计算的方法来模拟所研究系统的轨道, 而计算误差的存在便不可避免地导致“伪轨”的产生. 众所周知, 如果一个系统具有“通常意义下的伪轨跟踪性”, 则对任意一个单步误差足够小的伪轨必然被某条真实轨道跟踪, 并且其“跟踪误差”一致有界. 这说明在某种意义上, 数值计算得到的伪轨能够真实反映系统的局部动力学行为.

以下首先给出伪轨跟踪性的基本定义. 为后面叙述方便, 我们引入如下的记号. 贯穿全文, 置 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, $\mathbb{Z}^+ = \{0, 1, 2, \dots\}$. 对于 X 的任意一个无限序列 $\mathbf{x} := \{x_i\}_{i=0}^\infty$ 和任意 $z \in X$, 任意 $\delta > 0$, 令

$$\begin{aligned} B_n(\mathbf{x}, f, \delta) &= \{i \in \mathbb{Z}^+ : 0 \leq i < n, d(f(x_i), x_{i+1}) < \delta\}, \\ B_n^c(\mathbf{x}, f, \delta) &= \{i \in \mathbb{Z}^+ : 0 \leq i < n, d(f(x_i), x_{i+1}) \geq \delta\}, \\ B_n(z, \mathbf{x}, f, \delta) &= \{i \in \mathbb{Z}^+ : 0 \leq i < n, d(f^i(z), x_i) < \delta\}, \\ B_n^c(z, \mathbf{x}, f, \delta) &= \{i \in \mathbb{Z}^+ : 0 \leq i < n, d(f^i(z), x_i) \geq \delta\}. \end{aligned}$$

X 中的序列 $\mathbf{x} = \{x_i\}_{i=0}^K$ 被称为是 f 的 δ -伪轨 (δ -pseudo-orbit), 如果对任意 $0 \leq i < K$, 恒有 $d(f(x_i), x_{i+1}) < \delta$. 特别地, 若 $K < \infty$, 则称这个有限的 δ -伪轨 $\{x_i\}_{i=0}^K$ 为 f 的从 x_0 到 x_K 的长度为 K 的 δ -链. 如果对任意 $\delta > 0$ 及任意 $x, y \in X$, 均存在从 x 到 y 的 δ -链, 则称 f 是链传递的. 如果

对任意 $n \in \mathbb{N}$, f^n 均为链传递的, 则称 f 是完全链传递的. 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对任意 $x, y \in X$ 及任意 $n \geq N$, f 存在从 x 到 y 长度为 n 的 ε -链, 则称 f 是链混合的.

如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对 f 的任意 δ -伪轨 $\{x_i\}_{i=0}^{\infty}$, 存在 $z \in X$ 满足对任意 $i \in \mathbb{Z}^+$, $d(f^i(z), x_i) < \varepsilon$, 则称 (X, f) 具有伪轨跟踪性质.

由伪轨跟踪性质的定义及现实意义下的动力系统数值计算方法知, 跟踪性质有两个基本要素: (1) 伪轨的刻画; (2) 跟踪方式的刻画. 基于对以上两个基本要素的不同理解, 学者们相继提出各种各样的跟踪性质, 如平均跟踪性质 (average shadowing property) [1], 极限跟踪性质 (limit shadowing property) [2], 渐近平均跟踪性质 (asymptotic average shadowing property) [3], 遍历跟踪性质 (ergodic shadowing property) [4], $\bar{d}$ -和 $\underline{d}$ -跟踪性质 ($\bar{d}$ - and $\underline{d}$ -shadowing property) [5] 以及 $\mathcal{F}$ -跟踪性质 ($\mathcal{F}$ -shadowing property) [6] 等. 在此, 我们仅给出本文需要的“跟踪性”的定义. 对于其他的跟踪性质, 请读者参见相关文献 (如, 文献 [1-16]), 此处概不赘述.

定义 1.1 (参见文献 [1]) (1) X 中的序列 $\mathbf{x} = \{x_i\}_{i=0}^{\infty}$ 被称为是 f 的 δ -平均伪轨 (δ -average-pseudo-orbit), 如果存在 $N_\delta > 0$, 使得对任意 $n \geq N_\delta$ 及任意 $k \in \mathbb{Z}^+$, 恒有 $\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} d(f(x_{i+k}), x_{i+k+1}) < \delta$. 称系统 (X, f) 具有平均跟踪性质, 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对 f 的任意 δ -平均伪轨 $\{x_i\}_{i=0}^{\infty}$, 存在 $z \in X$ 满足 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} d(f^i(z), x_i) < \varepsilon$.

(2) X 中的序列 $\mathbf{x} = \{x_i\}_{i=0}^{\infty}$ 被称为是 f 的渐近平均伪轨 (asymptotic-average pseudo-orbit), 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} d(f(x_i), x_{i+1}) = 0$. 称系统 (X, f) 具有渐近平均跟踪性质, 如果对 f 的任意渐近平均伪轨 $\{x_i\}_{i=0}^{\infty}$, 存在 $z \in X$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} d(f^i(z), x_i) = 0$.

2010 年, Fakhari 和 Ghane [4] 将 δ -伪轨推广到 δ -遍历伪轨 (δ -ergodic pseudo-orbit), 并提出了遍历跟踪性质的概念. 利用遍历跟踪性质, 他们同时证明了以下 4 命题等价: (1) f 具有遍历跟踪性质; (2) f 具有伪轨跟踪性质和链混合的; (3) f 具有伪轨跟踪性质和拓扑混合的; (4) f 具有伪轨 specification 性质.

定义 1.2 (参见文献 [4]) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(\mathbf{x}, f, \delta)| = 1$, 则称 X 中的序列 $\mathbf{x} = \{x_i\}_{i=0}^{\infty}$ 是 f 的 δ -遍历伪轨.

定义 1.3 (参见文献 [4]) 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对 f 的任意 δ -遍历伪轨 $\mathbf{x}$, 存在 $z \in X$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbf{x}, f, \varepsilon)| = 1$, 则称系统 (X, f) 具有遍历跟踪性质.

几乎在同时, Dastjerdi 和 Hosseini [5] 利用 δ -遍历伪轨定义了 $\bar{d}$ -跟踪性质和 $\underline{d}$ -跟踪性质.

定义 1.4 (参见文献 [5, 定义 2.1]) 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对 f 的任意 δ -遍历伪轨 $\mathbf{x}$, 存在 $z \in X$ 满足 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbf{x}, f, \varepsilon)| > 1/2$ (或者, $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbf{x}, f, \varepsilon)| > 0$), 则称系统 (X, f) 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质 (相应地, $\underline{d}$ -跟踪性质).

对于 $\underline{d}$ -跟踪性质, Dastjerdi 和 Hosseini [5] 证明了如下结论:

定理 1.5 (参见文献 [5, 定理 2.2, 定理 2.5]) 假设 (X, f) 为一动力系统.

(1) 若 f 具有 $\underline{d}$ -跟踪性质或者 $\bar{d}$ -跟踪性质, 则 f 是链传递的.

(2) 若 f 具有 $\underline{d}$ -跟踪性质, 则对任意 $k \in \mathbb{N}$, f^k 均具有 $\underline{d}$ -跟踪性质.

受此启发, 我们自然要问: 对于 $\bar{d}$ -跟踪性质是否具有和定理 1.5 中 (1) 和 (2) 相似的结论, 同时, $\underline{d}$ 和 $\bar{d}$ -跟踪性质在逆极限系统中是否保持呢?

我们发现, 文献 [5] 中虽然同时提出 $\bar{d}$ -跟踪性质和 $\underline{d}$ -跟踪性质, 却未能得出 $\bar{d}$ -跟踪性质的相关动力学性质, 究其原因在于应用文献 [5] 中的方法无法回答 $\bar{d}$ -跟踪性质是否具有迭代不变性, 自然导致相关的结论不能应用到 $\bar{d}$ -跟踪性质上. 本文利用三角不等式和映射的一致连续性, 首先证明 $\bar{d}$ -跟踪性质的迭代不变性. 由此得出 $\bar{d}$ -跟踪性质蕴含链混合性. 同时, 还就 $\bar{d}$ -跟踪性质中上极限

$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbb{x}, f, \varepsilon)|$ 的取值是大于 “1/2”, 而不是 $[0, 1)$ 之间的其他实数给出了解释, 指出该取值恰到好处. 本文最后研究逆极限系统的 $\bar{d}$ -跟踪性质, $\underline{d}$ -跟踪性质和遍历跟踪性质.

2 $\bar{d}$ -跟踪性质的一些基本性质

正如引言所述, 本节致力于考察 k -次迭代系统 (X, f^k) 的 $\bar{d}$ -跟踪性质 (引理 2.1 和 2.2). 利用该结论, 进一步得出系统 (X, f) 是链混合的, 如果 f 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质.

对任意 $A \subset \mathbb{Z}^+$ 及任意 $k \in \mathbb{N}$, 置 $A+k = \{j+k : j \in A\} \cap \mathbb{Z}^+$, $A-k = \{j-k : j \in A\} \cap \mathbb{Z}^+$, $k \cdot A = \{k \cdot j : j \in A\}$. 对任意 $A_1, \dots, A_n \subset \mathbb{Z}^+$, 不难证明对任意 $k \in \mathbb{N}$,

$$\bigcap_{i=1}^n (A_i + k) = \left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right) + k. \quad (2.1)$$

引理 2.1 设 (X, f) 为一动力系统. 如果 f 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质, 则对任意 $k \in \mathbb{N}$, f^k 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质.

证明 任意给定 $\varepsilon > 0$, 注意到 f 一致连续, 则存在 $\varepsilon_1 \in (0, \varepsilon/4)$, 使得

$$\text{对任意 } x, y \in X \text{ 满足 } d(x, y) < \varepsilon_1 \text{ 和任意 } 0 \leq i \leq k, \text{ 恒有 } d(f^i(x), f^i(y)) < \frac{\varepsilon}{4}. \quad (2.2)$$

由于 f 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质, 所以存在 $\delta \in (0, \varepsilon_1)$, 使得对 f 的任意 δ -遍历伪轨 $\{y_i\}_{i=0}^\infty$, 存在 $y \in X$ 满足 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(y, \{y_i\}_{i=0}^\infty, f, \varepsilon_1)| > 1/2$.

任取 f^k 的 δ -遍历伪轨 $\mathbb{x} = \{e_i\}_{i=0}^\infty$, 同时置 $x_{ik+j} = f^j(e_i) \ (\forall i \in \mathbb{Z}^+, 0 \leq j < k)$.

易知 $\mathbb{y} := \{x_i\}_{i=0}^\infty$ 为 f 的一个 δ -遍历伪轨. 由以上的讨论知

$$\text{存在 } z \in X, \text{ 使得 } \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbb{y}, f, \varepsilon_1)| > \frac{1}{2}. \quad (2.3)$$

断言 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbb{x}, f^k, \varepsilon)| > 1/2$.

断言的证明 (反证法) 假设 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbb{x}, f^k, \varepsilon)| \leq 1/2$, 由于

$$\frac{1}{n} (|B_n(z, \mathbb{x}, f^k, \varepsilon)| + |B_n^c(z, \mathbb{x}, f^k, \varepsilon)|) = 1,$$

则有

$$\xi := \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n^c(z, \mathbb{x}, f^k, \varepsilon)| = 1 - \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbb{x}, f^k, \varepsilon)| \geq \frac{1}{2}. \quad (2.4)$$

所以对任意取定的 $Q \in \mathbb{N}$, 存在 $N_Q^{(1)} \in \mathbb{N}$, 使得任意 $n \geq N_Q^{(1)}$,

$$\frac{1}{n} |B_n^c(z, \mathbb{x}, f^k, \varepsilon)| \geq \xi - \frac{1}{2Q}. \quad (2.5)$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(\mathbb{x}, f^k, \delta) + 1| = 1$, 同时结合

$$\begin{aligned} |(B_n(\mathbb{x}, f^k, \delta) + 1) \cap B_n^c(z, \mathbb{x}, f^k, \varepsilon)| &= |(B_n(\mathbb{x}, f^k, \delta) + 1)| + |B_n^c(z, \mathbb{x}, f^k, \varepsilon)| \\ &\quad - |(B_n(\mathbb{x}, f^k, \delta) + 1) \cup B_n^c(z, \mathbb{x}, f^k, \varepsilon)|, \end{aligned}$$

利用 (2.5) 式, 不难证明

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |(B_n(\mathbb{x}, f^k, \delta) + 1) \cap B_n^c(z, \mathbb{x}, f^k, \varepsilon)| \geq \xi - \frac{1}{2Q}. \quad (2.6)$$

这便说明存在 $N_Q^{(2)} \in \mathbb{N}$, 使得任意 $n \geq N_Q^{(2)}$,

$$\frac{1}{n} |(B_n(\mathbb{x}, f^k, \delta) + 1) \cap B_n^c(z, \mathbb{x}, f^k, \varepsilon)| \geq \xi - \frac{1}{Q}. \quad (2.7)$$

任取 $i \in \Omega_n := (B_n(\mathbb{x}, f^k, \delta) + 1) \cap B_n^c(z, \mathbb{x}, f^k, \varepsilon)$ ($n \geq N_Q^{(2)}$), 对任意 $1 \leq j < k$, 应用三角不等式

$$\begin{aligned} \varepsilon &\leq d(f^{ik}(z), x_{ik}) \leq d(f^j(f^{ik-j}(z)), f^j(x_{ik-j})) + d(f^j(x_{ik-j}), x_{ik}) \\ &< d(f^j(f^{ik-j}(z)), f^j(x_{ik-j})) + \delta \quad (\text{因 } f^j(x_{ik-j}) = f^k(x_{(i-1)k}) \text{ 并且 } i-1 \in B_n(\mathbb{x}, f^k, \delta)), \end{aligned}$$

便有

$$d(f^j(f^{ik-j}(z)), f^j(x_{ik-j})) > \varepsilon - \delta > \frac{3\varepsilon}{4}. \quad (2.8)$$

由此和 (2.2) 式可得对任意 $i \in \Omega_n$ ($n \geq N_Q^{(2)}$) 及任意 $1 \leq j < k$, 恒有

$$d(f^{ik-j}(z), x_{ik-j}) \geq \varepsilon_1. \quad (2.9)$$

所以对任意 $n \geq N_Q^{(2)}$,

$$B_{nk}^c(z, \mathbb{y}, f, \varepsilon_1) \supset \bigcup_{j=0}^{k-1} (k \cdot \Omega_n - j),$$

注意到 $k \cdot \Omega_n, k \cdot \Omega_n - 1, \dots, k \cdot \Omega_n - (k-1)$ 是互不相交的, 进而

$$|B_{nk}^c(z, \mathbb{y}, f, \varepsilon_1)| \geq \left| \bigcup_{j=0}^{k-1} (k \cdot \Omega_n - j) \right| = k|\Omega_n|, \quad (2.10)$$

即

$$\frac{|B_{nk}^c(z, \mathbb{y}, f, \varepsilon_1)|}{nk} \geq \frac{|(B_n(\mathbb{x}, f^k, \delta) + 1) \cap B_n^c(z, \mathbb{x}, f^k, \varepsilon)|}{n} \geq \xi - \frac{1}{Q}. \quad (2.11)$$

由此可知, 对任意 $m \geq N_Q^{(2)} \cdot k$, 恒有

$$\begin{aligned} \frac{|B_m^c(z, \mathbb{y}, f, \varepsilon_1)|}{m} &\geq \frac{|B_{[m/k]k}^c(z, \mathbb{y}, f, \varepsilon_1)|}{([m/k]+1)k} \geq \frac{|B_{([m/k]+1)k}^c(z, \mathbb{y}, f, \varepsilon_1)| - k}{([m/k]+1)k} \\ &\geq \frac{|B_{([m/k]+1)k}^c(z, \mathbb{y}, f, \varepsilon_1)|}{([m/k]+1)k} - \frac{1}{[m/k]+1} \geq \xi - \frac{1}{Q} - \frac{1}{[m/k]+1}. \end{aligned} \quad (2.12)$$

因此

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n^c(z, \mathbb{y}, f, \varepsilon_1)| \geq \xi - \frac{1}{Q}. \quad (2.13)$$

由 Q 的任意性, 故而

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n^c(z, \mathbb{y}, f, \varepsilon_1)| \geq \xi \geq \frac{1}{2}.$$

由此不难证明

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbb{y}, f, \varepsilon_1)| = 1 - \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n^c(z, \mathbb{y}, f, \varepsilon_1)| \leq 1 - \xi \leq \frac{1}{2},$$

这与 (2.3) 式矛盾, 断言得证.

由 ε 及 $\mathbb{x}$ 的任意性自然得知, f^k 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质. $\square$

引理 2.2 设 (X, f) 为一动力系统. 如果存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 f^k 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质, 则 f 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质.

证明 任取 $\varepsilon > 0$, 由文献 [17, 引理 1.2] 知, 存在 $\gamma \in (0, \varepsilon/2)$, 使得对任意长度为 $k+1$ 的 γ -链 $\{x_i\}_{i=0}^{k+1}$ 及任意 $z \in \mathcal{N}(x_0, \gamma) := \{x \in X : d(x, x_0) < \gamma\}$, 恒有 $d(f^i(z), x_i) < \varepsilon$ ($\forall i \in \{0, 1, \dots, k\}$).

由于 f^k 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质, 则对于 $\gamma/4 > 0$, 存在 $\delta \in (0, \gamma/4)$, 使得对 f^k 的任意 δ -遍历伪轨 $\{y_i\}_{i=0}^\infty$, 存在 $y \in X$ 满足 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(y, \{y_i\}_{i=0}^\infty, f^k, \gamma/4)| > 1/2$. 再次利用文献 [17, 引理 1.2], 存在 $\delta' \in (0, \delta/2)$, 使得对任意长度为 $k+1$ 的 δ' -链 $\{x_i\}_{i=0}^{k+1}$ 及任意 $z \in \mathcal{N}(x_0, \delta')$, 恒有 $d(f^i(z), x_i) < \delta$ ($\forall i \in \{0, 1, \dots, k\}$).

任取 f 的 δ' -遍历伪轨 $\mathbb{x} = \{x_i\}_{i=0}^\infty$, 同时置 $\mathbb{z} = \{z_i = x_{ik}\}_{i=0}^\infty$, 并且

$$\mathcal{C}_n := \bigcap_{j=0}^k \{0 \leq i < n : d(f(x_{ik+j}), x_{ik+j+1}) < \delta'\}, \quad \mathcal{C} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{C}_n.$$

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(\mathbb{x}, f, \delta')| = 1$, 不难证明对于任意 $j \in \{0, \dots, k\}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |\{0 \leq i < n : d(f(x_{ik+j}), x_{ik+j+1}) < \delta'\}| = 1.$$

因此, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |\mathcal{C}_n| = 1$. 任取 $i \in \mathcal{C}$, 则有对任意 $j \in \{0, \dots, k\}$, $d(f(x_{ik+j}), x_{ik+j+1}) < \delta'$. 由此结合 δ' 的取法自有 $d(f^k(z_i), z_{i+1}) = d(f^k(x_{ik}), x_{ik+k}) < \delta$. 这说明 $\mathbb{z}$ 为 f^k 的一条 δ -遍历伪轨. 因此

$$\text{存在 } z \in X, \text{ 使得 } \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbb{z}, f^k, \gamma/4)| > 1/2.$$

由此可得, 存在 $\xi > 1/2$ 及严格递增序列 $\{n_l\}_{l=1}^\infty \subset \mathbb{N}$, 使得对任意 $l \in \mathbb{N}$, 恒有

$$\frac{1}{n_l} |B_{n_l}(z, \mathbb{z}, f^k, \gamma/4)| \geq \xi. \quad (2.14)$$

对任意 $j \in \mathcal{Q}_{n_l} := [k \cdot B_{n_l}(z, \mathbb{z}, f^k, \gamma/4) \cap (\bigcap_{i=0}^{k-1} (B(\mathbb{x}, f, \delta') - i))$ (其中, $B(\mathbb{x}, f, \delta') = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n(\mathbb{x}, f, \delta')$), 注意到 $d(f(x_{j+i}), x_{j+i+1}) < \delta' < \gamma$ ($\forall i \in \{0, 1, \dots, k-1\}$) 并且 $d(f^j(z), x_j) = d((f^k)^{j/k}(z), x_{(j/k)k}) < \gamma/4$ (因 $j \in k \cdot B_{n_l}(z, \mathbb{z}, f^k, \gamma/4)$), 由 γ 的取法则有, 对任意 $i \in \{0, 1, \dots, k-1\}$, $d(f^{j+i}(z), x_{j+i}) < \varepsilon$. 由此可知,

$$B_{(n_l+1)k}(z, \mathbb{x}, f, \varepsilon) \supset \bigcup_{i=0}^{k-1} (\mathcal{Q}_{n_l} + i). \quad (2.15)$$

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(\mathbb{x}, f, \delta')| = 1$, 不难证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left| [0, n) \cap \left(\bigcap_{i=0}^{k-1} (B(\mathbb{x}, f, \delta') - i) \right) \right| = 1. \quad (2.16)$$

为证明方便, 记 $\mathcal{H}_n = [0, n) \cap (\bigcap_{i=0}^{k-1} (B(\mathbb{x}, f, \delta') - i))$. 显然, 对任意 $0 \leq i < k$, $\mathcal{Q}_{n_l} + i \subset [0, n_l k + i)$, 所以由 (2.1) 式有

$$\mathcal{Q}_{n_l} + i = (\mathcal{Q}_{n_l} + i) \cap [0, n_l k + i) = (k \cdot B_{n_l}(z, \mathbb{z}, f^k, \gamma/4) + i) \cap (\mathcal{H}_{n_l k + i} + i),$$

故而

$$\begin{aligned} |(\mathcal{Q}_{n_l} + i)| &= |(k \cdot B_{n_l}(z, \mathbb{z}, f^k, \gamma/4) + i)| + |(\mathcal{H}_{n_l k + i} + i)| \\ &\quad - |(k \cdot B_{n_l}(z, \mathbb{z}, f^k, \gamma/4) + i) \cup (\mathcal{H}_{n_l k + i} + i)|. \end{aligned}$$

由此和 (2.14) 及 (2.16) 式, 我们有

$$\begin{aligned} \liminf_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{(n_l + 1)k} |(\mathcal{Q}_{n_l} + i)| &= \liminf_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{(n_l + 1)k} |(k \cdot B_{n_l}(z, \mathbb{Z}, f^k, \gamma/4) + i)| \\ &\geq \liminf_{l \rightarrow \infty} \frac{n_l \xi}{(n_l + 1)k} = \frac{\xi}{k}. \end{aligned} \quad (2.17)$$

注意到 $\mathcal{Q}_{n_l}, \mathcal{Q}_{n_l} + 1, \dots, \mathcal{Q}_{n_l} + k - 1$ 是互不相交的, 则

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbb{X}, f, \varepsilon)| &\geq \liminf_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{(n_l + 1)k} |B_{(n_l + 1)k}(z, \mathbb{X}, f, \varepsilon)| \\ &\geq \liminf_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{(n_l + 1)k} \sum_{i=0}^{k-1} |(\mathcal{Q}_{n_l} + i)| \quad (\text{由 (2.15) 式}) \\ &\geq \sum_{i=0}^{k-1} \liminf_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{(n_l + 1)k} |(\mathcal{Q}_{n_l} + i)| \geq \xi > \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (2.18)$$

由 ε 及 $\mathbb{X}$ 的任意性自然可得, f 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质. $\square$

由引理 2.2 的证明过程, 不难发现对任意 $\delta > 0$ 及任意 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $\delta' > 0$, 使得对 f 的任意 δ' -遍历伪轨 $\{x_i\}_{i=0}^\infty$, 恒有 $\{x_{ik}\}_{i=0}^\infty$ 为 f^k 的 δ -遍历伪轨. 同时, 不难证明: 对任意 $z \in X$ 和任意 $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \{x_i\}_{i=0}^\infty, f, \varepsilon)| &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nk} |B_{nk}(z, \{x_i\}_{i=0}^\infty, f, \varepsilon)| \\ &\geq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nk} |B_n(z, \{x_{ik}\}_{i=0}^\infty, f^k, \varepsilon)|. \end{aligned}$$

由此, 我们便有以下结论成立.

引理 2.3 设 (X, f) 为一动力系统. 如果存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 f^k 具有 $\underline{d}$ -跟踪性质, 则 f 具有 $\underline{d}$ -跟踪性质.

综合引理 2.1-2.3 及文献 [5, 定理 2.5], 自然可得以下命题成立.

定理 2.4 设 (X, f) 为一动力系统, 则以下命题等价:

- (1) f 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质 ($\underline{d}$ -跟踪性质);
- (2) 存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 f^k 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质 ($\underline{d}$ -跟踪性质);
- (3) 对任意 $k \in \mathbb{N}$, f^k 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质 ($\underline{d}$ -跟踪性质).

定理 2.5 如果系统 (X, f) 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质, 则 f 是链混合的.

证明 由文献 [15, 推论 12] 知: 完全链传递等价于链混合. 应用引理 2.1 和文献 [5, 定理 2.2], 我们不难得出 f 是完全链传递的, 该命题得证. $\square$

定理 2.6 动力系统 (X, f) 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质 (或者, $\underline{d}$ -跟踪性质) 当且仅当 (X, f) 是链混合的, 并且满足对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对 f 的任意 δ -伪轨 $\mathbb{X}$, 存在 $z \in X$ 满足

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbb{X}, f, \varepsilon)| > 1/2$$

相应地, $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbb{X}, f, \varepsilon)| > 0$.

证明 关于 $\underline{d}$ -跟踪性质可以由文献 [5, 引理 4.1] 直接得到; 应用定理 2.5, 类似于文献 [5, 引理 4.1] 的证明, 不难得出该命题对 $\bar{d}$ -跟踪性质也成立. $\square$

如果对 X 的任意两个非空开子集 U_0, U_1 , 总存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对任意 $k \geq 2$ 及任意 $S = \{s(1), \dots, s(k)\} \in \{0, 1\}^k$, 存在 $x \in X$ 满足 $x \in U_{s(1)}$ 并且 $f^N(x) \in U_{s(2)}, \dots, f^{(k-1)N}(x) \in U_{s(k)}$,

则称 f 具有性质 P . 如果任意两个非稠密的开集构成 X 的覆盖总有正拓扑熵, 则称 f 有一致正熵. 如果 (X, f) 的任何非平凡因子总有正拓扑熵, 则称 f 有完全正熵.

如果对 X 的任意两个非空开子集 U, V , 及任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x \in U, y \in V$ 及 $n \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $d(f^n(x), f^n(y)) \leq \varepsilon$, 则称 f 是可达的. 如果 f 是拓扑传递, 初值敏感依赖并且可达的, 则称 f 是 Ruelle-Takens-Kato 意义下的混沌.

推论 2.7 如果系统 (X, f) 具有伪轨跟踪性质, 则以下命题等价: (1) f 具有遍历跟踪性质; (2) f 是链混合的; (3) f 具有 $\underline{d}$ -跟踪性质; (4) f 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质; (5) f 是完全传递的; (6) f 是拓扑混合的; (7) f 具有平均跟踪性质; (8) f 具有 specification 性质; (9) f 是拓扑弱混合的; (10) f 有性质 P ; (11) f 有完全正熵; (12) f 有一致正熵; (13) f 是 Ruelle-Takens-Kato 意义下的混沌; (14) f 是拓扑传递且可达的.

证明 由文献 [4, 定理 A] 知, $(1) \iff (2) \iff (6)$; 由文献 [6, 推论 6] 知, $(8) \iff (6) \iff (3) \iff (7)$, 同时, 应用定理 2.6, 并且由文献 [6, 引理 4 和定理 5] 证明过程易知, $(7) \implies (4)$; 由文献 [14, 定理 3] 知, $(2) \iff (9) \iff (10) \iff (11) \iff (12) \iff (13) \iff (14)$; 最后由定理 2.6 知, $(4) \implies (2)$. 至此, 该命题得证. $\square$

注 2.8 (1) 由于一个子转移具有伪轨跟踪性质当且仅当它是有限型的, 所以推论 2.7 对于有限型的子转移也是成立的. 由定理 2.6 和文献 [18, 定理 3.7], 类似于文献 [6, 定理 4] 的证明得知:

$$\text{渐近平均跟踪性质} \implies \text{平均跟踪性质} \implies \bar{d}\text{-跟踪性质} + \underline{d}\text{-跟踪性质}. \quad (2.19)$$

由此结合定理 2.5 和推论 2.7 得 [3, 定理 3.1, 定理 4.1] 是显然成立的.

(2) 由文献 [19, 定理 2.3.2] 知, 系统 (X, id_X) 具有伪轨跟踪性质当且仅当 X 是完全不连通的. 然而, 应用推论 2.7 易证满足该条件系统既不具有 $\bar{d}$ -跟踪性质也不具有 $\underline{d}$ -跟踪性质.

例 2.9 (参见文献 [20, 例 3.13]) 设 $\mathbb{S}^1$ 为单位圆周, 并且定义映射 f 如下:

$$f: \mathbb{S}^1 \ni e^{2\pi i x} \longmapsto e^{2\pi i x^2} \in \mathbb{S}^1, \quad x \in [0, 1].$$

文献 [20] 已证明 f 具有渐近平均跟踪性质但不具有伪轨跟踪性质. 由此和 (2.19) 式及注 2.8 的 (2) 自然可得 $\bar{d}$ 和 $\underline{d}$ -跟踪性质与伪轨跟踪性质是互不蕴含的.

命题 2.10 不存在具有渐近平均跟踪性质的非平凡等度连续系统.

证明 由文献 [21, 定理 3.1] 知, 具有渐近平均跟踪性质的等度连续系统是拓扑传递的. 由此结合文献 [22, 定理 4] 得, 这样的系统为极小系统. 而由文献 [5, 定理 2.8] 有, 该系统是拓扑弱混合的, 自然初值敏感依赖的, 这与等度连续矛盾. $\square$

注 2.11 推论 2.10 表明满足文献 [21, 定理 3.1] 假设条件的系统是不存在的. 最近, 我们得到更一般的结论: 不存在具有 $\underline{d}$ -跟踪性质的非平凡等度连续系统.

虽然文献 [5] 早在 2010 年便给出了 $\bar{d}$ -跟踪性质的确切定义, 然而让学者们倍感疑惑的是为什么在定义 1.4 中上极限 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbb{x}, f, \varepsilon)|$ 的取值是大于 “1/2”, 而不是 $[0, 1)$ 之间的其他实数. 对于该问题, 文献 [5] 的作者们并未给出具体的说明. 作为本节结尾, 我们将从 “链传递性” 的角度说明取值 1/2 恰到好处. 为此, 先引入如下一些基本定义:

如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对 f 的任意 δ -遍历伪轨 $\mathbb{x}$, 存在 $z \in X$ 满足

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbb{x}, f, \varepsilon)| > \alpha \left(\text{或者, } \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbb{x}, f, \varepsilon)| > \alpha \right),$$

则称系统 (X, f) 具有 $\mathcal{M}^\alpha$ -跟踪性质 (相应地, $\mathcal{M}_\alpha$ -跟踪性质), 其中 $\alpha \in [0, 1)$.

显然 $\mathcal{M}^{1/2}$ -跟踪性质和 $\mathcal{M}_0$ -跟踪性质分别就是定义 1.4 中的 $\bar{d}$ -跟踪性质和 d -跟踪性质. 因此, $\{\alpha \in [0, 1) : \mathcal{M}_\alpha\text{-跟踪性质} \implies \text{链传递性}\} = [0, 1)$. 应用定理 2.5, 自然有对任意 $\alpha \in [1/2, 1)$, 具有 $\mathcal{M}^\alpha$ -跟踪性质的系统是链传递, 甚至链混合的. 下面的例子表明对任意 $\alpha \in [0, 1/2)$, 存在具有 $\mathcal{M}^\alpha$ -跟踪性质却不是链传递的系统.

例 2.12 取 $X_0 = [0, 1]$, $X_1 = [2, 3]$, 同时定义映射 $g : X_0 \cup X_1 \longrightarrow X_0 \cup X_1$ 为

$$g(x) = \begin{cases} 1 - |1 - 2x|, & x \in X_0, \\ 3 - |1 - 2(x - 2)|, & x \in X_1. \end{cases}$$

显然 g 不是链传递的, 因为 X_0, X_1 都是 g 的闭不变子集. 因此, g 不具有 $\bar{d}$ -跟踪性质.

由文献 [4, 例] 得子系统 $g|_{X_0}$ 及 $g|_{X_1}$ 均具有遍历跟踪性质, 所以任意给定的 $\varepsilon \in (0, 1)$, 存在 $\delta > 0$, 使得对 $g|_{X_0}$ (或者, $g|_{X_1}$) 的任意 δ -遍历伪轨 $\mathbb{x}$, 存在 $z \in X_0$ (相应地, $z \in X_1$) 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbb{x}, g|_{X_0}, \varepsilon)| = 1$ (相应地, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbb{x}, g|_{X_1}, \varepsilon)| = 1$).

任意取定 g 的 δ -遍历伪轨 $\{x_i\}_{i=0}^\infty$, 下证存在 $z \in X$, 使得 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} B_n(z, \{x_i\}_{i=0}^\infty, g, \varepsilon) \geq 1/2$. 为此, 令

$$\Gamma_0 := \{j \in \mathbb{Z}^+ : x_j \in X_1, \text{ 并且 } x_{j+1} \in X_0\},$$

$$\Gamma_1 := \{j \in \mathbb{Z}^+ : x_j \in X_0, \text{ 并且 } x_{j+1} \in X_1\}.$$

不失一般性, 记 $\Gamma_0 = \{n_1^{(0)}, n_2^{(0)}, n_3^{(0)}, \dots\}$, $\Gamma_1 = \{n_1^{(1)}, n_2^{(1)}, n_3^{(1)}, \dots\}$, 同时可假定 $n_1^{(0)} < n_1^{(1)} < n_2^{(0)} < n_2^{(1)} < \dots$. 置 $\Pi_0 := \bigcup_{k=1}^\infty [n_k^{(0)} + 1, n_k^{(1)}]$, $\Pi_1 = [0, n_1^{(0)}] \cup (\bigcup_{k=1}^\infty [n_k^{(1)} + 1, n_{k+1}^{(0)}])$. 不难验证, 对任意 $i \in \Pi_j$ ($j \in \{0, 1\}$), $x_i \in X_j$.

取

$$x_i^{(0)} = \begin{cases} x_i, & i \in \Pi_0, \\ g^{i-(n_1^{(0)}+1)}(x_{n_1^{(0)}+1}), & i \in [0, n_1^{(0)}], \\ g^{i-n_k^{(1)}}(x_{n_k^{(1)}}), & i \in [n_k^{(1)} + 1, n_{k+1}^{(0)}], \quad k = 1, 2, 3, \dots, \end{cases}$$

并且

$$x_i^{(1)} = \begin{cases} x_i, & i \in \Pi_1, \\ g^{i-n_k^{(0)}}(x_{n_k^{(0)}}), & i \in [n_k^{(0)} + 1, n_k^{(1)}], \quad k = 1, 2, 3, \dots, \end{cases}$$

易证 $\{x_i^{(0)}\}_{i=0}^\infty$ 和 $\{x_i^{(1)}\}_{i=0}^\infty$ 分别为子系统 $g|_{X_0}$ 和 $g|_{X_1}$ 的 δ -遍历伪轨. 所以

$$\text{存在 } z^j \in X_j \ (j \in \{0, 1\}), \text{ 使得 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z^j, \{x_i^{(j)}\}_{i=0}^\infty, g|_{X_j}, \varepsilon)| = 1. \quad (2.20)$$

记 $\Pi_j^{(n)} = \Pi_j \cap \{0, 1, \dots, n-1\}$. 结合

$$\begin{aligned} |B_n(z^{(j)}, \{x_i^{(j)}\}_{i=0}^\infty, g|_{X_j}, \varepsilon) \cap \Pi_j^{(n)}| &= |B_n(z^{(j)}, \{x_i^{(j)}\}_{i=0}^\infty, g|_{X_j}, \varepsilon)| \\ &\quad + |\Pi_j^{(n)}| - |B_n(z^{(j)}, \{x_i^{(j)}\}_{i=0}^\infty, g|_{X_j}, \varepsilon) \cup \Pi_j^{(n)}|, \end{aligned}$$

应用 (2.20) 式则有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z^{(j)}, \{x_i^{(j)}\}_{i=0}^\infty, g|_{X_j}, \varepsilon) \cap \Pi_j^{(n)}| = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |\Pi_j^{(n)}|. \quad (2.21)$$

进而, 不难证明对任意 $j \in \{0, 1\}$,

$$B_n(z^{(j)}, \{x_i^{(j)}\}_{i=0}^\infty, g|_{X_j}, \varepsilon) \cap \Pi_j^{(n)} = B_n(z^{(j)}, \{x_i\}_{i=0}^\infty, g, \varepsilon). \quad (2.22)$$

注意到 $\Pi_0 \cup \Pi_1 = \mathbb{Z}^+$, 因此存在 $j_0 \in \{0, 1\}$, 使得 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |\Pi_{j_0}^{(n)}| \geq 1/2$. 由此结合 (2.21)、(2.22) 式自有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} B_n(z^{(j_0)}, \{x_i\}_{i=0}^\infty, g, \varepsilon) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z^{(j_0)}, \{x_i^{(j_0)}\}_{i=0}^\infty, g|_{X_{j_0}}, \varepsilon) \cap \Pi_{j_0}^{(n)}| \geq \frac{1}{2}.$$

由 ε 的任意性, 故而对任意 $\alpha \in [0, 1/2)$, 系统 (X, g) 具有 $\mathcal{M}^\alpha$ -跟踪性质.

综合以上讨论则有

$$\{\alpha \in [0, 1) : \mathcal{M}^\alpha\text{-跟踪性质} \implies \text{链传递性}\} = [1/2, 1).$$

这便意味着在保证链传递性意义下, $\bar{d}$ -跟踪性质定义中“1/2”的取值是恰到好处的.

类似于定理 2.4, 不难得到 $\mathcal{M}_\alpha$ 和 $\mathcal{M}^\alpha$ -跟踪性质的迭代不变性.

定理 2.13 设 (X, f) 为一动力系统, 并且 $\alpha \in [0, 1)$, 则以下命题等价:

- (1) f 具有 $\mathcal{M}_\alpha$ -跟踪性质 ($\mathcal{M}^\alpha$ -跟踪性质);
- (2) 存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 f^k 具有 $\mathcal{M}_\alpha$ -跟踪性质 ($\mathcal{M}^\alpha$ -跟踪性质);
- (3) 对任意 $k \in \mathbb{N}$, f^k 具有 $\mathcal{M}_\alpha$ -跟踪性质 ($\mathcal{M}^\alpha$ -跟踪性质).

3 逆极限系统的遍历伪轨跟踪性质

设 $\{(X_i, d_i)\}_{i=1}^\infty$ 为一族紧致度量空间, 映射 $\varphi_i : X_{i+1} \rightarrow X_i$ 为连续满射. 记

$$X_\infty := \varprojlim \{X_i, \varphi_i\} = \left\{ (x_1, x_2, x_3, \dots) \in \prod_{i=1}^\infty X_i : \varphi_i(x_{i+1}) = x_i, \forall i \in \mathbb{N} \right\},$$

并称 X_∞ 为由 $\{X_i, \varphi_i\}_{i=1}^\infty$ 生成的逆极限空间, φ_i 称为底映射. 容易验证, X_∞ 为 $\prod_{i=1}^\infty X_i$ 的紧子空间. 赋予 X_∞ 如下相容度量:

$$d_\infty(x, y) = \sum_{i=1}^\infty \frac{1}{2^i} \frac{d_i(x_i, y_i)}{1 + d_i(x_i, y_i)}, \quad \forall x = (x_1, x_2, x_3, \dots), y = (y_1, y_2, y_3, \dots) \in X_\infty.$$

若 $f_i : X_i \rightarrow X_i$ 为连续映射并且满足 $\varphi_i \circ f_{i+1} = f_i \circ \varphi_i, \forall i \in \mathbb{N}$, 则 $\{f_i\}_{i=1}^\infty$ 在 X_∞ 上诱导一个连续映射

$$\begin{aligned} f_\infty : X_\infty &\rightarrow X_\infty \\ (x_1, x_2, x_3, \dots) &\mapsto (f_1(x_1), f_2(x_2), f_3(x_3), \dots). \end{aligned}$$

称 (X_∞, f_∞) 为由 $\{X_i, \varphi_i, f_i\}_{i=1}^\infty$ 生成的逆极限系统. 表示如下:

$$\begin{array}{ccccccccccc} X_1 & \xleftarrow{\varphi_1} & X_2 & \xleftarrow{\varphi_2} & X_3 & \xleftarrow{\varphi_3} & X_4 & \cdots & X_{n-1} & \xleftarrow{\varphi_{n-1}} & X_n & \xleftarrow{\varphi_n} & X_{n+1} & \cdots \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & & & & & \downarrow f_n & & \downarrow f_{n+1} & \\ X_1 & \xleftarrow{\varphi_1} & X_2 & \xleftarrow{\varphi_2} & X_3 & \xleftarrow{\varphi_3} & X_4 & \cdots & X_{n-1} & \xleftarrow{\varphi_{n-1}} & X_n & \xleftarrow{\varphi_n} & X_{n+1} & \cdots \end{array}$$

特别地, 如果对任意 $i \in \mathbb{N}$, $X_i = X$, $f_i = f$, 则称

$$X_f = \{(x_1, x_2, x_3, \dots) : f(x_{i+1}) = x_i, \forall i \in \mathbb{N}\},$$

为 f 的极限空间, f 在 X_f 上诱导一个同胚映射 $\sigma_f = f_\infty$, 称其为移位同胚. 对 $j \geq i$, 定义 $\varphi_{j,i} : X_j \rightarrow X_i$ 为 $\varphi_{j,i} = \text{id}$ 若 $j = i$; 而 $\varphi_{j,i} = \varphi_i \circ \varphi_{i+1} \circ \dots \circ \varphi_{j-1}$ 若 $j > i$. 设 X_∞ 为 $\{(X_i, \varphi_i)\}_{i=1}^\infty$ 生成的逆极限空间, 定义投影映射 $\pi_i : X_\infty \rightarrow X_i$ ($i \in \mathbb{N}$) 为 $\pi_i(x_1, x_2, x_3, \dots) = x_i$. 显然, π_i 为连续满射并且满足 $f_i \circ \pi_i = \pi_i \circ f_\infty$.

3.1 逆极限系统 (X_∞, f_∞) 的遍历伪轨跟踪性

2001 年, 李思敏在文献 [23] 中证明了如果每个 f_i 具有伪轨跟踪性质, 则诱导映射 f_∞ 具有伪轨跟踪性质. 顾荣宝 [24] 和牛应轩 [25] 分别于 2006 和 2007 年证明了该命题对于渐近伪轨跟踪性质和渐近平均伪轨跟踪性质都是成立的.

本小节致力于研究系统 $\{(X_i, f_i)\}_{i=1}^\infty$ 如何影响其生成的逆极限系统 (X_∞, f_∞) 的遍历伪轨跟踪性质. 对于此, 我们有如下定理:

定理 3.1 设 (X_∞, f_∞) 为由 $\{(X_i, \varphi_i, f_i)\}_{i=1}^\infty$ 生成的逆极限系统. 如果每个 f_i 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质, 则 f_∞ 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质.

证明 任意给定 $\varepsilon > 0$, 取定 $N \geq 2$ 满足 $\sum_{n=N+1}^\infty 1/2^n < \varepsilon/2$. 由于任意 $1 \leq i \leq N$, $\varphi_{(N+1),i}$ 一致连续, 所以存在 $\delta_1 \in (0, \varepsilon/2)$, 使得任意 $x, y \in X_{N+1}$ 满足 $d_{N+1}(x, y) < \delta_1$ 及任意 $1 \leq i \leq N$, 恒有

$$d_i(\varphi_{(N+1),i}(x), \varphi_{(N+1),i}(y)) < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (3.1)$$

注意到 f_{N+1} 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质, 所以存在 $\delta_2 \in (0, \delta_1]$, 满足

$$\text{对 } f_{N+1} \text{ 的任意 } \delta_2\text{-遍历伪轨 } \mathbb{x}, \text{ 存在 } z \in X_{N+1}, \text{ 使得 } \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \mathbb{x}, f_{N+1}, \delta_1)| > \frac{1}{2}. \quad (3.2)$$

令 $\delta = \delta_2/2^{N+1}(1 + \delta_2)$. 任取 f_∞ 的 δ -遍历伪轨 $\mathbb{Y} = \{y_i := (y_1^{(i)}, y_2^{(i)}, y_3^{(i)}, \dots)\}_{i=0}^\infty \subset X_\infty$, 同时令 $\mathbb{z}_n = \{y_n^{(i)}\}_{i=0}^\infty$. 由 δ 的选取, 容易验证 $\mathbb{z}_{N+1}$ 为 f_{N+1} 的一个 δ_2 -遍历伪轨. 由 (3.2) 式知, 存在 $\xi_{N+1} \in X_{N+1}$, 使得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(\xi_{N+1}, \mathbb{z}_{N+1}, f_{N+1}, \delta_1)| > \frac{1}{2}. \quad (3.3)$$

由于每个 φ_i 为满射, 我们可取 $\xi \in X_\infty$ 满足 $\pi_{N+1}(\xi) = \xi_{N+1}$. 不失一般性, 令 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{N+1}, \dots)$. 不难证明: 对任意 $k \in \mathbb{Z}^+$ 及任意 $1 \leq i \leq N$,

$$f_i^k(\xi_i) = f_i^k \circ \varphi_{(N+1),i}(\xi_{N+1}) = \varphi_{(N+1),i} \circ f_{N+1}^k(\xi_{N+1}). \quad (3.4)$$

由此和 δ_1 的选取及 (3.1) 式可知, 对任意 $k \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n(\xi_{N+1}, \mathbb{z}_{N+1}, f_{N+1}, \delta_1)$ 及任意 $1 \leq i \leq N+1$,

$$d_i(f_i^k(\xi_i), y_i^{(k)}) = d_i(\varphi_{(N+1),i}(f_{N+1}^k(\xi_{N+1})), \varphi_{(N+1),i}(y_{N+1}^{(k)})) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad (3.5)$$

所以

$$d(f_\infty^k(\xi), \mathbb{y}_k) \leq \sum_{i=1}^{N+1} \frac{1}{2^i} \frac{d_i(f_i^k(\xi_i), y_i^{(k)})}{1 + d_i(f_i^k(\xi_i), y_i^{(k)})} + \sum_{i=N+2}^\infty \frac{1}{2^i} < \sum_{i=1}^{N+1} \frac{1}{2^i} \frac{\varepsilon/2}{1 + \varepsilon/2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \quad (3.6)$$

因此

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n(\xi_{N+1}, \mathbb{Z}_{N+1}, f_{N+1}, \delta_1) \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n(\xi, \mathbb{Y}, f_\infty, \varepsilon). \quad (3.7)$$

故而

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(\xi, \mathbb{Y}, f_\infty, \varepsilon)| \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(\xi_{N+1}, \mathbb{Z}_{N+1}, f_{N+1}, \delta_1)| > \frac{1}{2}. \quad (3.8)$$

由此和 ε 的任意性可得 f_∞ 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质. $\square$

通过定理 3.1 的证明过程, 同理可证以下定理成立.

定理 3.2 设 (X_∞, f_∞) 为由 $\{(X_i, \varphi_i, f_i)\}_{i=1}^\infty$ 生成的逆极限系统. 如果每个 f_i 具有 $\underline{d}$ -跟踪性质 (或者, 遍历跟踪性质), 则 f_∞ 具有 $\underline{d}$ -跟踪性质 (相应地, 遍历跟踪性质).

3.2 逆极限系统 (X_f, σ_f) 的遍历伪轨跟踪性质

1992 年, Chen 和 Li [26] 证明了 (X_f, σ_f) 具有伪轨跟踪性质当且仅当 (X, f) 具有伪轨跟踪性质. 最近, 我们在文献 [27] 中得到了 (X_f, σ_f) 是 $(\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2)$ -混沌当且仅当 (X, f) 是 $(\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2)$ -混沌, 其中 $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ 是平移不变的 Furstenberg 族. 受此启发, 本小节将进一步研究逆极限系统 (X_f, σ_f) 的遍历伪轨跟踪性质.

对任意 $A \subset \mathbb{Z}^+$, 定义 A 的上密度和下密度分别为

$$\overline{\text{Dens}}(A) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |A \cap \{0, 1, \dots, n-1\}|, \quad \underline{\text{Dens}}(A) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |A \cap \{0, 1, \dots, n-1\}|.$$

若 $\overline{\text{Dens}}(A) = \underline{\text{Dens}}(A) = \xi$, 则称 A 的密度为 ξ , 记为 $\text{Dens}(A) = \xi$.

下面的引理是自然成立的, 在此略去证明.

引理 3.3 假设 $A \subset \mathbb{Z}^+$ 满足 $\text{Dens}(A) = 0$. 则对任意 $N \in \mathbb{N}$, $\text{Dens}(\bigcup_{j=0}^N (A - j)) = 0$.

命题 3.4 假设 $f: X \rightarrow X$ 为连续满射. 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 及 $p \in \mathbb{Z}^+$, 使得对 f 的任意 δ -遍历伪轨 $\{x_i\}_{i=0}^\infty$, 存在 $z \in X$ 满足 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \{f^p(x_i)\}_{i=0}^\infty, f, \varepsilon)| > 1/2$ (或者, $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \{f^p(x_i)\}_{i=0}^\infty, f, \varepsilon)| > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \{f^p(x_i)\}_{i=0}^\infty, f, \varepsilon)| = 1$), 则 f 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质 (相应地, $\underline{d}$ -跟踪性质, 遍历跟踪性质).

证明 任意取定 $\varepsilon > 0$, 则存在 $\beta \in (0, \varepsilon)$ 及 $P \in \mathbb{N}$, 使得对 f 的任意 β -遍历伪轨 $\{x_i\}_{i=0}^\infty$, 存在 $z \in X$ 满足 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \{f^P(x_i)\}_{i=0}^\infty, f, \varepsilon/2)| > 1/2$. 由于 f 一致连续, 所以存在 $0 < \eta < \beta/(2P)$, 使得

$$\text{对任意 } x, y \in X \text{ 满足 } d(x, y) < \eta \text{ 及任意 } 0 \leq j \leq P, \text{ 恒有 } d(f^j(x), f^j(y)) < \frac{\beta}{2P}. \quad (3.9)$$

任意取定 f 的一条 η -遍历伪轨 $\{y_i\}_{i=0}^\infty$, 由已知条件得

$$\text{存在 } z_0 \in X, \text{ 使得 } \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z_0, \{f^P(y_i)\}_{i=0}^\infty, f, \varepsilon/2)| > \frac{1}{2}. \quad (3.10)$$

为证明叙述方便, 记

$$\Xi := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n(\{y_i\}_{i=0}^\infty, f, \eta), \text{ 并且 } \Xi^c := \mathbb{Z}^+ - \Xi.$$

由于 $\{y_i\}_{i=0}^\infty$ 为 f 的 η -遍历伪轨, 由引理 3.3 得

$$\text{Dens}\left(\mathbb{Z}^+ - \bigcup_{j=0}^P (\Xi^c - j)\right) = 1 - \text{Dens}\left(\bigcup_{j=0}^P (\Xi^c - j)\right) = 1. \quad (3.11)$$

类似于 (2.6), 应用 (3.10) 式不难证明

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left| \Omega := \left(\mathbb{Z}^+ - \bigcup_{j=0}^P (\Xi^c - j) \right) \cap \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n(z_0, \{f^P(y_i)\}_{i=0}^\infty, f, \varepsilon/2) \right) \right| > \frac{1}{2}. \quad (3.12)$$

任意取定 $k \in \Omega$, 由 Ω 的选取则有对任意 $0 \leq j \leq P$, $k+j \in \Xi$ 恒成立. 由此和 (3.9) 式得

$$\begin{aligned} d(f^P(y_k), y_{P+k}) &\leq d(f^P(y_k), f^{P-1}(y_{k+1})) + d(f^{P-1}(y_{k+1}), f^{P-2}(y_{k+2})) \\ &\quad + \cdots + d(f(y_{P+k-1}), y_{P+k}) \\ &\leq P \cdot \frac{\beta}{2P} < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned} \quad (3.13)$$

这说明

$$\begin{aligned} d(f^k(z_0), y_{P+k}) &\leq d(f^k(z_0), f^P(y_k)) + d(f^P(y_k), y_{P+k}) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \left(\text{因 } k \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \left(z_0, \{f^P(y_i)\}_{i=0}^\infty, f, \frac{\varepsilon}{2} \right) \right). \end{aligned} \quad (3.14)$$

取 $z^* \in f^{-P}(z_0)$ (因为 f 满射, z^* 是存在的). 由以上的讨论, 则不难得出对任意 $k \in \Omega$, 恒有

$$d(f^{P+k}(z^*), y_{P+k}) = d(f^k(z_0), y_{P+k}) < \varepsilon, \quad (3.15)$$

即 $\Omega + P \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n(z^*, \{y_i\}_{i=0}^\infty, f, \varepsilon)$. 由此和 (3.12) 式及 ε 的任意性可知 f 具有 $\bar{d}$ -伪轨跟踪性. 类似于以上证明过程, 不难验证该命题对于 $\underline{d}$ -跟踪性质和遍历跟踪性质均成立. $\square$

虽然现在仍未知定理 3.1 和 3.2 的逆命题是否成立, 但对于移位同胚 σ_f , 我们有如下定理:

定理 3.5 逆极限系统 (X_f, σ_f) 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质 (或者, $\underline{d}$ -跟踪性质, 遍历跟踪性质) 当且仅当 (X, f) 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质 (或者, $\underline{d}$ -跟踪性质, 遍历跟踪性质).

证明 由定理 3.1 和 3.2 知充分性是显然成立的. 下证必要性.

任意取定 $\varepsilon > 0$, 由于 σ_f 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质, 所以存在 $\delta \in (0, \varepsilon/2)$, 使得对 σ_f 的任意 δ -遍历伪轨 $\{x_i\}_{i=0}^\infty$, 存在 $z \in X_f$ 满足 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \{x_i\}_{i=0}^\infty, \sigma_f, \varepsilon/2(1+\varepsilon))| > 1/2$. 取充分大的 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $\sum_{n=N+1}^\infty 1/2^n < \delta/2$. 注意到 f 一致连续, 则存在 $0 < \xi < \delta/2$, 使得任意 $x, y \in X$ 满足 $d(x, y) < \xi$ 及任意 $0 \leq j \leq N$, 恒有

$$d(f^j(x), f^j(y)) < \frac{\delta}{2}. \quad (3.16)$$

任取 f 的 ξ -遍历伪轨 $y := \{y_i\}_{i=0}^\infty$, 同时令 $y^{(i)} = (f^N(y_i), f^{N-1}(y_i), \dots, y_i, \dots) \in X_f$ (因 f 满射, $y^{(i)}$ 存在).

$$\begin{array}{cccccc} \{y^{(i)}\}_{i=0}^\infty & f^N(y) & f^{N-1}(y) & \cdots & y & \cdots \\ y^{(0)} & f^N(y_0) & f^{N-1}(y_0) & \cdots & y_0 & \cdots \\ y^{(1)} & f^N(y_1) & f^{N-1}(y_1) & \cdots & y_1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \\ y^{(n)} & f^N(y_n) & f^{N-1}(y_n) & \cdots & y_n & \cdots \\ y^{(n+1)} & f^N(y_{n+1}) & f^{N-1}(y_{n+1}) & \cdots & y_{n+1} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \end{array}$$

对任意 $j \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n(y, f, \xi)$, 注意到

$$\sigma_f(y^{(j)}) = (f^{N+1}(y_j), f^N(y_j), \dots, f(y_j), \dots), \quad (3.17)$$

所以由 N 的选取及 (3.16) 式知

$$\begin{aligned} d_\infty(\sigma_f(y^{(j)}), y^{j+1}) &\leq \sum_{n=1}^{N+1} \frac{1}{2^n} \frac{d(f^{N+2-n}(y_j), f^{N+1-n}(y_{j+1}))}{1 + d(f^{N+2-n}(y_j), f^{N+1-n}(y_{j+1}))} + \frac{\delta}{2} \\ &< \sum_{n=1}^{N+1} \frac{1}{2^n} \frac{\delta/2}{1 + \delta/2} + \frac{\delta}{2} < \delta. \end{aligned} \quad (3.18)$$

这说明 $\{y^{(i)}\}_{i=0}^\infty$ 为 σ_f 的 δ -遍历伪轨. 因此

$$\text{存在 } z \in X_\infty, \text{ 使得 } \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(z, \{y^{(i)}\}_{i=0}^\infty, \sigma_f, \varepsilon/2(1+\varepsilon))| > \frac{1}{2}. \quad (3.19)$$

由此不难证明

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |B_n(\pi_1(z), \{f^N(y_i)\}_{i=0}^\infty, f, \varepsilon)| > \frac{1}{2}. \quad (3.20)$$

由命题 3.4 自然可得 f 具有 $\bar{d}$ -跟踪性质. 同理可证 d -跟踪性质及遍历跟踪性质. $\square$

致谢 本文为作者在香港城市大学作学术访问期间完成的. 同时, 作者对审稿人的有益建议深表感谢.

参考文献

- Blank M L. Metric properties of ε -trajectory of dynamical systems with stochastic behavior. *Ergodic Theory Dyn Syst*, 1988, 8: 365–378
- Eirola T, Nevanlinna O, Pilyugin S Y. Limit shadowing property. *Numer Funct Anal Math*, 1997, 18: 75–92
- Gu R B. The asymptotic average shadowing property and transitivity. *Nonlinear Anal*, 2007, 67: 1680–1689
- Fakhari A, Ghane F H. On shadowing: Ordinary and ergodic. *J Math Anal Appl*, 2010, 364: 151–155
- Dastjerdi D A, Hosseini M. Sub-shadowings. *Nonlinear Anal*, 2010, 72: 3759–3766
- Oprocha P, Dastjerdi D A, Hosseini M. On partial shadowing of complete pseudo-orbits. *J Math Anal Appl*, 2014, 411: 454–463
- Bowen R. *Equilibrium States and Ergodic Theory of Anosov Diffeomorphisms*. Lecture Notes in Math. Berlin: Springer-Verlag, 1975
- Barge M, Swanson R. Pseudo-orbits and topological entropy. *Proc Amer Math Soc*, 1990, 109: 559–566
- Boyarskia A, Góra P. The pseudo-orbit shadowing property for Markov operators in the space of probability density functions. *Canad J Math*, 1990, 6: 1000–1017
- Coven E M, Kan I, Yorke J A. Pseudo-orbit shadowing in the family of tent maps. *Trans Amer Math Soc*, 1988, 308: 227–241
- Walters P. On the pseudo-orbit tracing property and its relationship to stability. *Lect Notes in Math*, 668. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 1978, 231–244
- 杨润生. 伪轨跟踪与混沌. *数学学报*, 1996, 39: 382–386
- 杨润生. 伪轨跟踪与不变概率测度. *数学年刊*, 1998, 19: 33–36
- 杨润生, 沈苏林. 伪轨跟踪与完全正熵. *数学学报*, 1999, 42: 99–104
- Richeson D, Wiseman J. Chain recurrence rates and topological entropy. *Topology Appl*, 2008, 156: 251–261
- 朱圣芝. 动力系统在链回复集上的拓扑稳定性. *中国科学: 数学*, 2011, 41: 317–322
- 张筑生. *微分动力系统原理*. 北京: 科学出版社, 1987
- Kulczycki M, Kwietniak D, Oprocha P. On almost specification and average shadowing properties. *Fund Math*, 2014, 224: 241–278
- Aoki N, Hiraide K. *Topological Theory of Dynamical Systems*. North-Holland Mathematical Library, vol. 52. Amsterdam: North-Holland, 1994

- 20 Kulczycki M, Oprocha P. Properties of dynamical systems with the asymptotic average shadowing properties. *Fund Math*, 2011, 212: 35–52
- 21 Gu R B. On ergodicity of systems with the asymptotic average shadowing property. *Comput Math Appl*, 2008, 55: 1137–1141
- 22 Auslander J, Yorke J A. Interval maps, factors of maps, and chaos. *Tôhoku Math J*, 1980, 32: 177–188
- 23 李思敏. 逆极限空间的伪轨跟踪性. *数学年刊*, 2001, 22: 479–482
- 24 Gu R B, Shen Y Q. APOTP for the inverse limit spaces. *Appl Math J Chin Univ Ser B*, 2006, 21: 473–478
- 25 牛应轩. 具有渐近平均跟踪性质的系统. *高校应用数学学报*, 2007, 22: 462–468
- 26 Chen L, Li S. Shadowing property for inverse limit spaces. *Proc Amer Math Soc*, 1992, 115: 573–580
- 27 吴新星, 朱培勇. 由双 Furstenberg 族诱导的混沌. *数学学报*, 2012, 55: 1039–1054

Some remarks on $\bar{d}$ -shadowing property

WU XinXing

Abstract $\bar{d}$ - and $\underline{d}$ -shadowing properties were introduced by Dastjerdi and Hosseini in 2010 for generalizing the pseudo-orbit shadowing property. The aim of this paper is to investigate $\bar{d}$ - and $\underline{d}$ -shadowing properties of iteration systems and inverse limit systems. First, it is proved that for a dynamical system, the following three statements are equivalent: (1) f has $\bar{d}$ -shadowing property (resp., $\underline{d}$ -shadowing property); (2) f^k has $\bar{d}$ -shadowing property (resp., $\underline{d}$ -shadowing property) for all $k \in \mathbb{N}$; (3) f^k has $\bar{d}$ -shadowing property (resp., $\underline{d}$ -shadowing property) for some $k \in \mathbb{N}$. Moreover, it is proved that a dynamical system having $\bar{d}$ -shadowing property is chain mixing. Finally, we obtain that the inverse limit system (X_∞, f_∞) generated by $\{X_i, \varphi_i, f_i\}_{i=1}^\infty$ has $\bar{d}$ -shadowing property (resp., $\underline{d}$ -shadowing property, ergodic shadowing property) provided that every f_i has $\bar{d}$ -shadowing property (resp., $\underline{d}$ -shadowing property, ergodic shadowing property).

Keywords $\bar{d}$ -shadowing property, $\underline{d}$ -shadowing property, chain mixing, inverse limit system

MSC(2010) 54H20, 37B40, 37D45, 28D20

doi: 10.1360/N012013-00171