一类推广后的 Feigenbaum 函数方程的光滑解

张敏^①, 司建国^{②*}^① 中国石油大学(华东)理学院, 青岛 266555;^② 山东大学数学学院, 济南 250100

E-mail: zhangminmath@163.com, sijgmth@sdu.edu.cn

收稿日期: 2010-12-07; 接受日期: 2011-05-18; * 通信作者

国家自然科学基金(批准号: 11171185, 10871117)和山东省自然科学基金(批准号: ZR2010AM013)资助项目

摘要 考虑一类推广后的 Feigenbaum 函数方程

$$\begin{cases} h(g(x)) = g(g(h(x))), \\ g(0) = 1, \quad -1 \leq g(x) \leq 1, \quad x \in [-1, 1], \end{cases}$$

其中 $h(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的递减光滑奇函数且满足 $h(0) = 0, -1 < h'(x) < 0, x \in [-1, 1]$. 利用构造性方法讨论上述方程的光滑解的存在性及唯一性.

关键词 推广后的 Feigenbaum 函数方程 构造性方法 初始函数 单峰光滑偶解 严格递减光滑解

MSC (2000) 主题分类 34K05, 39B22, 34A25

1 引言

众所周知, 在 Feigenbaum^[1,2] 所提出的动力系统理论中, Cvitanović-Feigenbaum 函数方程

$$\begin{cases} g(x) = -\frac{1}{\lambda}g(g(-\lambda x)), & 0 < \lambda < 1, \\ g(0) = 1, \quad -1 \leq g(x) \leq 1, & x \in [-1, 1], \end{cases} \quad (1.1)$$

以及它的解占有重要地位. 然而, 要想求出上述方程的精确解并不是一件容易的事. 在某些特殊函数空间中求解方程 (1.1) 的工作可参见文献 [3–17]. 1985 年, 杨和张在文献 [18] 中代替方程 (1.1) 提出了第二类 Feigenbaum 函数方程

$$\begin{cases} \varphi(x) = \frac{1}{\lambda}\varphi(\varphi(\lambda x)), & 0 < \lambda < 1, \\ \varphi(0) = 1, \quad 0 \leq \varphi(x) \leq 1, & x \in [0, 1], \end{cases} \quad (1.2)$$

并利用构造性方法研究了它的单谷连续解的存在性, 且指出构造方程 (1.2) 的 C^2 -凸解及方程 (1.1) 的光滑解和解析解是一件有意义的事. 在文献 [20] 中, 本文作者根据文献 [18] 中的构造性方法, 分别构造出了方程 (1.2) 的 C^i -凸解 ($i = 0, 1, 2$). 本文根据构造性方法, 构造出了一类推广后的 Feigenbaum 函数方程

$$\begin{cases} h(g(x)) = g(g(h(x))), \\ g(0) = 1, \quad -1 \leq g(x) \leq 1, \quad x \in [-1, 1], \end{cases} \quad (1.3)$$

的单峰光滑偶解, 其中 $h(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的递减光滑奇函数且满足 $h(0) = 0, -1 < h'(x) < 0, x \in [-1, 1]$. 类似文献 [18], 我们代替方程 (1.3) 提出下面的函数方程

$$\begin{cases} h(\varphi(x)) = \varphi(\varphi(-h(x))), \\ \varphi(0) = 1, \quad -1 \leq \varphi(x) \leq 1, \quad x \in [0, 1], \end{cases} \quad (1.4)$$

并通过构造性方法研究了方程 (1.4) 的严格递减光滑解的存在性及唯一性. 显然, 令 $h(x) = -\lambda x$, 则方程 (1.3) 即为方程 (1.1).

2 解的构造性方法

这一节我们将通过构造性方法证明方程 (1.4) 的严格递减连续解的存在性与唯一性.

定理 2.1 若 $h(x)$ 为 $[-1, 1]$ 上的单调递减连续奇函数, 且满足 $h(0) = 0, |h(x)| < |x|$ ($x \neq 0$). 则下述结论成立:

(i) 若 $g(x)$ 是方程 (1.3) 的单峰连续偶解, 则

$$\varphi(x) = g(x), \quad x \in [0, 1] \quad (2.1)$$

是方程 (1.4) 的严格递减连续解;

(ii) 若 $\varphi(x)$ 是方程 (1.4) 的严格递减连续解, 则

$$g(x) = \varphi(|x|), \quad x \in [-1, 1] \quad (2.2)$$

是方程 (1.3) 的单峰连续偶解.

证明 (i) 令 $x = 0$. 由方程 (1.3) 可知

$$g(1) = g(g(0)) = g(g(h(0))) = h(g(0)) = h(1) < 0.$$

我们记 $\lambda = -g(1)$. 又 $g(0) = 1 > 0$, 由中值定理可知, 存在一点 $\alpha \in (0, 1)$, 使得

$$g(\alpha) = 0. \quad (2.3)$$

我们断言,

$$-g(1) = -h(1) = \lambda < \alpha. \quad (2.4)$$

否则, 假若 $\lambda \geq \alpha$, 由中值定理可知, 存在一点 $\gamma \in (0, 1)$, 使得 $h(\gamma) = -\alpha$, 即 $\gamma = h^{-1}(-\alpha)$. 从而可得

$$h(g(h^{-1}(-\alpha))) = g(g(h(h^{-1}(-\alpha)))) = g(g(-\alpha)) = g(0) = 1.$$

这同已知条件 $|h(x)| < |x| \leq 1$ ($x \neq 0$) 矛盾.

令 $\varphi(x) = g(x)$ ($x \in [0, 1]$), 由 $-\lambda \leq h(x) \leq 0$ ($x \in [0, 1]$) 可知

$$0 \leq \varphi(\alpha) \leq \varphi(\lambda) \leq \varphi(-h(x)) \leq 1.$$

从而可得

$$h(\varphi(x)) = h(g(x)) = g(g(h(x))) = g(g(-h(x))) = \varphi(\varphi(-h(x))),$$

即 $\varphi(x)$ 满足方程 (1.4).

(ii) 结论显然, 此处省略不证. □

上述定理证明了方程 (1.3) 与 (1.4) 的等价性, 因此, 我们仅需研究方程 (1.4).

引理 2.1 若 $\varphi(x)$ 是方程 (1.4) 的严格递减连续解且 $\varphi(\alpha) = 0$. 则下述结论成立:

(i) $\varphi(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有唯一不动点 $\beta = \varphi(\beta)$, 且满足

$$\lambda < \beta < \alpha = \varphi(-h(\alpha)); \quad (2.5)$$

(ii)

$$\varphi(\lambda) > \lambda. \quad (2.6)$$

证明 (i) 由 $\varphi(x)$ 是 $[0, 1]$ 上严格递减连续函数可知 $-\lambda = \varphi(1) \leq \varphi(x) \leq \varphi(0) = 1$. 从而, $\varphi(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有唯一不动点 $\beta = \varphi(\beta)$ 且 $\beta < \alpha$. 下面用反证法证明 $\lambda < \beta$. 假若 $\lambda \geq \beta$, 则由中值定理可知存在一点 $\delta \in (0, 1)$, 使得 $h(\delta) = -\beta$, 即 $\delta = h^{-1}(-\beta)$. 从而

$$h(\varphi(h^{-1}(-\beta))) = \varphi(\varphi(-h(h^{-1}(-\beta)))) = \varphi(\varphi(\beta)) = \varphi(\beta) = \beta,$$

即

$$\varphi(-h^{-1}(\beta)) = \varphi(h^{-1}(-\beta)) = h^{-1}(\beta).$$

由 $0 \leq \varphi(x) \leq 1$ ($x \in [0, \alpha]$), $-\lambda \leq \varphi(x) \leq 0$ ($x \in [\alpha, 1]$) 及 $\lambda < \alpha$, 可知 $\varphi(x) \neq -x$ ($x \in [0, 1]$). 产生矛盾. 令 $x = \alpha$, 由方程 (1.4) 可得

$$0 = h(\varphi(\alpha)) = \varphi(\varphi(-h(\alpha))).$$

因此 $\varphi(-h(\alpha)) = \alpha$.

(ii) 由 $\lambda < \beta$, 可得

$$\varphi(\lambda) \geq \varphi(\beta) = \beta > \lambda. \quad \square$$

引理 2.2 设 φ_1, φ_2 是方程 (1.4) 的两个严格递减连续解. 如果有

$$\varphi_1(x) = \varphi_2(x), \quad x \in [\lambda, 1],$$

则在整个 $[0, 1]$ 上有 $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$.

证明 令 $f(x) = -h(x)$, 显然 $\{f^k(1)\}$ 为递减序列且 $\lim_{k \rightarrow \infty} f^k(1) = 0$. 令

$$\Delta_k = [f^{k+1}(1), f^k(1)], \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

则

$$[0, 1] = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Delta_k.$$

下面用数学归纳法证明在每个 Δ_k 上都有 $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$:

当 $k = 0$ 时, 由假设条件知, $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$ ($x \in \Delta_0$). 令 $\varphi_0(x) = \varphi_1(x) = \varphi_2(x)$ ($x \in \Delta_0$). 设对一切 $k \leq m$, 在 Δ_k 上已有 $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$, 这里 $m \geq 0$ 为某一给定的正整数. 令

$$\varphi(x) = \varphi_1(x) = \varphi_2(x), \quad x \in [f^{m+1}(1), 1],$$

则由方程 (1.4) 可得

$$h(\varphi(f^{-1}(x))) = h(\varphi_i(f^{-1}(x))) = \varphi_i(\varphi_i(x)), \quad i = 1, 2, x \in \Delta_{m+1}. \quad (2.7)$$

当 $x \leq f(1) = \lambda$ 时, 则 $\varphi_i(x) \geq \varphi_i(\lambda) = \varphi(\lambda) > \lambda$ ($i = 1, 2$). 因此方程 (2.7) 等价于如下方程

$$\varphi_i(x) = \varphi_0^{-1}(h(\varphi(f^{-1}(x))))), \quad x \in \Delta_{m+1}.$$

从而可知在 Δ_{m+1} 上 $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$. 由数学归纳法, 在每个 Δ_k 上均有 $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$. 证毕.

定理 2.2 对于任意给定的 $[-1, 1]$ 上的单调递减连续奇函数 $h(x)$, 其中 $|h(x)| < |x|$ ($x \neq 0$), 及任意给定的 $\alpha \in (0, 1)$ 且 $-h(1) < \alpha$. 若 $\varphi_0(x)$ 是 $[-h(1), 1]$ 上的严格递减连续函数且满足下列条件:

$$\varphi_0(1) = h(1), \quad \varphi_0(\alpha) = 0, \quad \varphi_0(\varphi_0(-h(1))) = h^2(1), \quad \varphi_0(-h(1)) > -h(1), \quad (2.8)$$

则存在唯一的严格递减连续函数 $\varphi(x)$ 满足

$$\begin{cases} h(\varphi(x)) = \varphi(\varphi(-h(x))), & x \in [0, 1], \\ \varphi(x) = \varphi_0(x), & x \in [-h(1), 1]. \end{cases} \quad (2.9)$$

反之, 若 φ_0 是方程 (1.4) 的严格递减连续解在 $[-h(1), 1]$ 上的限制, 则条件 (2.8) 必然满足.

证明 令 $f(x) = -h(x)$, 则 $\{f^k(1)\}$ 为递减序列且 $\lim_{k \rightarrow \infty} f^k(1) = 0$. 令

$$\Delta_k = [f^{k+1}(1), f^k(1)], \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

则

$$[0, 1] = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Delta_k.$$

我们归纳地给出 φ 在 Δ_k 上的定义:

显然 $\varphi = \varphi_0$ 在 Δ_0 上有定义. 设对所有的 $k \leq m$, 我们已在 Δ_k 上确定了严格递减连续函数 $\varphi_k(x)$, 其中 $m \geq 0$ 为一整数. 令

$$\varphi_{m+1}(x) = \varphi_0^{-1}(h(\varphi_m(-h^{-1}(x))))), \quad x \in \Delta_{m+1}, \quad (2.10)$$

则在所有 Δ_k 上都定义了严格递减连续函数 $\varphi_k(x)$, 并当 $x \in \Delta_k$ 时有以下等式

$$\varphi_0(\varphi_{k+1}(-h(x))) = h(\varphi_k(x)). \quad (2.11)$$

在 (2.10) 中令 $m = 0, x = f(1) = -h(1)$, 由条件 (2.8) 可知

$$\varphi_1(-h(1)) = \varphi_0^{-1}(h(\varphi_0(-h^{-1}(-h(1))))) = \varphi_0^{-1}(h(\varphi_0(1))) = \varphi_0^{-1}(h^2(1)) = \varphi_0(-h(1)). \quad (2.12)$$

当 $k = 1, \dots, m$ 时, 其中 $m \geq 0$ 为一整数, 我们假定,

$$\varphi_k(f^k(1)) = \varphi_{k-1}(f^k(1)) \quad (2.13)$$

在 (2.10) 式中取 $x = f^{m+1}(1)$ 得

$$\varphi_{m+1}(f^{m+1}(1)) = \varphi_0^{-1}(h(\varphi_m(f^m(1)))) = \varphi_0^{-1}(h(\varphi_{m-1}(f^m(1)))) = \varphi_m(f^{m+1}(1)), \quad (2.14)$$

即 φ_k 和 φ_{k+1} 在 Δ_k 和 Δ_{k+1} ($k = 0, 1, \dots$) 的公共端点上取值一致, 从而可以令

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ \varphi_k(x), & x \in \Delta_k. \end{cases} \quad (2.15)$$

由于 φ_k 在 Δ_k ($k \geq 0$) 上的严格递减连续性及 (2.12)–(2.14) 式, 可知 φ 是 $[0, 1]$ 上的严格递减连续函数. 又由 (2.11) 式可知 $\varphi(x)$ 的确满足方程 (2.9), 且由引理 2.2 可知 $\varphi(x)$ 是唯一确定的.

显然, 若 φ_0 是方程 (1.4) 的严格递减连续解在 $[-h(1), 1]$ 上的限制, 则条件 (2.8) 必然满足. $\square$

下面我们给出方程 (1.4) 的严格递减连续解的另一种构造性方法.

引理 2.3 设 φ_1, φ_2 是方程 (1.4) 的两个严格递减连续解. 如果

$$\varphi_1(x) = \varphi_2(x), \quad x \in [-h(\alpha), \alpha],$$

则在整个 $[0, 1]$ 上有 $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$.

证明 令 $f(x) = -h(x)$, 则 $\{f^k(\alpha)\}$ 为递减序列且 $\lim_{k \rightarrow \infty} f^k(\alpha) = 0$. 令

$$\Delta_k = [f^{k+1}(\alpha), f^k(\alpha)], \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

则

$$[0, 1] = \left(\bigcup_{k=0}^{\infty} \Delta_k \right) \cup [\alpha, 1].$$

下面我们用数学归纳法证明在任一 Δ_k 及 $[\alpha, 1]$ 上有 $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$:

显然, 由已知条件可知, 在 Δ_0 上有 $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$. 令

$$\varphi_0(x) = \varphi_1(x) = \varphi_2(x), \quad x \in \Delta_0.$$

当 $x \in [\alpha, 1]$ 时可知

$$-h(\alpha) < -h(1) < \varphi_0(-h(1)) \leq \varphi_0(-h(x)) \leq \varphi_0(-h(\alpha)) = \alpha.$$

从而可知

$$\varphi_i(x) = h^{-1}(\varphi_0(\varphi_0(-h(x)))), \quad i = 1, 2, x \in [\alpha, 1].$$

即证

$$\varphi_1(x) = \varphi_2(x), \quad x \in [\alpha, 1].$$

令

$$\bar{\varphi}(x) = \varphi_1(x) = \varphi_2(x), \quad x \in [\alpha, 1].$$

设对所有的 $k \leq m$, 我们已证在 Δ_k 上 $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$, 其中 $m \geq 0$ 为一整数. 令

$$\varphi(x) = \varphi_1(x) = \varphi_2(x), \quad x \in [f^{m+1}(\alpha), 1],$$

则由 (1.4) 可知

$$h(\varphi(f^{-1}(x))) = h(\varphi_i(f^{-1}(x))) = \varphi_i(\varphi_i(x)), \quad i = 1, 2, x \in \Delta_{m+1}. \quad (2.16)$$

当 $x \leq f(\alpha)$ 时, 则 $\varphi_i(x) \geq \varphi_i(f(\alpha)) = \alpha$ ($i = 1, 2$). 因此方程 (2.16) 等价于方程

$$\varphi_i(x) = \bar{\varphi}^{-1}(h(\varphi(f^{-1}(x)))), \quad x \in \Delta_{m+1}.$$

即证在 Δ_{m+1} 上有 $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$. 由数学归纳法, 在每个 Δ_k 上均有 $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$. $\square$

定理 2.3 对于任意给定的 $[-1, 1]$ 上的单调递减连续奇函数 $h(x)$, 其中 $|h(x)| < |x|$ ($x \neq 0$), 及任意给定的 $\alpha \in (0, 1)$ 且 $-h(1) < \alpha$. 若 $\varphi_0(x)$ 是 $[-h(\alpha), \alpha]$ 上的严格递减连续函数且满足下述条件:

$$\varphi_0(\alpha) = 0, \quad \varphi_0(-h(\alpha)) = \alpha, \quad \varphi_0(\varphi_0(-h(1))) = h^2(1), \quad \varphi_0(-h(1)) > -h(1), \quad (2.17)$$

则存在唯一的严格递减连续函数 $\varphi(x)$ 满足方程

$$\begin{cases} h(\varphi(x)) = \varphi(\varphi(-h(x))), & x \in [0, 1], \\ \varphi(x) = \varphi_0(x), & x \in [-h(\alpha), \alpha]. \end{cases} \quad (2.18)$$

反之, 若 φ_0 为方程 (1.4) 的严格递减连续解在 $[-h(\alpha), \alpha]$ 上的限制, 则上述条件 (2.17) 必然满足.

证明 令 $f(x) = -h(x)$, 则 $\{f^k(\alpha)\}$ 为递减序列且 $\lim_{k \rightarrow \infty} f^k(\alpha) = 0$. 令

$$\Delta_k = [f^{k+1}(\alpha), f^k(\alpha)], \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

则

$$[0, 1] = \left(\bigcup_{k=0}^{\infty} \Delta_k \right) \cup [\alpha, 1].$$

我们归纳地给出 φ 在 Δ_k 和 $[\alpha, 1]$ 上的定义:

显然, $\varphi = \varphi_0$ 在 Δ_0 上有定义. 当 $x \in [\alpha, 1]$ 时, 我们定义

$$\bar{\varphi}(x) = h^{-1}(\varphi_0(\varphi_0(-h(x)))).$$

显然 $\bar{\varphi}(x)$ 在 $[\alpha, 1]$ 上是严格递减连续的. 设对所有的 $k \leq m$, 我们已在 Δ_k 上确定了严格递减连续函数 $\varphi_k(x)$, 其中 $m \geq 0$ 为一整数. 令

$$\varphi_{m+1}(x) = \bar{\varphi}^{-1}(h(\varphi_m(-h^{-1}(x)))), \quad x \in \Delta_{m+1}, \quad (2.19)$$

则在所有 Δ_k 上都定义了严格递减连续函数 $\varphi_k(x)$. 令

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ \bar{\varphi}(x), & x \in [\alpha, 1], \\ \varphi_k(x), & x \in \Delta_k. \end{cases} \quad (2.20)$$

余下的证明类似定理 2.2, 此处省略. $\square$

3 光滑解

首先定义如下集合:

$$A_0 = \{\varphi_0(x), x \in [-h(1), 1] | \varphi_0(x) \text{ 是严格递减光滑函数且满足条件 (2.8)}\},$$

$$A = \left\{ \varphi(x), x \in [-h(\alpha), 1] \mid \varphi(x) = \begin{cases} \varphi_0(x) \in A_0, & x \in [-h(1), 1] \\ \varphi_0^{-1}(h(\varphi_0(-h^{-1}(x))))), & x \in [-h(\alpha), -h(1)] \end{cases} \right\},$$

$$B_0 = \{\varphi_0(x), x \in [-h(\alpha), \alpha] \mid \varphi_0(x) \text{ 是严格递减光滑函数且满足条件 (2.17)}\},$$

$$B = \left\{ \varphi(x), x \in [-h(\alpha), 1] \mid \varphi(x) = \begin{cases} \varphi_0(x) \in B_0, & x \in [-h(\alpha), \alpha] \\ h^{-1}(\varphi_0(\varphi_0(-h(x))))), & x \in [\alpha, 1] \end{cases} \right\}.$$

若 $\varphi(x)$ ($x \in [0, 1]$) 是方程 (1.4) 的一个严格递减光滑解, 令 $\varphi_{AB}(x) = \varphi(x), x \in [-h(\alpha), 1]$, 则由定理 2.2 及 2.3 可知 $\varphi_{AB}(x) \in A \cap B$. 从而可知 $A \cap B \neq \emptyset$.

定理 3.1 对于任意给定的 $[-1, 1]$ 上的单调递减光滑奇函数 $h(x)$, 其中 $-1 < h'(x) < 0$, 及任意给定的 $\alpha \in (0, 1)$ 且 $-h(1) < \alpha$. 如果 $\varphi_0(x) \in A \cap B$ 且 $h'(1) + \varphi'(1) \cdot h'(0) < 0$, 则存在唯一的单峰光滑偶函数 $g(x)$ 满足方程

$$\begin{cases} h(g(x)) = g(h(x)), & x \in [-1, 1], \\ g(x) = \varphi_0(x), & x \in [-h(\alpha), 1]. \end{cases} \quad (3.1)$$

证明 对于初始函数 $\varphi_0(x)$, 可分别由定理 2.2 及 2.3 中的构造性方法构造出方程 (1.4) 的严格递减光滑解 $\varphi_1(x)$ 和 $\varphi_2(x)$. 由于在 $[-h(1), 1]$ 上 $\varphi_1(x) = \varphi_2(x) = \varphi_0(x)$, 根据引理 2.2 可知 $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$ ($x \in [0, 1]$). 我们定义 $\varphi(x) = \varphi_1(x) = \varphi_2(x)$. 由 $\varphi_0(x)$ 和 $h(x)$ 的光滑性以及构造性方法可知 $\varphi(x)$ 在每个区间 $[f^{k+1}(1), f^k(1)]$ 及 $[f^{k+1}(\alpha), f^k(\alpha)]$ 上是分别光滑的, 这里 $f(x) = -h(x)$. 又由 $f^{k+1}(1) \in (f^{k+1}(\alpha), f^k(\alpha))$ 及 $f^k(\alpha) \in (f^{k+1}(1), f^k(1))$ ($k \geq 1$) 可知 $\varphi(x)$ 在 $(0, 1]$ 上光滑. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi^{(n)}(x)$ ($n \geq 1$) 显然存在.

下面我们用数学归纳法证明

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi^{(n)}(x) = 0, \quad n \geq 1. \quad (3.2)$$

由

$$h(\varphi(x)) = \varphi(\varphi(-h(x))),$$

可得

$$h'(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = \varphi'(\varphi(-h(x))) \cdot \varphi'(-h(x)) \cdot (-h'(x)). \quad (3.3)$$

在上式中令 $x \rightarrow 0^+$ 可得

$$h'(1) \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi'(x) = \varphi'(1) \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi'(x) \cdot (-h'(0)).$$

从而由 $h'(1) + \varphi'(1) \cdot h'(0) < 0$ 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi'(x) = 0. \quad (3.4)$$

我们断言,

$$h'(\varphi(x)) \cdot \varphi^{(n)}(x) = H_n(x) + \varphi'(\varphi(-h(x))) \cdot (-h'(x))^n \cdot \varphi^{(n)}(-h(x)), \quad (3.5)$$

且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} H_n(x) = 0, \quad (3.6)$$

其中

$$\begin{cases} H_1(x) = 0, \\ H_n(x) = \sum_{j=1}^{n-1} G_j^{(n-1-j)}(x), \quad n \geq 2, \end{cases} \quad (3.7)$$

而

$$G_j(x) = (\varphi'(\varphi(-h(x))) \cdot (-h'(x))^j)' \cdot \varphi^{(j)}(-h(x)) - h''(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) \cdot \varphi^{(j)}(x). \quad (3.8)$$

下面我们用数学归纳法证明 (3.2), (3.5) 及 (3.6) 式. 当 $n=1$ 时, (3.2), (3.5) 及 (3.6) 式显然成立. 假设对所有 $n \leq m$, (3.2), (3.5) 及 (3.6) 式成立, 其中 $m \geq 1$ 为一整数. 下面考虑 $n=m+1$ 时的情况. 由 $n=m$ 时 (3.5) 式成立可知

$$\begin{aligned} & h'(\varphi(x)) \cdot \varphi^{(m+1)}(x) + h''(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) \cdot \varphi^{(m)}(x) \\ &= H'_m(x) + (\varphi'(\varphi(-h(x))) \cdot (-h'(x))^m)' \cdot \varphi^{(m)}(-h(x)) \\ & \quad + \varphi'(\varphi(-h(x))) \cdot (-h'(x))^{m+1} \cdot \varphi^{(m+1)}(-h(x)). \end{aligned} \quad (3.9)$$

令

$$G_m(x) = (\varphi'(\varphi(-h(x))) \cdot (-h'(x))^m)' \cdot \varphi^{(m)}(-h(x)) - h''(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) \cdot \varphi^{(m)}(x)$$

及

$$H_{m+1}(x) = H'_m(x) + G_m(x). \quad (3.10)$$

由 $n=m$ 时 (3.7) 式成立可知

$$H_{m+1}(x) = \sum_{j=1}^{m-1} G_j^{(m-j)}(x) + G_m(x) = \sum_{j=1}^m G_j^{(m-j)}(x),$$

即当 $n=m+1$ 时, (3.5) 式成立. 由 $(a \cdot b)^{(n)} = \sum_{i=0}^n C_n^i \cdot a^{(n-i)} \cdot b^{(i)}$, 可知当 $1 \leq j \leq m$ 时有

$$\begin{aligned} G_j^{(m-j)}(x) &= \sum_{i=0}^{m-j} C_{m-j}^i \cdot [(\varphi'(\varphi(-h(x))) \cdot (-h'(x))^j)']^{(m-j-i)} \cdot (\varphi^{(j)}(-h(x)))^{(i)} \\ & \quad - \sum_{i=0}^{m-j} C_{m-j}^i \cdot (h''(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x))^{(m-j-i)} \cdot \varphi^{(i+j)}(x). \end{aligned} \quad (3.11)$$

又由当 $n \leq m$ 时 (3.2) 式成立可知

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} G_j^{(m-j)}(x) = 0.$$

从而可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} H_{m+1}(x) = 0,$$

即当 $n=m+1$ 时, (3.6) 式成立. 令 $x \rightarrow 0^+$, 由 $n=m+1$ 时, (3.5) 式成立可知

$$h'(1) \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi^{(m+1)}(x) = \varphi'(1) \cdot (-h'(0))^{m+1} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi^{(m+1)}(x). \quad (3.12)$$

由于 $h'(1) + \varphi'(1) \cdot h'(0) < 0$ 及 $0 < -h'(0) < 1$, 由上式可知 $h'(1) - \varphi'(1) \cdot (-h'(0))^{m+1} < 0$. 从而由 (3.12) 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi^{(m+1)}(x) = 0, \quad (3.13)$$

即当 $n = m + 1$ 时, (3.2) 式成立. 由数学归纳法, (3.2), (3.5) 及 (3.6) 式成立.

由导数极限定理可得

$$\varphi_+^{(n)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi^{(n)}(x) = 0.$$

从而可知 $\varphi(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的严格递减光滑函数. 令

$$g(x) = \varphi(|x|), \quad x \in [-1, 1],$$

则 $g(x)$ 显然是满足方程 (3.1) 的单峰光滑偶函数. 证毕.

注记 (1) 在上述定理中, 若给定的函数 $h(x)$ 及 $\varphi_0(x)$ 是 C^k 的, 则由构造性方法所得的解也是 C^k 的.

(2) 在上述定理中, 若给定的函数 $h(x)$ 及 $\varphi_0(x)$ 是解析的, 则由构造性方法所得的解 $g(x)$ 在 $[-1, 0) \cup (0, 1]$ 上解析, 而在 $x = 0$ 处不解析.

(3) 本文仅给出了光滑解 $g(x)$ 的构造性方法, 并未给出解的精确表达式, 这是由于本文中所研究的这类光滑解具有较强的特殊性, 要求满足 $g(0) = 1, g^{(n)}(0) = 0$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 而这样的函数是很难找到的.

参考文献

- 1 Feigenbaum M J. Quantitative universality for a class of non-linear transformations. J Stat Phys, 1978, 19: 25–52
- 2 Feigenbaum M J. The universal metric properties of non-linear transformations. J Stat Phys, 1979, 21: 669–706
- 3 Couliet P, Tresser C. Itération d'endomorphismes de renormalisation. J Phys Colloque, 1978, 39: 5–25
- 4 Douady A, Hubbard J H. On the dynamics of polynomial-like mapping. Ann Scient Ec Norm Sup, 1985, 18: 287–343
- 5 Lanford O E. A computer assisted proof of the Feigenbaum conjectures. Bull Amer Math Soc, 1982, 6: 427–434
- 6 Eokmann J P, Wittwer P. A complete proof of the Feigenbaum conjectures. J Stat Phys, 1987, 46: 455–477
- 7 Epstein H. Fixed point of composition operators II. Nonlinearity, 1989, 2: 305–310
- 8 Epstein H. Fixed point of the period-doubling operator. Lausanne: Lecture notes, 1992
- 9 Sullivan D. Bouds quadratic differentials and renormalization conjectures. In: Browder F, ed. Mathematics into Twenty-First Century: 1988 Centennial Symposium, August 8–12. Providence, RI: Amer Math Soc, 1992, 417–466
- 10 Epstein H. New proofs of the existence of the Feigenbaum function. Commun Math Phys, 1986, 106: 395–426
- 11 Epstein H. Existence and properties of p -tupling fixed points. Commun Math Phys, 2000, 215: 443–476
- 12 Thompson C J, McGuire J B. Asymptotic and essentially singular solutions of the Feigenbaum equation. J Stat Phys, 1982, 27: 183–200
- 13 McGuire J B, Thompson C J. Asymptotic properties of sequences of iterates of nonlinear transformations. J Stat Phys, 1988, 51: 991–1007
- 14 Mestel B D, Osbaldestin A H. Asymptotics of scaling parameters for period-doubling in unimodal maps with asymmetric critical points. J Stat Phys, 2000, 41: 4732–4746
- 15 Mestel B D, Osbaldestin A H, Tsygvintsev A V. Continued fractions and solutions of the Feigenbaum-Cvitanovic equation. C R Acad Sci Paris, 2002, 334: 683–688
- 16 Campanino M, Epstein H. On the existence of Feigenbaum's fixed point. Commun Math Phys, 1981, 79: 261–302
- 17 McCarthy P J. The general exact bijective continuous solution of Feigenbaum's functional equation. Commun Math Phys, 1983, 91: 431–443
- 18 杨路, 张景中. 第二类 Feigenbaum 函数方程. 中国科学 A 辑, 1985, 28: 1061–1069
- 19 陈芳跃. Feigenbaum 函数方程的光滑解. 科学通报, 1988, 12: 956–957
- 20 司建国, 张敏. 第二类 Feigenbaum 函数方程凸解的构造. 中国科学 A 辑, 2009, 39: 49–70

C^∞ -solutions for a class of generalized Feigenbaum's functional equations

ZHANG Min & SI JianGuo

Abstract This work focuses on a class of generalized Feigenbaum's functional equations

$$\begin{cases} h(g(x)) = g(g(h(x))), \\ g(0) = 1, \quad -1 \leq g(x) \leq 1, \quad x \in [-1, 1], \end{cases}$$

where $h(x)$ is C^∞ -decreasing odd function on $[-1, 1]$ and satisfies $h(0) = 0, -1 < h'(x) < 0, x \in [-1, 1]$. Using constructive methods, we discuss the existence and uniqueness of C^∞ -solutions of the above equation.

Keywords: generalized Feigenbaum's functional equations, constructive methods, initial function, C^∞ -single-peak even solutions, C^∞ -strict decreasing solutions

MSC(2000): 34K05, 39B22, 34A25

doi: 10.1360/012010-982