中国沙漠元素地球化学区域特征及其对黄土物源的指示意义

赵万苍^{1,2}, 刘连文², 陈骏², 季峻峰^{2*}

1. 西南大学地理科学学院, 岩溶环境重庆市重点实验室, 重庆 400715;

2. 南京大学地球科学与工程学院, 表生地球化学教育部重点实验室, 南京 210023

* 通讯作者, E-mail: Jijunfeng@nju.edu.cn

收稿日期: 2018-09-21; 收修改稿日期: 2019-02-18; 接受日期: 2019-04-03; 网络版发表日期: 2019-05-28

国家自然科学基金项目(批准号: 41673095、41230526、41690111和41877369)和中央高校基本业务费项目(编号: Swu118203)资助

摘要 沙漠释放的矿物尘是大气气溶胶的重要组成部分之一. 中国北方干旱半干旱沙漠、沙地和中国北方戈壁及邻近的蒙古国戈壁(下文简称戈壁)是亚洲风尘的潜在源区. 然而, 矿物尘源区常量元素特征缺少系统研究. 本研究采集中国北方12个沙漠(地)及中蒙边境戈壁310个流动或半流动沙丘地表沙样, 结合前人发表的数据, 系统分析了中国沙漠表层样品常量元素特征, 结果表明中国沙漠常量元素存在明显的区域差异性, 可分四个区: (1) 西部的塔克拉玛干、库姆塔格、柴达木沙漠; (2) 中西部的巴丹吉林、腾格里、库布其和毛乌素沙漠; (3) 东北的呼伦贝尔、浑善达克和科尔沁沙地; (4) 戈壁和古尔班通古特沙漠. 中国沙漠的 SiO_2 和 CaO 含量变化较大, SiO_2 平均含量总体上呈现西低东高的变化趋势, CaO 平均含量呈现西高东低的变化趋势(SiO_2 和 CaO 平均含量在西部沙漠分别为64.5%和7.8%; 戈壁为71.3%和2.2%; 中西部沙漠77.6%和2.1%; 东北沙地85.7%和0.8%). 沙漠常量元素含量变化主要受控于两个方面: 源区岩石的组成和新鲜物质的供给. 西部沙漠新鲜物质供应充分, $\text{SiO}_2/(\text{Al}_2\text{O}_3+\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O})$ 低, 源岩具有高铁镁质和高碳酸盐物质的特征; 而东北沙地缺少新鲜物质供应, $\text{SiO}_2/(\text{Al}_2\text{O}_3+\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O})$ 高, 原岩含钾长石等花岗岩物质, 表现高 SiO_2 和 K_2O 含量特征. 通过 $\text{SiO}_2/10\text{-CaO-Al}_2\text{O}_3$ 、 $(\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O})\text{-CaO-Fe}_2\text{O}_3$ 和 $\text{CaO-Na}_2\text{O-K}_2\text{O}$ 等三角图解可较好地各个区域的沙漠加以区分. 黄土丰富的碳酸盐矿物, 结合 $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ 和 $\text{K}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 等其他元素地球化学特征, 我们认为西部与中西部沙漠可能是黄土高原黄土潜在的物源区.

关键词 沙漠, 黄土, 常量元素, 风尘, 碳酸盐

1 引言

晚新生代以来, 随着青藏高原隆升, 副特提斯海的收缩并退出, 以及全球逐渐变冷, 中国地区大气环流由

行星风系转为季风风系, 来自海洋的水汽向盆地输送受到阻碍, 加之越过高原后气流的焚风效应, 亚洲内陆趋于干旱化, 山前盆地沉积物经过风蚀等地表过程产生大量风沙, 并源源不断地得到高山上的风化/剥蚀

中文引用格式: 赵万苍, 刘连文, 陈骏, 季峻峰. 2019. 中国沙漠元素地球化学区域特征及其对黄土物源的指示意义. 中国科学: 地球科学, 49: 1425–1438, doi: 10.1360/N072018-00144

英文引用格式: Zhao W, Liu L, Chen J, Ji J. 2019. Geochemical characterization of major elements in desert sediments and implications for the Chinese loess source. Science China Earth Sciences, 62: 1428–1440, <https://doi.org/10.1007/s11430-018-9354-y>

物质供给,从而形成了广袤的沙漠、戈壁(鹿化煜和郭正堂, 2013; Zheng, 2016; 郭正堂, 2017). 干旱化和半干旱化的沙漠/沙地中颗粒较粗的砂,在地表风作用下相互碰撞并产生大量的细颗粒物,被风吹扬并被搬运至下风向相对平坦的高地或盆地,形成典型的粉尘堆积,构成了现代的黄土高原与沙漠共存的环境格局,其历史可追寻至22~25Ma以前(Guo等, 2002; 强小科等, 2010; Zheng等, 2015). 在合适的地貌与气候的双重作用下,中国北方及邻近的蒙古等亚洲内陆地区,提供大量粉砂物质(Smalley, 1995; Zheng, 2016),成为全球重要的风尘释放中心之一(Engelbrecht和Derbyshire, 2010). 这些释放的风尘影响大气化学组分、气候变化、生物地球化学循环以及人类健康等. 因此,研究这些沙漠、戈壁地区的元素、矿物和同位素等地球化学特征,有助于辨识风尘的传输途径,帮助理解不同尺度风尘排放和传输动力的控制机制和揭示风尘记录的古环境信息.

近年,众多研究对中国黄土、沙漠和戈壁开展了大量的元素、同位素和矿物学的工作. 早在20世纪90年代,刘丛强等通过元素和Sr-Nd探讨黄土高原黄土物源就认为塔克拉玛干沙漠是黄土的重要源区(Liu等, 1993, 1994). 季峻峰等(1997)通过伊利石类型和结晶度研究认为黄土伊利石来自青藏高原祁连低变质岩. 孙继敏等基于矿物、元素比和Sr-Nd等同位素研究认为,准噶尔盆地、塔里木盆地和柴达木盆地不是黄土物源区,中蒙交接的戈壁沙漠及南部的巴丹吉林、腾格里、乌兰布和、库布其和毛乌素沙漠才是黄土主要物源区,且戈壁阿尔泰山和祁连山高山过程产生的物质才是黄土的来源(Sun, 2002). 后来,有研究者也利用Sr-Nd同位素示踪研究,认为塔克拉玛干沙漠、内蒙古中西部、青藏高原东北部沙漠可能是黄土源区(饶文波等, 2006; 杨杰东等, 2007). 然而,近年台站观测结合现代遥感观测技术表明,亚洲沙尘多发生在春季,呈现两个多发区,一个位于塔克拉玛干沙漠,另一个为祁连山与戈壁阿尔泰山之间广袤的干旱区(Shao和Dong, 2006; 陈思宇等, 2017). 另外,单颗粒锆石、石英自旋信号及 $\delta^{18}\text{O}$ 等物源指标研究也揭示塔克拉玛干、古尔班通古特、巴丹吉林、腾格里沙漠和蒙古戈壁的物质来源与附近构造抬升有关(李高军, 2010; Sun等, 2007, 2013). Pullen等(2011)用单颗粒锆石技术研究认为柴达木盆地是黄土的物源. 陈骏和李高军(2011)通过白云

石碳氧同位素研究将黄土高原黄土物源限定在塔克拉玛干沙漠和祁连山麓和阿拉善干旱区. 李乐等用铀同位素($^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$)研究发现黄土高原物质来自戈壁沙漠、鄂尔多斯干旱区和祁连山北缘(Li等, 2018). 众多结果表明沙漠和戈壁的物质组成受构造控制,其物质主要来源于中亚造山带和青藏高原北缘沙漠,具有二源性特征(Chen等, 2007; 陈骏和李高军, 2011; Zhao等, 2014).

相对来说,中国沙漠、戈壁和蒙古国戈壁沙漠的元素组成、特别是常量元素组成特征,主要以单个沙漠的工作为主,如Yang等(2007)、Hu和Yang(2016)等,分别分析了塔克拉玛干沙漠、巴丹吉林沙漠的常量与稀土元素组成,研究了各沙漠的常量元素特征及其物源指示意义;但尚缺少众多沙漠常量元素对比等系统的研究. 沙尘从沙漠释放前,往往经历多次的沉积旋回并得到一定程度的混合,决定常量元素变化的主要矿物受源岩的物质组成、风化剥蚀作用、搬运迁移的分选作用以及沉积后改源等多种因素的影响(Bauluz等, 2000; Smalley, 1995). 但通过系统比较沙漠沉积物常量元素变化,仍有可能获取各个沙漠的地球化学特征,为风尘的示踪提供帮助,值得进一步研究.

基于本次工作的数据并结合前人发表的大量结果,本文综合分析了中国沙漠与中国北方戈壁及邻近的蒙古国戈壁(下文统称戈壁)的常量元素组成,借此揭示亚洲风尘潜在源区的常量元素地球化学特征.

2 研究区概况与样品

中国沙漠(含半干旱的沙地)、戈壁集中连片分布于北方地区($35^{\circ}\text{N}\sim 50^{\circ}\text{N}$, $75^{\circ}\text{E}\sim 125^{\circ}\text{E}$)中纬度温带干旱和半干旱气候区,呈弧形带状分布(图1). 受新生代青藏高原阶段性隆升影响,青藏高原北缘形成了现代盆地地貌格局(朱震达等, 1980; 方小敏等, 2001; 刘嘉琪和秦小光, 2005; 王国灿等, 2011). 由于高原地势格局和大气环流的共同作用,自东向西,腾格里、巴丹吉林和塔克拉玛干沙漠的干旱度逐步增强,腾格里北部沙漠以固定、半固定沙丘为主外,巴丹吉林和塔克拉玛干沙漠以流动沙丘为主. 古尔班通古特沙漠由于天山阻隔作用,截留了部分来自西伯利亚的湿气,其降水量较大,以固定、半固定沙丘为主. 而中国东北沙地(科尔沁、呼伦贝尔和浑善达克沙地)伴有草地和森林

草原, 属于半干旱沙地. 构造上, 西部沙漠中的塔克拉玛干、库姆塔格沙漠位于塔里木陆块区(晋宁造山时期1000~850Ma), 柴达木沙漠位于柴达木地块之上, 其可能与扬子陆块具有亲缘性, 原特提斯的形成造成塔里木陆块和扬子大陆的裂解(辛后田等, 2006). 塔克拉玛干沙漠以东的巴丹吉林、腾格里沙漠位于阿拉善陆块之上, 毛乌素沙地、库布其沙地位于鄂尔多斯陆块之上, 贺兰山被陆缘盆地夹在中间, 将毛乌素、库布齐和腾格沙漠里分开. 在中亚造山带上(天山-兴蒙造山系), 自西向东依次分布着古尔班通古特、蒙古戈壁、浑善达克、呼伦贝尔和科尔沁沙地, 其突出特征是受板块碰撞影响, 形成独特的走滑挤压下的盆山格局(Tapponnier和Molnar, 1976).

在前人研究的基础上, 本次工作在中国北方12个沙漠及戈壁新增310个地表沙样样品. 沙漠样品以流动或半流动沙丘为主, 采样深度<30cm, 蒙古国戈壁采自戈壁上干河床和相对低洼地表层沙(<30cm), 样品间隔5~100km(采样细节见Sun等, 2013)(图1). 样品采用全样分析, 研磨至200目以下, 称取烘干后的1g粉末样品以四硼酸锂(LiB_4O_7)和偏硼酸锂(LiBO_2)做熔融剂, 用溴化锂(LiBr)做脱水剂在铂金坩埚熔融制成透明饼状, 然后利用南京大学现代分析中心ARL9800XP+型X射线荧光光谱仪测定常量元素, 测试结果经标样控

制和对照实验加入标准样和平行样品进行测试质量的控制, 分析误差优于5%.

3 结果

3.1 中国沙漠和戈壁常量元素特征

中国沙漠样品全岩常量元素分析结果列于表1中, 各沙漠全岩常量元素含量结果与文献报导相应沙漠数据(表2)基本一致(Hu和Yang, 2016; Liu和Yang, 2013; Liu B等, 2016; Maher等, 2009; Wang等, 2012; Yang等, 2007). 从表1中可以看出, 中国沙漠全岩样品常量元素的分布具有以下特点: (1) 各个沙漠 SiO_2 含量较高且变化较大, 总体呈现西低东高, 其中, 西部的塔克拉玛干、柴达木和古尔班通古特沙漠的 SiO_2 平均含量较低(低于70%, 本文中百分比均为质量百分比), 与上部大陆地壳(UCC)组成较接近(图2), 而其余沙漠的 SiO_2 含量较高, 特别是东北的呼伦贝尔、浑善达克和科尔沁三大沙地, 其 SiO_2 平均含量高达85%左右. (2) CaO 含量的变化范围较大, 总体呈现西高东低, 其中西部的塔克拉玛干和柴达木沙漠的 CaO 平均含量高达8%以上, 而东北的呼伦贝尔和浑善达克沙地的 CaO 平均含量低于1%. (3) 由于 SiO_2 的含量明显高于UCC, 中国沙漠的 Al_2O_3 、 TiO_2 、 Fe_2O_3 、 Na_2O 、 MgO 和 P_2O_5 相对UCC亏

图1 研究区及样品点位图

表 1 各沙漠全岩常量元素含量统计表

沙漠	样数(n)		SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅
西部沙漠	塔克拉玛干	最大值	72.5	0.98	14.2	5.27	0.111	2.98	17.27	3.54	2.82	0.151
		平均值	64.9	0.52	10.6	2.96	0.067	2.04	7.69	2.38	2.09	0.103
		最小值	50.2	0.14	7.2	2.01	0.039	1.46	2.70	1.40	1.67	0.058
	柴达木	最大值	78.0	0.71	11.3	3.78	0.070	3.06	29.20	5.68	2.88	0.140
		平均值	60.7	0.33	8.5	2.06	0.047	1.60	11.18	2.46	1.96	0.070
		最小值	30.4	0.14	5.4	1.17	0.030	0.52	3.54	1.50	1.06	0.035
中西部沙漠	巴丹吉林	最大值	87.0	0.49	10.6	3.46	0.070	1.92	3.98	2.93	2.29	0.080
		平均值	79.9	0.30	8.5	2.10	0.039	1.04	1.83	2.08	1.89	0.047
		最小值	72.7	0.10	5.8	0.94	0.020	0.40	0.90	1.40	1.37	0.020
	库布其	最大值	83.6	0.57	13.3	4.53	0.077	2.82	7.96	3.53	3.02	0.147
		平均值	77.9	0.30	10.2	1.86	0.034	0.73	1.95	2.47	2.32	0.048
		最小值	56.4	0.14	7.3	1.01	0.020	0.35	0.88	1.58	1.77	0.024
	毛乌素	最大值	84.7	0.67	13.0	2.42	0.070	1.24	5.40	3.56	3.07	0.082
		平均值	77.8	0.30	10.4	1.64	0.033	0.65	1.88	2.68	2.41	0.044
		最小值	69.6	0.13	6.2	0.90	0.019	0.32	0.60	1.38	1.68	0.018
	腾格里	最大值	81.6	0.49	12.1	3.21	0.065	1.69	4.56	3.54	3.14	0.060
		平均值	77.3	0.35	9.5	2.31	0.041	1.11	2.15	2.11	2.38	0.044
		最小值	71.0	0.26	8.1	1.78	0.027	0.70	0.73	1.39	1.86	0.030
东北沙地	呼伦贝尔	最大值	91.8	0.34	9.3	1.77	0.038	0.45	1.79	1.91	3.46	0.061
		平均值	87.9	0.13	6.0	0.64	0.015	0.18	0.41	1.17	2.46	0.021
		最小值	79.9	0.04	3.9	0.30	0.007	0.07	0.17	0.75	1.84	0.000
	浑善达克	最大值	90.9	0.30	9.3	1.97	0.040	1.02	2.58	2.04	3.49	0.047
		平均值	85.4	0.16	7.3	0.82	0.020	0.27	0.53	1.50	2.76	0.021
		最小值	79.9	0.06	4.6	0.35	0.010	0.06	0.16	0.81	1.92	-0.004
	科尔沁	最大值	94.3	0.51	11.6	2.37	0.051	1.72	7.99	2.58	3.25	0.072
		平均值	84.8	0.16	6.9	0.89	0.019	0.40	1.22	1.30	2.53	0.026
		最小值	66.2	0.04	2.6	0.34	0.003	0.12	0.06	0.47	1.21	-0.005
中国北方戈壁及邻近蒙古戈壁和古尔班通古特沙漠	中国北方戈壁和蒙古戈壁	最大值	83.5	0.71	16.5	6.29	0.115	3.17	5.98	3.23	5.06	0.203
		平均值	71.7	0.42	11.6	2.89	0.062	1.27	2.15	2.00	3.08	0.095
		最小值	52.8	0.18	7.9	0.95	0.020	0.22	0.35	1.09	2.36	0.020
	古尔班通古特	最大值	94.3	0.79	16.5	8.54	0.180	3.97	11.35	5.63	3.36	0.300
		平均值	69.7	0.46	11.2	3.31	0.077	1.66	3.57	2.56	2.22	0.122
		最小值	47.7	0.04	2.4	0.38	0.023	0.17	0.22	0.24	0.89	0.010

损(图2)。(4) 东北的呼伦贝尔、浑善达克和科尔沁沙地的K₂O含量高于西部和中西部沙漠, 考虑到东北沙地异常高的SiO₂, 其K₂O的相对富集就尤为显著。(5) 沙漠不同粒级(<28μm、28~75μm、>75μm)的常量元素地球化学存在差异, 随粒度变粗SiO₂含量升高, 而Al₂O₃、Fe₂O₃、MgO、CaO、TiO₂和烧失量(LIO)降低

(网络版附图1, <http://earthcn.scichina.com>).

3.2 中国沙漠常量元素的区域地球化学特征

按全岩常量元素差异, 结合各个沙漠、戈壁的地理位置, 我们将中国沙漠分为西部沙漠、中西部沙漠、东北沙地和戈壁及古尔班通古特沙漠4个分区,

表 2 文献中各沙漠常量元素含量统计表^{a)}

沙漠	统计项	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅
西部沙漠	最大值	74.3	1.05	15.7	7.21	0.126	4.05	12.10	3.60	3.26	0.180
	塔克拉玛干 平均值	64.2	0.45	10.8	3.08	0.061	2.15	7.15	2.56	2.15	0.100
	最小值	51.7	0.22	9.6	1.69	0.029	1.07	2.30	2.17	1.56	0.052
	最大值	81.3	0.66	14.0	5.63	0.084	3.63	9.39	3.09	3.43	0.151
	库姆塔格 平均值	71.7	0.38	10.2	2.75	0.053	1.71	4.31	2.59	2.27	0.079
	最小值	55.3	0.20	8.1	1.52	0.031	0.55	1.45	1.36	1.66	0.051
中西部沙漠	最大值	85.2	1.00	14.0	6.10	0.085	4.10	7.39	3.65	2.68	0.057
	巴丹吉林 平均值	74.1	0.46	9.8	2.77	0.046	1.42	2.59	2.39	2.09	0.023
	最小值	54.4	0.22	6.2	0.97	0.031	0.41	1.02	1.58	1.64	0.007
	最大值	82.8	0.39	12.4	2.19	0.041	1.12	3.24	3.44	2.69	0.082
	毛乌素 平均值	79.1	0.31	9.7	1.64	0.032	0.72	1.74	2.36	2.26	0.042
	最小值	75.3	0.18	7.6	0.90	0.019	0.41	0.60	1.54	1.68	0.018
东北沙地	最大值	90.7	1.38	10.6	3.42	0.100	0.56	1.49	2.69	3.64	0.050
	浑善达克 平均值	85.2	0.35	7.7	1.20	0.029	0.31	0.64	1.81	2.73	0.027
	最小值	77.8	0.08	4.9	0.45	0.010	0.17	0.24	1.18	1.86	0.020
中国北方戈壁及邻近蒙古戈壁	最大值	61.2	1.20	16.3	8.50	0.180	16.48	18.67	1.82	3.48	0.420
	蒙古戈壁 平均值	56.2	0.92	14.5	6.80	0.132	4.57	5.66	1.37	2.79	0.253
	最小值	47.1	0.56	9.4	3.61	0.050	3.20	1.95	0.88	1.77	0.050

a) 塔克拉玛干沙漠样品的元素含量来自Honda和Shimizu(1998)、Yang等(2007)、Zhu和Yang(2009); 库姆塔格表层样品的常量元素数组来自Xu等(2011); 巴丹吉林样品的常量元素来自Hu和Yang(2016); 毛乌素样品的常量元素含量来自Liu B等(2016); 浑善达克样品的常量元素含量来自Liu和Yang(2013); 蒙古戈壁阿尔泰样品的常量元素含量来自Maher等(2009)

图 2 中国沙漠/沙地及中国北方戈壁及蒙古戈壁元素UCC标准化蜘蛛图

分别讨论其元素组成特征。

(1) 西部沙漠. 青藏高原北缘在塔里木和柴达木版块之上的塔克拉玛干、库姆塔格(Xu等, 2011)和柴达

木沙漠以较低的SiO₂(55~81.3%)和较高的CaO(1.5~27.6%)为主要特点, 由于SiO₂含量较低, Al₂O₃、Fe₂O₃、MnO、MgO和Na₂O含量相对较高(表1和图2).

(2) 中西部沙漠. 贺兰山东西两侧的巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠(Ren等, 2014; Hu和Yang, 2016)、库布其和毛乌素沙漠(Liu B等, 2016), 以中等的SiO₂含量(56.4~82.8%)和中等的CaO含量(0.6~3.3%)为主要特征, 相应地Al₂O₃、Fe₂O₃、MgO、MnO、TiO₂、Na₂O和P₂O₅等其他氧化物含量介于西部沙漠和东北沙地之间(表1和图3).

(3) 东北沙地. 中国东北的呼伦贝尔、科尔沁和浑善达克沙地(Liu和Yang, 2013)的样品以高的SiO₂和低的CaO含量为特征, 其余元素除了K₂O含量(2.17~3.49%)相对较高外, Al₂O₃、Fe₂O₃、MgO、MnO、TiO₂、Na₂O和P₂O₅的平均含量均低于西部沙漠和中西部沙漠(表1和图3).

(4) 戈壁和古尔班通古特沙漠. 中国北方和蒙古国南部的戈壁沙漠表层样品的常量元素含量与中西部沙

漠的组成较为接近, 具有中等的 SiO_2 平均含量, 其 P_2O_5 和 K_2O 平均含量较高(表1和图3). 古尔班通古特沙漠被天山和阿勒泰等山系环绕, 地理上位于准噶尔盆地, 但从构造上讲, 其与戈壁位于中亚造山带上, 其常量元素含量整体上与戈壁接近(表1和图3).

3.3 中国沙漠常量元素的变化规律

从表1可以看出, 沙漠常量元素含量的变化范围很大, 而一个元素的富集往往伴随着其余元素的相对亏损. 因此, 有必要分析沙漠不同元素间的相关关系, 结合元素在沙漠中主要矿物(何同, MLA分析结果, 未发表数据)的赋存状态, 从中找出元素的变化规律, 进而

揭示沙漠的地球化学特征.

(1) Si与Al是沙漠中含量最高的两个常量元素. SiO_2 和 Al_2O_3 总体呈显著的负相关(相关系数达0.63, $n=420$). 相关系数最高的是东北沙地(达0.90, $n=44$), 然后依次是戈壁, 西部的塔克拉玛玛干、库姆塔格和柴达木沙漠等. SiO_2 主要来自于石英和硅酸盐矿物, 而 Al_2O_3 主要来自于长石、云母、黏土矿物等铝硅酸盐矿物, SiO_2 和 Al_2O_3 的显著负相关反映了沙漠中石英对其他元素的稀释作用. 而西部的塔克拉玛玛干、库姆塔格和柴达木沙漠含有较高含量的碳酸盐矿物(Li等, 2007), 造成了 SiO_2 和 Al_2O_3 相关系数的降低和关系的复杂化(图3a).

图3 中国沙漠、沙地常量元素地球化学关系图

(a)~(i)图例见(a)、(d)、(g)和(h)所示

(2) K_2O 和 Al_2O_3 呈现显著的正相关, 并将沙漠分成两个不同区域, 东北沙地和部分戈壁样品为一个区域, 其相关系数达0.68($n=44$), 西部沙漠和中西部沙漠区域为另一区域, 相关系数达0.66($n=376$). 虽然都为显著的正相关, 但相同的 Al_2O_3 东北沙地和部分戈壁样品中 K_2O 明显更高, 显示其硅酸盐中含K矿物更为丰富. Na_2O 与 Al_2O_3 也表现出显著正相关(图3c), 并呈现出分区性, 但其分区性不如 K_2O 和 Al_2O_3 明显(图3b). 由于Na主要存在于斜长石中, K主要存在于钾长石、白云母和黏土矿物中(Jeong等, 2008), 沙漠沉积物中Na、K与Al的相关性, 更多地反映了这些矿物的含量变化基本同步. Fe_2O_3 和 Al_2O_3 亦表现出显著的正相关性, 表明存在于铁氧化物中的Fe(Lu等, 2017)和赋存于铁镁硅酸盐矿物中的Fe在沙漠形成过程中同步变化. 西部的塔克拉玛干、库姆塔格和柴达木沙漠的 Fe_2O_3 含量相对较高, 而东北沙地的 Fe_2O_3 含量偏低(图3g).

(3) CaO 与 MgO 可以以硅酸盐和碳酸盐矿物存在. 硅酸盐中, Ca主要存在于斜长石、磷灰石等矿物中, 而Mg主要存在于绿泥石和少量的角闪石、辉石、黑云母等铁镁硅酸盐矿物中, 而两者共同存在于白云石、方解石等碳酸盐矿物中. 西部和中西部沙漠中 CaO 与 MgO 总体呈较好的正相关, CaO 与 Al_2O_3 之间相关性较差, 且部分样品 CaO 含量高达15%, 说明西部沙漠中的 CaO 与碳酸盐的高含量有关(图3f). 东北沙地 CaO 与 MgO 含量低于中西部沙漠且关系较为复杂, 并且 CaO 与 Al_2O_3 呈现较好的正相关, 表明东北沙地中的Ca主要受控于硅酸盐矿物.

(4) 所有样品的 Fe_2O_3 与 MnO 和 TiO_2 呈现显著的正相关性(图3h和3i), 其中, Fe_2O_3 和 MnO 的相关系数达0.91($n=420$), Fe_2O_3 与 TiO_2 的相关系数达0.93($n=420$), 这表明, 由于Mn、Ti经常呈类质同象替换出现在含Fe矿物中, Fe、Ti和Mn在沙漠的形成与其后的地质过程中, 并不产生明显分离.

(5) MgO 与 Fe_2O_3 呈现明显的正相关, 特别是在东北沙地和中西部的沙漠, MgO 与 Fe_2O_3 显著正相关(图3d), 表明东北沙地和中西部的沙漠中的Fe和Mg主要存在于铁镁硅酸盐矿物中, 而且在沙漠的形成及其后的地质过程中不易发生分离(刘连文等, 2000); 而在西部的塔克拉玛干、库姆塔格和柴达木沙漠, 部分样品的 MgO 较高, 明显偏离 MgO 与 Fe_2O_3 相关线, 表明更多的Mg来自于碳酸盐矿物, 特别是白云石对Mg的贡献

(Li等, 2007). 西部的塔克拉玛干、库姆塔格和柴达木沙漠 MgO 与 CaO 呈现较好的正相关也反映了西部沙漠高含量的碳酸盐矿物是 MgO 和 CaO 的主要来源(图3f)(Li等, 2007).

4 讨论

4.1 中国沙漠和戈壁常量元素分区

基于中国沙漠、戈壁的常量元素含量, 有显著差别的元素主要有四类, 分别是与石英含量变化相关的 SiO_2 , 反映碳酸盐含量变化的 CaO , 指示铁镁硅酸盐与重矿物含量变化的Fe、Ti和Mn, 指示长石与云母/黏土矿物变化的 K_2O 和 Na_2O 等. 另外, MgO 的变化与碳酸盐和铁镁硅酸盐含量变化都有关系. 为消除碳酸盐含量变化的影响, 采用其他元素与 Al_2O_3 比值来指示沙漠其他元素的相对变化.

中国沙漠 SiO_2/Al_2O_3 反映了石英相对于其他硅酸盐矿物的相对变化, 其平均值为8.31($n=420$), SiO_2/Al_2O_3 从低到高依次为西部沙漠的塔克拉玛干沙漠、库姆塔格沙漠和柴达木沙漠(6.43, $n=194$), 戈壁(7.40, $n=37$), 中西部沙漠的腾格里、毛乌素和库布其、巴丹吉林沙漠(8.33, $n=124$), 古尔班通古特(8.38, $n=36$)和东北沙地(13.52, $n=44$). 西部沙漠的石英含量明显低于东部沙地.

Fe_2O_3/Al_2O_3 反映了硅酸盐矿物中铁镁硅酸盐含量的相对变化, 其平均值为0.23($n=420$); 从低到高依次为东北沙地(0.11, $n=44$), 戈壁(0.21, $n=37$), 腾格里、毛乌素和库布其沙漠(0.22, $n=124$); 西部沙漠中的巴丹吉林、塔克拉玛干沙漠、库姆塔格沙漠和柴达木沙漠(0.27, $n=194$)以及古尔班通古特沙漠(0.28, $n=36$). CaO/Al_2O_3 反映了碳酸盐矿物相对于硅酸盐矿物的含量, 其平均值为0.41($n=420$); 从低到高依次为东北沙地(0.09, $n=44$), 戈壁(0.16, $n=37$), 中西部沙漠的巴丹吉林、腾格里、毛乌素和库布其沙漠(0.22, $n=124$), 古尔班通古特(0.31, $n=36$), 塔克拉玛干沙漠、库姆塔格沙漠和柴达木沙漠(0.76, $n=194$). 西部沙漠铁镁质硅酸盐和碳酸盐矿物高于东部沙地.

Na_2O/Al_2O_3 和 K_2O/Al_2O_3 反映了硅酸盐矿物中斜长石与钾长石、白云母和黏土矿物的相对含量. 中国沙漠 K_2O/Al_2O_3 和 Na_2O/Al_2O_3 的平均值分别为0.25($n=420$)和0.23($n=420$), Na_2O/Al_2O_3 从低到高依次为戈

壁(0.14, $n=37$)、东北沙地(0.20, $n=44$)、古尔班通固特(0.23, $n=36$), 中西部沙漠中的巴丹吉林、腾格里、毛乌素和库布其沙漠(0.24, $n=124$), 西部的塔克拉玛干、库姆塔格和柴达木沙漠(0.25, $n=194$)。 K_2O/Al_2O_3 平均值依次是东北沙地(0.39, $n=44$), 戈壁(0.23, $n=37$), 中西部沙漠中的巴丹吉林、腾格里、毛乌素和库布其沙漠(0.23, $n=124$), 西部的塔克拉玛干、库姆塔格和柴达木沙漠(0.21, $n=194$)。造成这一明显差异的主要原因是东部沙地和西部沙漠中钾长石和斜长石的差异, 东部沙地钾长石含量高于西部沙漠, 西部沙漠中钠长石高于东部沙地(He等, 2016)。

根据沙漠常量元素的变化规律, 采用 $SiO_2/10$ - CaO - Al_2O_3 (图4a)、 (K_2O+Na_2O) - CaO - Fe_2O_3 (图4b)和

CaO - Na_2O - K_2O (图4c)三角图解来区分各个沙漠的区域特征。其中 $SiO_2/10$ - CaO - Al_2O_3 反映了样品中石英-碳酸盐-硅酸盐矿物的相对含量变化; (K_2O+Na_2O) - CaO - Fe_2O_3 反映了样品中长石-碳酸盐-铁镁质硅酸盐矿物的相对含量变化; 而 CaO - K_2O - Na_2O 反映了样品中碳酸盐-斜长石-钾长石/白云母的相对含量变化。在图4a中, 西部沙漠以显著高的碳酸盐矿物和较低的石英、中等含量的硅酸盐矿物为特征, 东北沙地以显著高的石英矿物为特征, 其余沙漠落于三角图中部。在图4b中, 西部沙漠以高的碳酸盐矿物含量和高的铁镁质矿物为特征, 而东北沙地的长石含量较高, 戈壁样品较为分散, 部分样品落于东北沙地区域、部分样品落于三角图中部, 中西部样品则主要落于三角图中部。在图4c中, 东

图4 中国沙漠、沙地、及洛川黄土常量元素地球化学元素三角图
(a) $SiO_2/10$ - CaO - Al_2O_3 ; (b) (Na_2O+K_2O) - CaO - Fe_2O_3 ; (c) CaO - Na_2O - K_2O

北沙地和戈壁部分样品以高的钾长石/白云母为特征.

4.2 控制中国沙漠常量元素含量变化的主要因素

中国沙漠表层物质常量元素地球化学特征受构造制约下的地表形态、物质来源和碎屑矿物组成控制,即地质构造背景控制沙漠物质来源、构建和混合.因此,形成沙漠的区域背景与构造地貌相似或相近,其物质来源和物质构成可能会相对一致.分析中国沙漠的常量元素组成及制约沙漠物源的构造背景,常量元素变化主要受控于两个方面因素:源区岩石的组成与新鲜物质的供给造成的不同沙漠矿物成熟度差异.

常量元素变化的首要因素是源区岩石的组成,集中体现在中国沙漠的CaO和K₂O含量变化上(图2和3).西部的柴达木、塔克拉玛干沙漠中CaO含量明显高于其他东部沙漠/沙地,这与他们富含碳酸盐矿物有关(Li等, 2007).虽然沙漠形成后的物理风化造成碳酸盐矿物颗粒变细并与其他较细的黏土等硅酸盐矿物一起优先被风搬运到其他地区,但Ca、Al间较差的相关性可以排除这点(图3e).沙漠形成后的化学风化会造成碳酸盐矿物淋失,但沙漠总体降雨量很低,并且缺少外流河将溶解的Ca离子带走,碳酸盐的溶解淀积对沙漠样品的CaO含量影响很少.降雨量比沙漠更高的黄土高原地区,其黄土沉积仍保存了大量的碳酸盐矿物(Meng等, 2015).已有证据表明中国多数沙漠物源的近源性(朱震达等, 1980; 陈骏和李高军, 2011; 付旭东和王岩松, 2015; Hu和Yang, 2016),沙漠沉积物来自于周边的山脉.从区域地球化学图上可以看出(谢学锦, 2012),昆仑山脉分布有大量的海相碳酸盐岩,通过河流为周边的塔克拉玛干和柴达木沙漠源源不断地提供了碳酸盐矿物,造成这两个沙漠明显高的CaO含量.库姆塔格周边的北山地区,分布有石炭纪的碳酸盐岩,古尔班通古特沙漠周边的天山、阿尔泰山都有碳酸盐岩分布(谢学锦, 2012),巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、库布其和毛乌素沙漠周边的祁连山北缘、阿拉善周边山脉及贺兰山南段均有碳酸盐地层分布,但规模和范围远不如昆仑山脉,尤其鄂尔多斯地区裸露的碳酸盐地层分布更少(Li等, 2007; 李高军, 2010; 谢学锦, 2012).因此,这些沙漠的CaO含量低于西部柴达木、塔克拉玛干沙漠.而东北的呼伦贝尔、科尔沁和浑善达克沙地,其周边缺乏碳酸岩地层,较低CaO含量体现了这一点.图2b中K₂O和Al₂O₃存在两个分区,说明不同地区

沙漠K的来源存在很大差异.东北沙地K₂O含量较高,这可能与东北地区存在富钾花岗岩、富钾玄武岩和二长花岗岩(Liu J Q等, 2016)有关,这些富K岩石风化剥蚀并被输送至浑善达克、科尔沁和呼伦贝尔沙地,造成沙漠样品的K₂O含量较高.部分中国和蒙古国相连的戈壁样品靠近东北沙地,也具有K₂O含量较高的特征.上述元素变化趋势,尤其是CaO的空间变化,与李高军等(2010)通过XRD技术获得的风尘潜在源区方解石/石英和白云石/石英最强峰比值趋势一致,进一步表明沙漠中沉积物控制碳酸盐矿物含量与剥蚀区地质背景密切相关,而碳酸盐地层分布与其控制的CaO等常量元素分布基本吻合.沙漠周边山脉的基岩类型决定沙漠沉积物石英 $\delta^{18}\text{O}$ (付旭东和杨小平, 2004; 付旭东和王岩松, 2015),这些证据均表明沙漠沉积物由其周边源岩控制.从区域构造上看,常量元素分布差异特征与前期研究发现的构造控制的Sr-Nd和Nd-Hf同位素分区基本一致(Chen等, 2007; Zhao等, 2014),这也暗示了自西向东各沙漠物质源岩的变化控制其地球化学元素的差异.

影响中国沙漠化学组成的第二个因素是新鲜物质的供给.这可从源区物质剥蚀、风化、搬运和沉积后再变化等多个方面进行分析.化学风化造成碳酸盐矿物溶解,长石、铁镁硅酸盐矿物逐渐转变为次生的黏土矿物,风化产物以溶液或悬浮物的形式搬运,在粗粒级中石英等抗风化的矿物相对富集.物理风化会使碳酸盐、铁镁硅酸盐矿物等抗物理风化能力较弱的矿物受到进一步的破碎,造成粗粒级中石英等抗风化的矿物相对富集,而碳酸盐、铁镁硅酸盐矿物、斜长石等较易破碎的矿物在悬浮物中较为富集.在分选良好的条件下,溶液或悬浮物被输送到海洋等较远的区域,而较粗的砂粒物质在沉积盆地沉积,造成沉积物化学成份发生变化;虽然也有证据表明河流的搬运过程中,石英/长石的比值并不随搬运距离而变化(Nesbitt和Young, 1996; Potter等, 2001).首先,从源区的物质的剥蚀供应和物理化学风化上看,不同沙漠差异显著.在西部沙漠,如塔克拉玛干沙漠,四周有天山、帕米尔、昆仑山和阿尔金山等高山环抱,河流落差大,植被覆盖少,山顶有大面积冰雪分布(第四纪冰期时冰川更为发育),物理剥蚀能力强,化学风化弱,第四纪以来在塔里木盆地堆积了500m以上沉积物,即使是现代,仍通过塔里木河等河流为沙漠源源不断地提供大量的物质.

而东部沙地, 其源区(如西辽河的大兴安岭)有较好的植被覆盖, 物理风化弱、化学风化强、物质供应少, 其沙地主要是草原退化起砂造成的, 缺少新鲜物质的供应. 而在中西部沙漠, 如发源于祁连山的巨厚冲积物和湖积物, 为巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠等中西部沙漠提供了物质来源, 其规模和物理、化学风化强度都介于上述两个区域之间. 其次, 从搬运的方式与结果看, 西部沙漠以内流河为主, 沙漠就是最终的沉积盆地, 悬浮物和溶解物都全部进入了沉积盆地, 因此, 分选差, 含有大量的细粒物质. 而在东部沙地, 河流以外流河为主, 悬浮物和溶解物大多进入了海洋, 供给沙漠的主要是分选较好的砂粒物质. 最后, 从沙漠形成后的物理、化学风化作用看, 西部沙漠以流动沙丘为主, 物理风化强、化学风化弱, 而东部沙地以固定沙区为主, 物理风化弱, 化学风化强.

可通过矿物的成熟度来反映上述地质过程的综合作用. 矿物成熟度是指碎屑沉积物中石英相对于碳酸盐、长石和岩屑等含量的比值(Ruxton, 1968; Blatt等, 1972; Pettijohn等, 1972), 可用 $\text{SiO}_2-(\text{Al}_2\text{O}_3+\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O})$ (Muhs, 2004)(图5a)或 $\text{SiO}_2-(\text{Al}_2\text{O}_3+\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O}+\text{CaO}+\text{MgO})$ (图5b)来表示. 从图5可以看出, 西部塔克拉玛干、柴达木和库姆塔格等沙漠的成熟度低, 临近的高山隆升和局地气候变化引起剥蚀/风化增强, 源源不断地为沙漠提供了充足的碎屑物质, 具有较低的 SiO_2 含量和较高的Fe、Mg(Lu等, 2017)、P含量, 其 $\text{SiO}_2/(\text{Al}_2\text{O}_3+\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O})$ 比值为4.21($n=194$)(图4c). 与西部沙漠性质较接近的是古尔班通古特沙漠, 接受天山和阿勒泰等剥蚀物质, 其 $\text{SiO}_2/(\text{Al}_2\text{O}_3+\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O})$ 比值为4.17. 而东北的呼伦贝尔、科尔沁和浑善达克沙地, 南部为华北克拉通, 周边地势平坦, 缺少新鲜的高山剥蚀物质供给, 其物质组成 $\text{SiO}_2/(\text{Al}_2\text{O}_3+\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O})$ 平均值高达8.26, 具有较高的 SiO_2 含量和较低的Fe、Mg、P含量. 贺兰山东西两侧的巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、库布其和毛乌素沙漠, 虽然接受周边祁连山、贺兰山的剥蚀物质供应, 但其物质供应有限, 其 $\text{SiO}_2/(\text{Al}_2\text{O}_3+\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O})$ 平均值为5.89. 沙漠 $\text{SiO}_2/(\text{Al}_2\text{O}_3+\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O})$ 的值呈现明显的西低东高的趋势(图5c).

西部沙漠主要分布在秦祁昆造山系与中亚造山带之间的华北克拉通和塔里木克拉通之上(Zheng等, 2013; 刘训等, 2012; 潘桂棠等, 2009), 被一系列山系包围而成, 四周高山的隆升和局地气候变化引起剥蚀/风

图5 沙漠沉积物常量元素表示的石英相对于碳酸盐、长石和岩屑示意图

化增强, 源源不断地为沙漠提供了充足的碎屑物质, 古尔班通古特沙漠和中国和蒙古国相连的戈壁沙漠与蒙古高原隆升后来自阿勒泰或其他高山物质剥蚀供应有关(Chen等, 2007; 陈骏和李高军, 2011; Hu和Yang, 2016); 中亚造山带南部边缘的戈壁出露玄武岩(Liu J Q等, 2016), 碱质组分高的火山岩含量也是形成常量元素分布差异的原因之一. 而东北沙地南部为华北克拉通, 东北沙地北部很少或几乎没有太古代和古元古代的基底岩石(Badarch等, 2002; Zheng等, 2013; 刘训等, 2012; 潘桂棠等, 2009), 加之中亚造山带物质的剥蚀/风化, 进而导致中国东北沙地和中国西北沙漠物质源的差异, 体现出东北沙地与西部沙漠常量元素地球化

学的差异. 而科尔沁沙地南部受燕山河流输入影响, 不排除有来自燕山少数物质的输入(谢静和丁仲礼, 2007; Zhao等, 2014), 少数几个科尔沁的样品远离东北沙地所属范围也验证了燕山物质对科尔沁沙地有贡献(图3). 总之, 中国沙漠表层样品常量元素的差异受高原隆升, 亚洲内陆干旱化和亚洲季风气候等因素共同控制, 是其源岩剥蚀风化的综合体现, 但长期风化累积造成的地球化学常量元素差异仍需要深入研究(Hu和Yang, 2016; Yang等, 2007; Zhu和Yang, 2009; 罗万银等, 2014; 王立强和王亲, 2013).

4.3 沙漠常量元素组成对黄土物源的启示

中国的沙漠/沙地、中国和蒙古国相连的戈壁释放的粉砂物质受大气环流向东或东南方向传输驱动, 粉砂物质堆积于下风向, 形成世界规模最大的黄土沉积. 从沙漠到黄土, 地表物质经过高山作用、风蚀以及其他机械搬运充分混合, 可代表大面积区域物质的平均组成. 从沙漠到黄土的搬运过程中, 如石英等抗机械破碎和抗化学风化重矿物不易破碎, 较难形成可供风力搬运的粉砂颗粒, 而粉砂质的物质优先搬运沉积. 因此, 虽然黄土继承了沙漠源区物质的组成特征, 但黄土化学组成与沙漠化学组成并不完全一致, 如黄土的 $\text{SiO}_2/(\text{Al}_2\text{O}_3+\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O})$ 比值为2.10~4.06(陈骏等, 2001; 刘连文, 2002; Xiong等, 2010), 低于最低的塔克拉玛干沙漠, 说明在沙漠向黄土的搬运过程中, 物质产生分异, 难以破碎的石英等被大量留在了沙漠, 比较重的磁性矿物不易吹走进而导致沙漠磁化率高于黄土(Maher等, 2009). 黄土沉积受风力强弱与源区远近的控制, 黄土的颗粒大小在空间与时间序列上有所不同. 冬季风强时, 离源区近时, 颗粒较粗, 反之相反. 而颗粒大小的变化一定程度上影响了黄土的化学组成(刘东生, 1985; 郭正堂和彭淑贞, 2001). Si、Na等元素更趋向于在粗颗粒中富集, Fe、Al、K和Mg等元素倾向于在细颗粒中富集. 黄土沉积后受成壤作用的影响, 加之空间化学风化差异造成黄土化学组分时空上存在变化. 夏季风强时, 靠近东南地区的黄土沉积受较多的降水作用的影响, 风化成壤作用强, Ca、Na、Mg等元素淋失(陈骏等, 2001; 刘连文, 2002). 各种复杂的空间地理因素, 造成了利用常量元素组成来追踪黄土源区的困难. 但从反映碳酸盐含量的Ca和反映硅酸盐矿物变化的Al、K和Fe等元素在沙漠与黄土中的分布特征,

仍可找到沙漠与黄土的潜在联系.

中国黄土高原黄土的一个显著特征是含有丰富的碳酸盐矿物(刘东生, 1985), 碳酸盐矿物容易溶解与沉淀, 其含量存在明显的时空差异(Meng等, 2015). 比较潜在源区、黄土和现代沙尘中的碳酸盐含量, 可为黄土中的碳酸盐矿物的来源提供信息(Li等, 2007; Wang等, 2005). 黄土中普遍含较高的碳酸盐矿物, 如用风化很弱的西部曹县黄土层来代表黄土的碳酸盐含量(约15%)(Meng等, 2015), 其不可能来源于后期的成壤作用, 沙漠的碳酸盐矿物显然是他们最主要的来源. 虽然巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、库布其和毛乌素沙漠处于黄土高原上风向, 也可为黄土高原提供一部分的碳酸盐. 黄土的 $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 值高达0.86, 远大于巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、库布其和毛乌素沙漠 $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 的平均值(0.24), 这一差别较难用硅酸盐矿物和碳酸盐矿物从沙漠到黄土搬运沉积过程中的差异性来解释, 如东北沙地的 $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 值平均为0.11, 而与此相应的东北地区黄土 $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 值平均为0.17(Xie和Chi, 2016), 碳酸盐矿物的相对富集不到两倍. 从碳酸盐矿物含量看, 只有西部的塔克拉玛干、库姆塔格和柴达木沙漠($\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 值为0.76)的加入, 才能较为合理地解释黄土高原黄土中较高的碳酸盐矿物含量的来源. 塔克拉玛干、库姆塔格和柴达木沙漠的石英 $\delta^{18}\text{O}$ 值与黄土的石英 $\delta^{18}\text{O}$ 值无显著性差异(张峰和付旭东, 2016; 霍俊澎等, 2018), 也暗示了西部沙漠是黄土高原黄土潜在的源(饶文波等, 2006; Pullen等, 2011; 李高军, 2010; 陈骏和李高军, 2011). 这一结论也与Sr-Nd同位素物源研究一致(Chen等, 2007).

硅酸盐矿物的组成也反映了源区的信息. 从图2可以看出, 同一区域的沙漠中, K、Al和Fe变化高度一致, 这种一致性有望在黄土中得以继承. $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ 和 $\text{K}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 等反映了样品的铁镁硅酸盐矿物与钾长石/云母的相对变化, 且这些指标较少受风力分选作用影响, 是进行源区示踪的较好参数. 如西峰45~75 μm 黄土的 $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ 平均值为0.27(刘连文, 2002), 白水20~63 μm 黄土和红黏土 $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ 平均值分别为0.29和0.31(Xiong等, 2010), 以上较粗颗粒黄土的 $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ 值介于西部的塔克拉玛干沙漠、柴达木和库姆塔格沙漠(平均值分别为0.30、0.24和0.27)与中西部的巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、库布其和毛乌素沙漠(平均值分别为0.24、0.26、0.22和0.17)之间. 西峰

45~75 μm 黄土的 $\text{K}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 平均值为0.21(刘连文, 2002), 白水20~63 μm 黄土和红黏土 $\text{K}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 平均值均为0.20(Xiong等, 2010), 比较接近中西部沙漠(0.21)和西部沙漠(0.23), 而明显区别于东北沙地的 $\text{K}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 值(平均值为0.44)。比较沙漠、沙地样品与黄土较粗颗粒硅酸盐组分中的 $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ 和 $\text{K}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 值, 我们认为西部沙漠和中西部沙漠是黄土高原黄土潜在的物源。从图5的三角图中可以看出, 典型的洛川黄土落在西部沙漠或中西部沙漠之间, 而偏离东北沙地较远。这表明西部的塔克拉玛干沙漠、柴达木和库姆塔格沙漠与中西部的巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、库布其和毛乌素沙漠混合是中国黄土重要的来源。另外, 中国和蒙古国相连的戈壁样品成份较为复杂, 难以厘清其与黄土的关系(Sun, 2002; Chen等, 2007; Maher等, 2009; Sun等, 2013)。

5 结论

(1) 中国沙漠地表物质的常量元素含量存在明显的区域性差异, 可分为四个区: 东北沙地、中国和蒙古国相连的戈壁和古尔班通古特沙漠、中西部沙漠和西部沙漠。 SiO_2 与 CaO 含量变化较大, SiO_2 呈现西低东高的趋势; CaO 趋势与 SiO_2 相反, 呈现西高东低。东北的呼伦贝尔、浑善达克和科尔沁沙地的 K_2O 含量相对较高。由于 SiO_2 的稀释作用, 中国沙漠相对UCC亏损 Al_2O_3 、 TiO_2 、 Fe_2O_3 、 Na_2O 、 MgO 、 P_2O_5 和 MnO 。

(2) 沙漠的元素含量变化主要受控于两个方面: 源区岩石组成与新鲜物质供给。沙漠表层沉积物反映了沙漠周边的区域构造特征, 西部沙漠和中西部沙漠受构造隆升影响, 新鲜物质供应充分, 成熟度低, $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3+\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O}$ 值低。而东北沙地, 构造稳定, 缺少新鲜物质供应, 成熟度高, $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3+\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O}$ 值高。西部沙漠源区提供了大量的碳酸盐矿物, 其 CaO 高, 而东部沙地其原岩含有钾长石等花岗岩物质, 以 K_2O 含量高为特征。通过 $\text{SiO}_2/10\text{-CaO-Al}_2\text{O}_3$ 、 $(\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O})\text{-CaO-Fe}_2\text{O}_3$ 和 $\text{CaO-Na}_2\text{O-K}_2\text{O}$ (图4), 以及常量元素体现的相对长石与碳酸盐差异(网络版附图2, <http://earthcn.scichina.com>)的三角图解都可将沙漠区分。

(3) 西部沙漠与中西部沙漠是黄土物质潜在的源区, 上风向的西部沙漠高含量碳酸盐矿物是黄土高原黄土含有丰富的碳酸盐矿物的可能原因。

致谢 感谢中国科学院地球环境研究所孙有斌研究员提供的蒙古戈壁地表样品。野外工作得到了河海大学饶文波教授以及南京大学王晓勇副教授、孟先强博士、何同博士、达佳伟和李石磊等同仁的帮助, 特此致谢。

参考文献

- 陈骏, 安芷生, 刘连文, 季峻峰, 杨杰东, 陈旸. 2001. 最近2.5Ma以来黄土高原风尘化学组成的变化与亚洲内陆的化学风化. 中国科学D辑: 地球科学, 31: 136-145
- 陈骏, 李高军. 2011. 亚洲风尘系统地球化学示踪研究. 中国科学: 地球科学, 41: 1211-1232
- 陈思宇, 黄建平, 李景鑫, 贾瑞, 江南萱, 康丽泰, 马骁骏, 谢亭亭. 2017. 塔克拉玛干沙漠和戈壁沙尘起沙、传输和沉降的对比研究. 中国科学: 地球科学, 47: 939-957
- 方小敏, 吕连清, 杨胜利, 李吉均, 安芷生, 蒋平安, 陈秀玲. 2001. 昆仑山黄土与中国西部沙漠发育和高原隆升. 中国科学D辑: 地球科学, 31: 177-184
- 付旭东, 王岩松. 2015. 中国沙漠物源研究: 回顾与展望. 沉积学报, 33: 1063-1073
- 付旭东, 杨小平. 2004. 中国北方沙漠石英 $\delta^{18}\text{O}$ 值的初步测定与分析. 第四纪研究, 24: 243
- 郭正堂. 2017. 黄土高原见证季风和荒漠的由来. 中国科学D辑: 地球科学, 47: 421-437
- 郭正堂, 彭淑贞. 2001. 风尘堆积中 $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ 值与粒度的关系及其对东亚冬季风的指示意义. 中国科学D辑: 地球科学, 31(增刊): 209-214
- 霍俊澎, 郭浩, 郭翠萍, 辛智鸣. 2018. 中国主要沙漠(沙地)的氧同位素含量特征. 干旱区研究, 35: 471-476
- 季峻峰, 王洪涛, 陈骏. 1997. 陕西洛川黄土-古土壤剖面中伊利石结晶度——黄土物质来源和古气候环境指示. 地质评论, 43: 181-185
- 李高军. 2010. 东亚风尘物源地球化学示踪研究. 博士学位论文. 南京: 南京大学
- 刘东生. 1985. 黄土与环境. 北京: 科学出版社
- 刘嘉琪, 秦小光. 2005. 塔里木盆地的环境格局与绿洲演化. 第四纪研究, 25: 533-539
- 刘连文. 2002. 3.6Ma来黄土高原中国季风演化的矿物与元素地球化学研究. 博士学位论文. 南京: 南京大学
- 刘连文, 陈骏, 王洪涛, 陈旸. 2000. 一个不受风力分选作用影响的化学风化指标: 黄土酸不溶物中的 Fe/Mg 值. 科学通报, 46: 579-582
- 刘训, 李廷栋, 耿树方, 游国庆. 2012. 中国大地构造区划及若干问题. 地质通报, 31: 1024-1034
- 鹿化煜, 郭正堂. 2013. 晚新生代东亚气候变化: 进展与问题. 中国科学: 地球科学, 43: 1907-1918
- 罗万银, 董治宝, 钱广强, 冯益明, 逯军峰, 王蒙, 任小玢, 李继彦.

2014. 戈壁表层沉积物地球化学元素组成及其沉积意义. *中国沙漠*, 34: 1441–1453
- 潘桂棠, 肖庆辉, 陆松年, 邓晋福, 冯益民, 张克信, 张智勇, 王方国, 邢光福, 郝国杰, 冯艳芳. 2009. 中国大地构造单元划分. *中国地质*, 36: 1–28
- 饶文波, 杨杰东, 陈骏, 李高军. 2006. 中国干旱-半干旱区风尘物质的 Sr, Nd 同位素地球化学: 对黄土来源和季风演变的指示. *科学通报*, 51: 25–38
- 强小科, 安芷生, 宋友桂, 常宏, 孙有斌, 刘卫国, 敖红, 董吉宝, 符超峰, 吴枫, 卢凤艳, 蔡演军, 周卫健, 曹军骥, 徐新文, 艾莉. 2010. 晚渐新世以来中国黄土高原风成红粘土序列的发现: 亚洲内陆干旱化起源的新记录. *中国科学: 地球科学*, 40: 1469–1488
- 王国灿, 曹凯, 张克信, 王岸, 刘超, 孟艳宁, 徐亚东. 2011. 青藏高原新生代构造隆升阶段的时空格局. *中国科学: 地球科学*, 41: 332–349
- 王立强, 王亲. 2013. 河西走廊及其毗邻地区地表物沉积元素特征. *西北地质*, 46: 69–80
- 谢静, 丁仲礼. 2007. 中国东北部沙地重矿物组成及沙源分析. *中国科学D辑: 地球科学*, 37: 1065–1072
- 谢学锦. 2012. *中国地球化学图集*. 北京: 地质出版社
- 辛后田, 王惠初, 周世军. 2006. 柴北缘的大地构造演化及其地质事件群. *地质调查与研究*, 29: 311–320
- 杨杰东, 陈骏, 饶文波, 李高军, 季峻峰. 2007. 中国沙漠同位素分区特征. *地球化学*, 36: 516–524
- 张峰, 付旭东. 2016. 塔克拉玛干沙漠石英氧同位素与粒级关系的研究. *地质论评*, 62: 73–82
- 朱震达, 吴正, 刘恕, 邸醒民. 1980. *中国沙漠概论*(修订版). 北京: 科学出版社
- Bauluz B, Mayayo M J, Fernandez-Nieto C, Gonzalez Lopez J M. 2000. Geochemistry of Precambrian and Paleozoic siliciclastic rocks from the Iberian Range (NE Spain): Implications for source-area weathering, sorting, provenance, and tectonic setting. *Chem Geol*, 168: 135–150
- Badarch G, Dickson Cunningham W, Windley B F. 2002. A new terrane subdivision for Mongolia: Implications for the Phanerozoic crustal growth of Central Asia. *J Asian Earth Sci*, 21: 87–110
- Blatt H, Middleton G, Murray R. 1972. *Origin of Sedimentary Rocks*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall
- Chen J, Li G J, Yang J D, Rao W B, Lu H Y, Balsam W, Sun Y B, Ji J F. 2007. Nd and Sr isotopic characteristics of Chinese deserts: Implications for the provenances of Asian dust. *Geochim Cosmochim Acta*, 71: 3904–3914
- Engelbrecht J P, Derbyshire E. 2010. Airborne mineral dust. *Elements*, 6: 241–246
- Guo Z T, Ruddiman W F, Hao Q Z, Wu H B, Qiao Y S, Zhu R X, Peng S Z, Wei J J, Yuan B Y, Liu T S. 2002. Onset of Asian desertification by 22 Myr ago inferred from loess deposits in China. *Nature*, 416: 159–163
- He T, Liu L, Chen Y, Sheng X, Ji J. 2016. Plagioclase sub-species in Chinese loess deposits: Implications for dust source migration and past climate change. *Quat Res*, 85: 17–24
- Honda M, Shimizu H. 1998. Geochemical, mineralogical and sedimentological studies on the Taklimakan Desert sands. *Sedimentology*, 45: 1125–1143
- Hu F G, Yang X P. 2016. Geochemical and geomorphological evidence for the provenance of Aeolian deposits in the Badain Jaran Desert, northwestern China. *Quat Sci Rev*, 131: 179–192
- Jeong G Y, Hillier S, Kemp R A. 2008. Quantitative bulk and single-particle mineralogy of a thick Chinese loess-paleosol section: Implications for loess provenance and weathering. *Quat Sci Rev*, 27: 1271–1287
- Li L, Chen J, Chen Y, Hedding D W, Li T, Li L, Liu X, Zeng F, Wu W, Zhao L, Li G. 2018. Uranium isotopic constraints on the provenance of dust on the Chinese Loess Plateau. *Geology*, 46: 747–750
- Li G J, Chen J, Chen Y, Yang J D, Ji J F, Liu L W. 2007. Dolomite as a tracer for the source regions of Asian dust. *J Geophys Res*, 112: D17201
- Liu B, Jin H, Sun Z, Zhao S. 2016. Geochemical weathering of Aeolian sand and its palaeoclimatic implications in the Mu Us Desert, northern China, since the Late Holocene. *J Arid Land*, 8: 647–659
- Liu C Q, Masuda A, Okada A, Yabuki S, Zhang J, Fan Z L. 1993. A geochemical study of loess and desert sand in northern China: Implications for continental crust weathering and composition. *Chem Geol*, 106: 359–374
- Liu C Q, Masuda A, Okada A, Yabuki S, Fan Z L. 1994. Isotope geochemistry of Quaternary deposits from the arid lands in Northern China. *Earth Planet Sci Lett*, 127: 25–38
- Liu J Q, Chen L H, Zeng G, Wang X J, Zhong Y, Yu X. 2016. Lithospheric thickness controlled compositional variations in potassic basalts of Northeast China by melt-rock interactions. *Geophys Res Lett*, 43: 2582–2589
- Liu Z, Yang X P. 2013. Geochemical-geomorphological evidence for the provenance of Aeolian sands and sedimentary environments in the Hunshandake Sandy Land, Eastern Inner Mongolia, China. *Acta Geol Sin-Engl Ed*, 87: 871–884
- Lu W Y, Zhao W C B, WLu H Y, Liu P, Lu Z L, Ji J F. 2017. Iron mineralogy and speciation in clay-sized fractions of Chinese desert sediments. *J Geophys Res-Atmos*, 122: 13,458–13,471
- Maher B A, Mutch T J, Cunningham D. 2009. Magnetic and geochemical characteristics of Gobi Desert surface sediments: Implications for provenance of the Chinese Loess Plateau. *Geology*, 37: 279–282

- Meng X Q, Liu L W, Balsam W, Li S L, He T, Chen J, Ji J F. 2015. Dolomite abundance in Chinese loess deposits: A new proxy of monsoon precipitation intensity. *Geophys Res Lett*, 42: 10391–10398
- Muhs D R. 2004. Mineralogical maturity in dunefields of North America, Africa and Australia. *Geomorphology*, 59: 247–269
- Nesbitt H, Young G. 1996. Petrogenesis of sediments in the absence of chemical weathering: Effects of abrasion and sorting on bulk composition and mineralogy. *Sedimentology*, 43: 341–358
- Pettijohn F J, Potter P E, Siever R. 1972. Sand and Sandstone. New York: Springer-Verlag
- Potter P E, Huh Y, Edmond J M. 2001. Deep-freeze petrology of Lena River sand, Siberia. *Geology*, 29: 999
- Pullen A, Kapp P, McCallister A T, Chang H, Gehrels G E, Garzione C N, Heermance R V, Ding L. 2011. Qaidam Basin and northern Tibetan Plateau as dust sources for the Chinese Loess Plateau and paleoclimatic implications. *Geology*, 39: 1031–1034
- Ren X Z, Yang X P, Wang Z T, Zhu B Q Z D G, Rioual P. 2014. Geochemical evidence of the sources of Aeolian sands and their transport pathways in the Minqin Oasis, northwestern China. *Quat Int*, 334-335: 165–178
- Ruxton B P. 1968. Measures of the degree of chemical weathering of rocks. *J Geol*, 76: 518–527
- Shao Y, Dong C H. 2006. A review on East Asian dust storm climate, modelling and monitoring. *Glob Planet Change*, 52: 1–22
- Smalley I. 1995. Making the material: The formation of silt sized primary mineral particles for loess deposits. *Quat Sci Rev*, 14: 645–651
- Sun J. 2002. Provenance of loess material and formation of loess deposits on the Chinese Loess Plateau. *Earth Planet Sci Lett*, 203: 845–859
- Sun Y, Chen H, Tada R, Weiss D, Lin M, Toyoda S, Yan Y, Isozaki Y. 2013. ESR signal intensity and crystallinity of quartz from Gobi and sandy deserts in East Asia and implication for tracing Asian dust provenance. *Geochem Geophys Geosyst*, 14: 2615–2627
- Sun Y, Tada R, Chen J, Chen H, Toyoda S, Tani A, Isozaki Y, Nagashima K, Hasegawa H, Ji J. 2007. Distinguishing the sources of Asian dust based on electron spin resonance signal intensity and crystallinity of quartz. *Atmos Environ*, 41: 8537–8548
- Tapponnier P, Molnar P. 1976. Slip-line field theory and large-scale continental tectonics. *Nature*, 264: 319–324
- Wang X, Xia D, Zhang C, Lang L, Hua T, Zhao S. 2012. Geochemical and magnetic characteristics of fine-grained surface sediments in potential dust source areas: Implications for tracing the provenance of Aeolian deposits and associated palaeoclimatic change in East Asia. *Palaeogeogr Palaeoclimatol Palaeoecol*, 323-325: 123–132
- Wang Y Q, Zhang X Y, Arimoto R, Cao J J, Shen Z X. 2005. Characteristics of carbonate content and carbon and oxygen isotopic composition of northern China soil and dust aerosol and its application to tracing dust sources. *Atmos Environ*, 39: 2631–2642
- Xie Y, Chi Y. 2016. Geochemical investigation of dry- and wet-deposited dust during the same dust-storm event in Harbin, China: Constraint on provenance and implications for formation of Aeolian loess. *J Asian Earth Sci*, 120: 43–61
- Xiong S, Ding Z, Zhu Y, Zhou R, Lu H. 2010. A ~6 Ma chemical weathering history, the grain size dependence of chemical weathering intensity, and its implications for provenance change of the Chinese loess-red clay deposit. *Quat Sci Rev*, 29: 1911–1922
- Xu Z, Lu H, Zhao C, Wang X, Su Z, Wang Z, Liu H, Wang L, Lu Q. 2011. Composition, origin and weathering process of surface sediment in Kumtagh Desert, Northwest China. *J Geogr Sci*, 21: 1062–1076
- Yang X, Zhu B, White P D. 2007. Provenance of Aeolian sediment in the Taklamakan Desert of western China, inferred from REE and major-elemental data. *Quat Int*, 175: 71–85
- Zhao W, Sun Y, Balsam W, Lu H, Liu L, Chen J, Ji J. 2014. Hf-Nd isotopic variability in mineral dust from Chinese and Mongolian deserts: Implications for sources and dispersal. *Sci Rep*, 4: 5837
- Zheng H. 2016. Asia dust production ramped up since latest Oligocene driven by Tibetan Plateau uplift. *Natl Sci Rev*, 3: 271–274
- Zheng H, Wei X, Tada R, Clift P D, Wang B, Jourdan F, Wang P, He M. 2015. Late Oligocene-early Miocene birth of the Taklimakan Desert. *Proc Natl Acad Sci USA*, 112: 7662–7667
- Zheng Y F, Xiao W J, Zhao G. 2013. Introduction to tectonics of China. *Gondwana Res*, 23: 1189–1206
- Zhu B, Yang X. 2009. Chemical weathering of detrital sediments in the Taklamakan Desert, Northwestern China. *Geogr Res*, 47: 57–70

(责任编辑: 吴海斌)