看见黑洞: “人类公布首张黑洞照片”事件解读

袁峰^{1,2}

1. 中国科学院上海天文台, 上海 200030;

2. 中国科学院大学, 北京 100049

E-mail: fyuan@shao.ac.cn

北京时间 2019 年 4 月 10 日 21 时, 全球六个城市(美国华盛顿、比利时布鲁塞尔、智利圣地亚哥、中国上海、中国台北和日本东京)同时召开新闻发布会, 公布了人类拍到的第一张黑洞照片。此次发布的黑洞图像揭示了室女座星系团中超大质量星系 M87 中心的黑洞。该黑洞距离地球 5500 万光年(1 光年= 9.4607×10^{15} m), 质量为太阳的 65 亿倍。该照片不只是在天体物理学术界, 甚至在整个社会上也引起了很大轰动。本文将介绍这张黑洞照片的来龙去脉。

1 黑洞的基本概念

1.1 牛顿力学下暗星的概念

我们知道, 一个物体要想从一个天体表面逃逸, 其速度需要大于天体的逃逸速度。逃逸速度的大小取决于天体的质量和半径。18 世纪时, 科学家们认为光就像牛顿所描述的那样, 是由微粒组成的, 这些光微粒也会像其他物体一样受到引力的影响。这样的话, 如果宇宙中存在一种天体, 其质量很大但半径很小, 以至于逃逸速度等于甚至大于光速, 那么连光也不能逃脱该天体的引力束缚, 该星体看起来就是黑的。这就是暗星的概念, 它是 1783 年由约翰·米歇尔提出的, 这也是最早的黑洞的概念。

1.2 广义相对论下的黑洞

上述推理是基于牛顿力学。但我们知道, 当引力很强时, 牛顿力学不再适用。1915 年, 爱因斯坦提出了广义相对论。1916 年, 德国物理学家史瓦西得到了球对称情况下爱因斯坦场方程的严格解。该解描述的是有质量的点周围时空的几何结构, 发现该质点会扭曲周围的时空, 使得某个临界半径以内的空间与宇宙的其余部分相隔绝。该临界半径称为史瓦西半径, 任何物体(包括光线)都无法从该半径逃逸出去。这就是严格的、广义相对论下的黑洞, 而史瓦西半径所确定的球面就是该黑洞的表面, 又称为事件视界。巧合的是, 广义相对论下计算出的黑洞半径与牛顿力学下得到的黑洞半径完全吻合。描述一个黑洞只需要 3 个物理量: 质量、自旋以及电荷。天体物理学研究中最关注的是质量和自旋。

袁峰 中国科学院上海天文台研究员、副台长、学术委员会主任。1991 年毕业于山东大学物理系, 1997 年获中国科学技术大学理学博士学位。1998~2005 年先后在南京大学、德国马普射电天文研究所、美国哈佛大学、美国普渡大学进行博士后研究工作。2005 年入选中国科学院“百人计划”回国, 2008

年获国家杰出青年科学基金资助。主要研究方向是黑洞天体物理学。

那么, 黑洞是否在宇宙中真实存在呢? 如果存在的话, 是如何形成的呢?

2 天体物理学中的黑洞

2.1 宇宙中的黑洞是如何形成的?

一个恒星之所以能够处于流体静力学平衡, 而没有在恒星各部分之间引力的作用下塌缩, 是因为恒星内部的高温气体中的压强梯度力能与引力相抗衡, 而气体的高温来源于恒星的核聚变反应。一般来说, 当一颗恒星耗尽了核燃料时, 温度降低, 压强梯度力就无法与引力抗衡, 物质会朝着中心迅速塌缩, 一部分物质被抛向宇宙空间, 而剩下的物质则在自身引力作用下朝中心聚集, 形成一个致密天体。若原先的恒星质量足够大——大于大约 20 倍太阳质量(1 太阳质量= 1.9891×10^{30} kg), 爆发后形成的致密天体就是黑洞。这样形成的黑洞质量一般在 10 倍太阳质量左右, 称为恒星级黑洞, 预计在类似银河系的一个星系中至少有几亿颗。但由于它们绝大部分缺乏吸积原料, 因而很难观测到, 目前只在银河系内观测到了二十多颗。

除了恒星级黑洞之外, 观测发现还存在超大质量黑洞。它们的质量一般是几十万倍到几十亿倍太阳质量, 几乎存在于宇宙中每个星系的中心, 包括银河系。关于超大质量黑洞的形成机制, 目前还是一个未解决的问题。

2.2 黑洞周围的物理过程：吸积与外流

可以想象, 黑洞这一奇特天体的存在会导致许多有趣的天文现象. 事实也的确如此, 宇宙中大部分的高能量、快速光变、爆发现象都与黑洞有关. 除了理解这些天文现象, 黑洞周围的超强引力场、高能量密度、高温也提供了理想的发展和检验物理规律——如广义相对论——的实验室. 因此, 黑洞天体物理学一直是天体物理学的重要研究方向.

黑洞最主要的特征之一就是它的强引力, 周围的气体在其引力作用下会向黑洞下落, 该过程称为黑洞吸积. 由于气体一般携带着角动量, 因此会形成一个盘状结构, 称为黑洞吸积盘. 黑洞吸积理论的核心问题之一就是气体的角动量如何转移出去. 研究表明, 角动量的转移机制是吸积盘中的磁转动不稳定性, 该不稳定性导致了磁流体动力学湍流, 对应的麦克斯韦应力以及雷诺应力能够有效转移角动量^[1]. 该研究解决了角动量转移这一重要问题, 因此在2013年获得了具有“东方诺贝尔奖”之称的邵逸夫天文奖.

气体在下落过程中引力势能转化成内能和动能, 因此到达黑洞附近的气体温度可以达到几百万到几百亿摄氏度. 这些高温等离子体会发出强烈的多波段电磁辐射, 同时还会产生喷流以及风^[2]. 这种由于吸积导致的辐射是一种非常高效的能量释放机制, 效率甚至比核反应还高10倍以上.

描述吸积的流体力学方程组是含时、非线性的偏微分方程组, 吸积过程又涉及广义和狭义相对论、磁流体力学、辐射物理等, 因此方程的求解非常困难. 早期的研究主要是通过解析方法进行的, 必须对方程组进行简化. 随着研究的深入以及观测对理论要求的提高, 解析方法逐渐无法满足要求, 近年来运用超级计算机进行大规模数值模拟的方法起着越来越重要的作用^[3]. 实际上, 这也是整个天体物理学研究的发展状况. 正如国际著名天体物理学家 Martin Rees 所说, 天文学研究近20年来的飞速发展, 就是归功于越来越强大的望远镜以及越来越强大的超级计算机这两个方面. 对于黑洞吸积理论而言, 近20年来的主要进展, 如前面提到的获得邵逸夫奖的磁转动不稳定性问题以及吸积过程中“风”的问题、超爱丁顿吸积问题等, 都是数值模拟带来的成果. 另外, 本次“M87 黑洞”成就的取得, 观测固然起到了决定性作用, 但数值模拟也同样起到了不可替代的重要作用.

黑洞吸积是黑洞天体物理学中几个分支领域的核心理论: (1) 活动星系核. 活动星系核指的是活动性很强的星系的核心, 其发现是20世纪天文学四大发现之一. 活动星系核的物理机制就是星系中心的超大质量黑洞的吸积. (2) 伽马射线暴. 伽马射线暴是宇宙中仅次于最初的宇宙大爆炸的最强爆发现象, 其机制是新诞生的黑洞的快速吸积, 或者是两个致密天体并合后形成的黑洞或者中子星的吸积.

(3) 黑洞 X 射线双星. 黑洞 X 射线双星是黑洞和恒星相互绕转的双星系统, 恒星包层或星风物质被黑洞俘获形成吸积. (4) 黑洞潮汐撕裂恒星事件. 靠近黑洞的恒星在黑洞的潮汐力作用下会被黑洞撕碎, 一部分气体被吸积进入黑洞.

3 广义相对论以及黑洞的实验证据

在介绍此次 M87 黑洞照片之前, 先介绍两个近年来得到的有关黑洞以及广义相对论的实验证据. 一个是关于银河系中心超大质量黑洞的观测证据. 利用位于智利的 VLT 以及夏威夷的 Keck 两个最先进的光学望远镜, 经过多年观测, 科学家们成功地得到了银河系中心区域一些恒星的运动轨迹, 发现这些恒星都在围绕一个不可见的质量中心做开普勒运动. 通过开普勒定律, 可以很容易地计算得到该引力中心的质量, 大约为 400 万倍的太阳质量. 另外, 个别恒星的运动轨迹能够把这些质量限制在一个大约 125 天文单位 (astronomical unit, AU, 1AU=149597870700 m) 的狭小空间中. 这两个结果结合在一起, 就提供了银河系中心存在一个超大质量黑洞的很强的观测证据^[4]. 这一研究获得了2008年的邵逸夫天文奖. 另一个著名实验是引力波的发现. 1916年, 爱因斯坦根据广义相对论预言, 时空扰动会在空间中以波的形式向外传播, 传播速度等于光速. 两个致密天体 (如黑洞) 的相互绕转就能够产生很强的时空扰动. 2016年2月, 基于位于美国华盛顿州以及路易斯安那州的两台激光干涉仪的探测结果, LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) 合作团队宣布他们终于成功探测到了引力波. 这次引力波事件源于发生在 13 亿年前的两个质量约为 30 倍太阳质量的黑洞的碰撞, 产生的引力波经过 13 亿年的长途跋涉, 于 2015 年 9 月 14 日到达地球. 这一发现获得了 2017 年的诺贝尔物理学奖.

4 EHT(Event Horizon Telescope)项目：直接给黑洞拍照

4.1 给黑洞拍照：技术挑战

黑洞最主要的特征就是其周围强烈的时空弯曲, 因此人们最希望直接看到这一弯曲. 要做到这一点, 最好的办法就是给黑洞拍照. 然而, 要做到这一点非常困难, 主要障碍在于对望远镜的分辨率要求非常高. 以 M87 黑洞为例, 尽管黑洞半径有几十亿千米之大, 但是该黑洞距离我们有 5500 万光年之遥, 因此该黑洞的角大小非常小. 引用 EHT 国际合作团队喜欢用的一个比方: “想在地球上看到该黑洞, 相当于要从巴黎看清楚放在纽约的一张报纸上的文字”. 从这个角度来说, 要给黑洞拍照, 应该选择一个角大小比较大的黑洞, 宇宙中最合适的候选体就是银河系中心黑洞以及 M87 黑洞.

望远镜的分辨率取决于观测波长以及望远镜口径这

两个因素. 波长越短、口径越大, 分辨率就越高. 综合考虑这两个因素, 结合我们的技术条件, 目前最合适的就是用甚长基线干涉技术(very-long-baseline interferometry, VLBI)在毫米波段进行观测. 利用这一技术, 能够把位于地球上不同地方的射电望远镜联合在一起进行观测, 在分辨率方面其效果相当于能够获得一个口径如地球直径这么巨大的虚拟射电望远镜. 在更短的波长, 如光学波段, 人类的技术目前只能实现两台距离 100 m 左右的望远镜之间的干涉. 因此, 虽然光学望远镜观测波长短, 但是达到的分辨率远远不如射电波段.

EHT 就是基于上述思想, 利用全球 8 台射电望远镜, 由来自全球十几个国家和地区的二百多名学者组成的国际合作项目. 正如该项目的名字表明的, 其目标就是给黑洞的视界拍照^[5].

4.2 黑洞照片: 理论预言

黑洞本身是不发光的, 如何给黑洞拍照? 或者说, 即使射电望远镜拍到了一张照片, 我们如何相信这张照片确实是黑洞呢? 这两个问题跟照片的科学意义联系在一起.

要回答这两个问题, 必须借助于黑洞吸积理论. 如前所述, 黑洞周围的吸积盘会发出强烈的辐射, 这些辐射必定会受到黑洞的强引力场的影响. 若能在广义相对论框架下计算出这些辐射以及黑洞给辐射打下的“烙印”, 即得到一张理论照片, 就可以跟望远镜得到的实际照片进行对比. 若一致, 则证明得到的就是黑洞的照片, 也就验证了广义相对论.

近年来, 由于黑洞吸积数值模拟的快速发展, 这样的计算已经能够实现^[2]. 这也是本次 EHT 国际合作理论组的任务. 该组的科学家对黑洞吸积流进行了严格的三维、广义相对论框架下的磁流体动力学数值模拟, 得到吸积流的

动力学, 包括空间中每一处吸积等离子体的密度、温度、速度、磁场强度等物理量, 然后基于该结果进行广义相对论框架下光线追踪以及辐射转移的详细计算, 从而得到广义相对论预言的黑洞周围的辐射场的图像^[6]. 如图 1 所示, 将该图像与 EHT 望远镜得到的照片进行了比较, 发现两者在误差范围内符合得非常好.

4.3 黑洞照片的解释

图 1(a)就是人类得到的第一张黑洞照片. 这张照片有 3 个主要特征: 一是中心是几乎不发光的区域, 称为黑洞的阴影; 二是阴影周围有一个比较明亮的亮环; 三是该亮环亮度上下不对称. 这些特征的物理机制是什么呢?

首先需要指出, 阴影并不对应黑洞视界, 而是对应着广义相对论下的光子俘获半径, 其大小差不多是不旋转黑洞半径的 2.6 倍. 光子俘获半径的物理意义解释如下: 假定向黑洞射出一组平行光, 取决于光子的瞄准距离, 这些光子的命运也不相同. 若瞄准距离小于俘获半径, 则光子做一个类似抛物线的运动后会落入黑洞; 若瞄准距离大于该半径, 则光子绕黑洞做曲线运动后会最终逃离黑洞. 因此, 处于俘获半径之内的气体发出的辐射会有较大概率落入黑洞无法到达望远镜, 导致黑洞阴影. 处于俘获半径附近的气体发出的光子, 其测地线会围绕黑洞很多圈才到达望远镜. 若辐射气体是光学薄的, 则该半径处的所有气体都对辐射有贡献, 再加上吸积盘的辐射亮度本来也是随着半径减小而增加的, 因此辐射看起来就特别亮. 这就是我们看到的围绕阴影的亮环的形成原因.

亮环上方和下方不对称是由多普勒效应引起的. 亮环下半部分的气体朝着我们运动, 导致气体的辐射变强; 反之, 亮环上半部分的气体离我们远去, 故气体的辐射变弱.

图 1 EHT 观测到的以及数值模拟预言的黑洞图片对比. (a) EHT 得到的 M87 黑洞的图片; (b) 黑洞吸积的广义相对论磁流体动力学数值模拟得到的理论黑洞图片; (c) 理论结果与 EHT 仪器参数进行卷积后得到的黑洞图片^[6]

Figure 1 Comparison between images obtained by the EHT and numerical simulations. (a) Image of M87 black hole obtained by the EHT; (b) black hole image obtained by the general relativity magnetohydrodynamical numerical simulation; (c) model image convolved with the parameters of the EHT^[6]

详细的计算表明,这里的气体朝向以及远离我们运动,并不是简单的吸积盘的转动导致的,而主要是由黑洞转动控制的喷流或者外流气体的转动导致的.所以,光环的不对称本质上体现的是黑洞的旋转方向^[6].

4.4 黑洞照片的科学意义

这张黑洞照片,除了满足人类“看到黑洞真容”这一好奇心之外,当然还具有重大的科学价值.基于广义相对论理论预言的黑洞图像与观测到的图像的一致完美验证了广义相对论.100年前,科学家们通过测量经过太阳附近的光线偏折首次检验了广义相对论的正确性,但那是在弱场近似下检验的.如果说引力波的发现首次通过“听见”的方式检验了广义相对论,此次黑洞照片则是首次在强场情况下,通过“看见”的方式验证了广义相对论.

4.5 中国学者在 EHT 项目中的贡献

我国天文学界有很多学者从事黑洞天体物理学研究工作,在有关黑洞吸积理论、超大质量黑洞的高分辨率射电观测、活动星系核等方面已经完成了不少有较高国际显

示度的工作^[2,7,8].比如,与这次 M87 黑洞的观测一样,也是基于 VLBI 技术,Shen 等人^[7]首次成功地在 7 mm 波长测量得到了银河系中心超大质量黑洞射电源的大小.此次共有 16 名中国学者参与了 EHT 国际合作,具体贡献包括早期 EHT 项目申请、EHT 望远镜观测时间的申请、具体观测以及数据处理、观测结果的理论分析等.此外,笔者还是“论文发表工作组”的成员,与其他 4 位成员一起负责 EHT 项目论文的内部审稿与质量把关.

5 EHT 的下一步研究计划

除了 M87 星系的黑洞外,科学家们还同时拍摄了银河系中心超大质量黑洞的照片.由于太阳系位于银河系盘面上,太阳系和银河系中央黑洞之间存在着很多的尘埃、气体.由于这些阻挡物的存在,加上银河系中心黑洞光变时标较短,给处理观测数据带来了许多额外的挑战.因此,银河系中心黑洞的照片需要更长的时间才能面世.此外,EHT 还将在其他更短的波长,针对其他黑洞进行更多的观测.这些观测对于理解吸积、喷流、风等天体物理学问题将会有重要帮助.

致谢 感谢国家重点研发计划(2016YFA0400704)、国家自然科学基金(11573051, 11633006)和中国科学院前沿科学计划研究项目(QYZDJSSW-SYS008)资助.

推荐阅读文献

- Balbus S A, Hawley J F. Instability, turbulence, and enhanced transport in accretion disks. *Rev Mod Phys*, 1998, 70: 1
- Yuan F, Narayan R. Hot accretion flows around black holes. *Annu Rev Astron Astr*, 2014, 52: 529–588
- Yuan F, Chen P F, Li B. Research progress and future prospect of radiative magnetohydrodynamics numerical simulations in astrophysics and space physics (in Chinese). *Chin Sci Bull*, 2018, 63: 371–384 [袁峰, 陈鹏飞, 李波. 天体物理和空间物理中辐射磁流体动力学数值模拟研究现状与展望. *科学通报*, 2018, 63: 371–384]
- Genzel R, Eisenhauer F, Gillessen S. The Galactic center massive black hole and nuclear star cluster. *Rev Mod Phys*, 2010, 82: 3121
- The Event Horizon Telescope Collaboration. First M87 Event Horizon Telescope results. I. The shadow of the supermassive black hole. *Astrophys J Lett*, 2019, 875: L1
- The Event Horizon Telescope Collaboration. First M87 Event Horizon Telescope results. V. Physical origin of the asymmetric ring. *Astrophys J Lett*, 2019, 875: L5
- Shen Z Q, Lo K Y, Liang M C, et al. A size of ~ 1 AU for the radio source Sgr A* at the centre of the Milky Way. *Nature*, 2005, 438: 62–64
- Ho L C. Nuclear activity in nearby galaxies. *Annu Rev Astron Astr*, 2008, 46: 475–539

Summary for “看见黑洞——‘人类公布首张黑洞照片’事件解读”

Catch sight of the first black hole: Interpretation of the event of obtaining the first black hole image in human history

Feng Yuan^{1,2}

¹ Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200030, China;

² University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

E-mail: fyuan@shao.ac.cn

On April 10, 2019, the first image of the black hole we have ever obtained in human history, which is the supermassive black hole located in the M87 galaxy, was released by the Event Horizon Telescope (EHT) collaboration. This is a big event in the scientific community. In this article, we will interpret some scientific issues related to this image.

The concept of black holes can be traced back to the 18th century, although it is based on Newtonian mechanics which is actually not applicable to black holes due to its extremely strong gravity. The rigorous study of black holes started in 1915, when Einstein presented the theory of general relativity and the black hole solution was obtained the next year. Later, it was shown that the black hole can be formed in the real universe as the ending of evolution of massive stars. Now we know that black holes are quite common in the universe. In each galaxy like our Milky Way, there are about 100 million stellar-mass black holes, while in the center of almost every galaxy, there is at least one supermassive black hole.

Because of its strong gravity, gas and stars surrounding a supermassive black hole fall onto it, which is called black hole accretion. In this process, the gravitational energy of the gas is converted into the thermal and kinetic energy of the accreting gas, and thus strong radiation will be emitted. In addition to radiation, black hole accretion also produces strong wind and jet. Black hole accretion is now recognized to be a fundamental physical process in the universe and is believed to be powering many interesting astrophysical phenomena, such as active galactic nuclei, black hole X-ray binaries, gamma-ray bursts, and tidal disruption events.

A strong evidence for the supermassive black hole comes from the measurements of the orbits of stars in our Galactic center. These stars are having Keplerian motion around a gravitational center and we have calculated the mass of the center, which is 4 million solar masses. The first detection of gravitational wave is also related to black holes. It comes from the merger of two stellar-mass black holes that occurred about 1.3 billion years ago.

However, people have never been able to obtain the image of black holes. This is mainly due to the deficiency of angular resolution of telescopes. For example, the black hole in M87 is the second largest black hole in the sky. Its diameter is several billion kilometers, but it is located 55 million light-year away from the earth. Therefore, it is very difficult to resolve it.

The resolution of a telescope depends on its diameter. Thanks to the invention of VLBI (very-long-baseline interferometry) technology, we can now achieve very high angular resolution. By combining 8 radio telescopes located at different places in the world, the EHT works like a huge but virtual telescope with its diameter as large as the diameter of the earth and we finally obtained the first image of the black hole. The EHT collaboration involves more than 200 scientists from various countries and regions in the world.

By comparing the image obtained by the EHT and that obtained by general relativistic magnetohydrodynamical numerical simulation, we can check the general relativity. In fact, they are consistent with each other within error bars, which proves the general relativity.

In the image of the M87 black hole obtained by the EHT, the black hole is located within the central shadow with a diameter more than 2 times larger than that of the black hole. The discrepancy is caused by the general relativity effect. That is, photons emitted even outside of the black hole horizon but within a so-called photon radius have a high probability of being swallowed by the black hole and cannot escape. The radiation of the bright ring in the image comes from the accretion flow. The southern part of the ring is brighter than the northern part because the former is Doppler beamed. Specifically, the spinning of the black hole results in some radiation-emitting gas moving toward us, which makes its radiation looks much stronger. Therefore, the asymmetry of the ring reflects the spin of the black hole.

black hole, very-long-baseline interferometry, accretion disk, M87, general relativity, magnetohydrodynamics

doi: 10.1360/TB-2019-0015