全氟/多氟烷基化合物在全球海洋水体中的污染演变趋势研究进展

向前, 单国强, 邬畏, 祝凌燕*

南开大学环境科学与工程学院, 环境污染过程与基准教育部重点实验室, 天津城市生态环境修复与污染防治重点实验室, 天津 300350

* 联系人, E-mail: zhuly@nankai.edu.cn

2019-01-09 收稿, 2019-02-23 修回, 2019-02-25 接受, 2019-03-07 网络版发表

国家自然科学基金(21737003, 21577067, 21677081)和高等学校创新引智计划(T2017002)资助

摘要 全氟/多氟烷基化合物(PFASs)的环境污染及危害愈来愈受到全球关注。目前, 部分传统PFASs的生产使用受到限制或管控, 一些新型PFASs替代品不断进入市场, 使得PFASs的环境污染状况变得更为复杂。PFASs不仅在人口密集地区的陆地环境中高频检出, 还在各大海洋甚至人迹罕见的两极地区普遍检出。海洋已经成为PFASs污染最重要的“汇”之一, 并对全球生态环境以及两极地区产生重要的影响。关于海洋中PFASs污染的报道也日趋增多, 本文旨在对近年来海洋PFASs污染的研究数据进行剖析, 以期阐明PFASs在全球洋流尺度上的污染时空分布情况, 为PFASs的环境风险评估和环境政策的制定提供科学依据。

关键词 全氟/多氟烷基化合物, 大洋, 表层海水, 深海海水, 洋流

全氟/多氟烷基化合物(per- and poly-fluoroalkyl substances, PFASs)是一类脂肪烃碳链骨架上部分或全部氢原子被氟原子取代而形成的人工合成含氟有机物^[1]。因其优良的化学稳定性、热稳定性、疏水疏油性和高表面活性等特性, PFASs被广泛应用于电镀、消防、涂料、造纸、纺织、食品包装等行业^[2]。伴随其全球规模的生产和使用, 在过去十余年间, PFASs造成的环境污染和生态健康风险成为日益关注的全球性环境问题之一^[3]。其中, 以全氟辛基羧酸(perfluorooctanoic acid, PFOA)、全氟辛基磺酸(perfluorooctane sulfonic acid, PFOS)为代表的全氟烷基酸(perfluoroalkyl acids, PFAAs)是环境中检出频率最高、污染较为突出的PFASs^[4,5]。现有的毒理学及流行病学研究表明, PFAAs具有生物毒性及不良人体健康效应(如免疫毒性^[6,7]、致畸性^[6]、内分泌干扰性^[8,9]等)。因此, 多国及多个国际组织对于PFAAs的生产

使用做出明确或建议性的限制或禁止(<https://www.federalregister.gov/documents/2013/10/22/2013-24651/perfluoroalkyl-sulfonates-and-long-chain-perfluoroalkyl-carboxylate-chemical-substances-final>, <http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/synthesis-paper-on-per-and-polyfluorinated-chemicals.htm>)。2009年, PFOS及其盐类作为限制性化学品被列入斯德哥尔摩公约附件B(<http://www.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP.4-SC-4-17.English.pdf>); 2015年, PFOA及其盐类也被提议纳入斯德哥尔摩公约, 并正在接受进一步的风险评估(<http://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POP-RC11/POPRC11Followup/tabid/4723/Default.aspx>)。

纵观目前PFASs的全球环境污染研究, 其污染状况呈现以下变化趋势: (1) PFASs在环境介质中的污染以陆源环境介质为主(包括土壤、江河湖水及其底

引用格式: 向前, 单国强, 邬畏, 等. 全氟/多氟烷基化合物在全球海洋水体中的污染演变趋势研究进展. 科学通报, 2019, 64: 911–922

Xiang Q, Shan G Q, Wu W, et al. The distribution of per- and poly-fluoroalkyl substances in the global marine water (in Chinese). Chin Sci Bull, 2019, 64: 911–922, doi: 10.1360/N972019-00033

泥、生物体等), 逐渐向南北极等偏远区域拓展^[10]. 海洋是陆源污染最重要的“汇”之一^[11], 在PFASs从人类活动密集区域向极地地区传输的过程中扮演了举足轻重的角色^[12]. 因此, 海洋中PFASs的污染状况受到越来越多的关注, 其污染范围逐步由近海向远洋发展^[13]. 另外, PFASs的生物累积效应及其涉及的海产品食品安全问题^[14-16], 也促使研究者重视大洋的PFAS环境风险. (2) 进入研究视野的PFASs种类逐渐增多. 因其环境持久性和产地转移等缘故, 较早关注的PFAAs包括PFCAs(C_{4-14})和PFSAAs($C_{4,6,8,10}$), 呈现出新的时间和空间分布规律^[4,17,18]. 由于对以PFOS, PFOA为代表的中长碳链PFAAs($C_{n \geq 7}$)的管控, 一些氟化工业巨头开始使用短碳链PFAAs作为替代, 且 C_4 , C_6 PFAAs在环境介质中残留水平已经超过PFOS和PFOA成为主要的全氟污染物, 从而引起研究者的关注^[17]. (3) 在环境中能转化为PFAAs的前体物质(PFAA precursors)包括氟代烷基磺酰氟类(perfluoroalkyl sulfonyl fluorides, PASFs)、氟调聚物(fluorotelomers, FTs)、全氟磷酸类(perfluoroalkyl phosphonic acids, PFPAs)、全氟次磷酸类(perfluoroalkyl phosphinic acids, PFPiAs)和多氟代磷酸酯(polyfluoroalkyl phosphate esters, PAPs)等也逐步引起研究者的关注^[19,20].

综上所述, PFASs在全球生产和消费的庞大需求及其环境持久性和长距离传输等特性, 使其在自然环境中尤其是海洋水体中广泛存在. 目前研究人员针对PFASs在全球海洋水体的分布特征已开展了大量研究, 但这些研究还存在一定的地域局限性, 缺乏对海洋生态系统中PFASs系统的认识, 亟需回答以下问题: (1) 海洋中PFASs污染在空间和时间上演变有何规律性? (2) 陆源污染对海洋中PFASs污染有何贡献? (3) 海洋在PFASs全球传输过程中扮演了什么角色? 针对以上问题, 本文对近年来的研究数据进行了梳理和总结, 以期阐明PFASs在全球尺度上的分布特征, 为PFASs的环境风险评估和环境政策制定提供科学依据.

1 PFASs在全球大洋及两极地区海水环境中的时空分布特征

1.1 PFASs在大西洋的时空演变特征

1.1.1 污染种类及水平

2007年之前的监测数据显示, 北大西洋海域和

大西洋赤道附近海域的表层海水中以传统的PFOA, PFOS为主, 浓度分别为 $10^2 \sim 10^3$ 和 $10^1 \sim 10^2$ pg/L, 全氟壬基羧酸(perfluorononanoic acid, PFNA/ C_9 PFCA)、全氟己基磺酸(perfluorohexane sulfonic acid, PFHxS/ C_6 PFSA)和全氟辛基磺胺(perfluorooctane sulfonamide, FOSA)等其他PFASs仅少量检出, 浓度介于 $10^0 \sim 10^1$ pg/L^[11,21]. 这一时期针对南大西洋表层海水中PFASs分布特征的研究较少, 仅2004年在安哥拉(Angola)西部离岸点位($12^\circ 25'S$ $12^\circ 37'E$)发现了低浓度的PFOA (<100 pg/L)^[11]. 2007~2011年, 大西洋绝大部分海域表层海水中PFOA的浓度有所下降, 但仍达到 $10^1 \sim 10^2$ pg/L水平; PFOS浓度一直稳定在 $10^1 \sim 10^2$ pg/L水平. 同时检出其他种类PFASs, 包括短碳链PFASs(全氟丁基羧酸(perfluorobutanoic acid, PFBA/ C_4 PFCA)、全氟戊基羧酸(perfluoropentanoic acid, PFPeA/ C_5 PFCA)、全氟己基羧酸(perfluorohexanoic acid, PFHxA/ C_6 PFCA)、全氟庚基羧酸(perfluoroheptanoic acid, PFHpA/ C_7 PFCA)、全氟丁基磺酸(perfluorobutane sulfonic acid, PFBS/ C_4 PFSA)、全氟戊基磺酸(perfluoropentane sulfonic acid, PFPeS/ C_5 PFSA)、PFHxS、全氟庚基磺酸(perfluoroheptane sulfonic acid, PFHpS/ C_7 PFSA))和长碳链PFCAs(PFNA、全氟癸基羧酸(perfluorodecanoic acid, PFDA/ C_{10} PFCA)、全氟十一酸(perfluoroundecanoic acid, PFUnDA/ C_{11} PFCA)、全氟十二酸(perfluorododecanoic acid, PFDoDA/ C_{12} PFCA)、全氟十三酸(perfluorotridecanoic acid, PFTriDA/ C_{13} PFCA)、全氟十四酸(perfluorotetradecanoic acid, PFTeDA/ C_{14} PFCA))等, 浓度均在 $10^0 \sim 10^2$ pg/L^[22-25]. 值得关注的是, 2009年之后在西欧近海海域及河流入海口附近海域检测到新型PFASs, 如中性PFASs(全氟辛基磺胺醇(perfluorooctane sulfonamidoethanol, FOSE)、全氟丁基磺胺(perfluorobutane sulfonamide, FBSA)、全氟丁基磺胺醇(perfluorobutane sulfonamidoethanol, FBSE)、氟调聚醇(fluorotelomer alcohol, FTOH)、氟调聚丙烯酸酯(fluorotelomer acrylate, FTAC)), 浓度水平在 $10^{-1} \sim 10^3$ pg/L范围内^[26,27], 全氟聚醚类如HFPO-DA浓度水平在 $10^0 \sim 10^1$ ng/L及以下水平^[28,29]. 这可能是由于2000年以来3M, DuPont等氟化工业巨头逐渐停止传统长链PFASs(PFOS, PFOA等)的生产^[30,31], 而又由于PFASs在个别领域仍然具有不可替代性, PFOS, PFOA及其相关原料在某些行业依旧具有使用豁免权(<https://www>.

federalregister.gov/documents/2013/10/22/2013-24651/perfluoroalkyl-sulfonates-and-long-chain-perfluoroalkyl-carboxylate-chemical-substances-final, <http://www.ec.gc.ca/toxiques-toxics/Default.asp?lang=En&n=96A225B1-1#top>), 需要更长时间来评估限令实施的效果。同时新型PFASs在不断推广, 使得这些区域的PFASs污染呈现出传统长碳链PFASs和新型PFASs替代品并存的状态^[32-34]。目前大西洋远洋海域尚未有上述新型PFASs替代品的报道, 但因其稳定的理化性质, 随时间推移, 这些新型PFASs可能会随洋流迁移至大西洋远洋海域^[34]。

1.1.2 海域分布特征

在大西洋由北往南的表层海水中, PFASs浓度分布呈现一定的规律性: (1) 南半球海域的PFAAs浓度总体低于北半球海域。北大西洋表层海水中的PFOA和PFOS浓度分别为 $10^1 \sim 10^3$ pg/L(美国罗德岛(Rhode Island)近海岸可达 $10^0 \sim 10^1$ ng/L)和 $2 \times 10^1 \sim 2 \times 10^2$ pg/L, 而南大西洋PFOA、PFOS浓度均为 $10^0 \sim 10^2$ pg/L(个别河口点位可达 $1 \times 10^2 \sim 2 \times 10^2$ pg/L)^[22,23,25]; (2) PFOA和PFOS二者的浓度比值 C_{PFOA}/C_{PFOS} 由北向南逐渐减小。2007年以前的研究发现, 北大西洋和大西洋赤道表层海水中 C_{PFOA}/C_{PFOS} 范围分别为4~39和1~12^[21]。2009年之后的研究中该比值的海域分布特点更加明显, 在北大西洋 $C_{PFOA}/C_{PFOS} > 1$, 赤道附近 $C_{PFOA}/C_{PFOS} = 1$, 南大西洋 $C_{PFOA}/C_{PFOS} < 1$ ^[22,23]。上述浓度的南北差异及 C_{PFOA}/C_{PFOS} 比值变化反映了PFASs地域生产使用的差别: (1) 西欧、北美在大西洋沿海地区工业发达程度高于南美、西非的大西洋沿海地区, 这些地区排放的PFASs经入海河流向大西洋输入, 致使北大西洋浓度高于南大西洋^[35,36]; (2) 自2002年开始, 北美、欧洲地区的氟化工业由传统的电氟化法(electrochemical fluorination, ECF)转向调聚(telomerization)合成法。同时期, 南美洲的国家开始逐渐增加ECF相关产品的生产和使用, 造成了南北大西洋表层海水中PFOA与PFOS的浓度差异^[23,37]; (3) 大西洋表层洋流对来自陆源排放的PFASs的输送和混合, 致使大西洋开放性海域的PFASs分布与近海岸海域PFASs分布紧密相关, 如南大西洋环流($C_{PFOA}/C_{PFOS} < 1$)与来自北半球的加那利寒流(Canary Current, $C_{PFOA}/C_{PFOS} > 1$)在赤道附近交汇, 促使大西洋赤道附近表层海水中 C_{PFOA}/C_{PFOS} 趋近1^[23]。

1.1.3 近海和远洋的区域浓度差异对比

离岸愈近的海域, PFASs浓度呈现上升趋势, 反

之, 浓度则呈现下降趋势。大西洋近北美、南美、西欧和西非的海域表层海水中, 典型的PFASs(如PFOA, PFOS等)浓度比大西洋中部海域高出1~2个数量级。Benskin等人^[23]发现在美国东部近岸海域(距Narragansett 330 km以内海域), PFOA和PFOS等浓度较更远海域高1个数量级; 在南美洲东北部亚马孙河(the Amazon)入海口(河口外675~965 km范围内, https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_River), FOSA浓度较航线上其他点位高1个数量级; 在南美洲东南部拉普拉塔河(Rio de la Plata)入海口(河口外65~181 km以内范围, https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_de_la_Plata), 典型PFASs(如PFBS, PFHxS, PFOS和PFHxA, PFOA, PFDA, PFUnDA, PFDODA, PFTrIDA和PFTeDA等)的浓度均比航线上其他远洋点位高1个数量级。Ahrens课题组^[24,25]和Zhao等人^[22]在大西洋东部海域也发现了相似的规律, PFASs浓度随着与工业污染较为严重的西欧距离的增加而呈现明显下降趋势, 而入海河流是大西洋海域PFASs的主要来源^[26,35,36,38-42]。一些新型PFASs替代物(如HFPO-DA, 全氟乙基环己烷磺酸(perfluoroethylcyclohexane sulfonate, PFECHS)、全氟醚基羧酸(perfluoroalkyl ether carboxylic acids, PFECAs)、全氟醚基磺酸(perfluoroalkyl ether sulfonic acids, PFESAs)等)多出现在大西洋周边地区的入海河湖水体和生物中或是近岸海水中, 但在远洋海域尚未发现^[28,29,33,34,43,44]。

1.2 PFASs在太平洋和印度洋海水环境中的时空分布特征

1.2.1 污染种类及浓度水平

虽然在太平洋近海海域(如东南亚)的调查较为密集, 但在其远洋海域的监测比大西洋要少。太平洋和印度洋远洋表层海水中PFASs的变化趋势与大西洋相比, 污染物种类相似, 但污染水平稍低一些^[21]。

与较早的研究相比^[21], 2011年的调查显示^[45]太平洋远洋海域表层海水中PFASs种类增多(主要包括 $C_4 \sim C_{10}$ PFCAs, PFHpS, *N*-甲基全氟辛基磺胺(*N*-methyl perfluorooctane sulfonamide, *N*-MeFOSA)等), 其中PFOS浓度(41.1~232 pg/L)增加近1个数量级, PFOA浓度仍保持在 $2 \times 10^1 \sim 1 \times 10^2$ pg/L水平。近年来, 西北太平洋近岸、近海海域发现了除传统PFAAs和中性FOSA等以外的一些新型PFASs替代物, 如HFPO-DA、6:2氯代多氟醚磺酸(CI-6:2 PFESA/F-53B)和8:2

氯代多氟醚磺酸(CI-8:2 PFESA)、短链PFASs等,浓度在 $10^0\sim 10^1$ ng/L及其以下水平^[28,29,46,47]. 这样的变化与亚洲国家氟化工业生产转型有很大关系. 自21世纪初,一些北美、欧洲等地区的氟化工业巨头纷纷将生产线迁往中国、印度等亚洲地区,导致亚洲地区PFASs的环境释放量增加^[4,48](<http://www.ihs.com/products/chemical/planning/ceh/fluoropolymers.aspx?pu=1&rd=chemihs>). 而早在20世纪70~80年代中国已有CI-6:2 PFESA及其同类型产品(如PFOS等)的研发并投产,由于它们优良的铬雾抑制效果及其他特性而广泛应用于工业生产,但其环境效应当时并未引起环保人士的关注^[49]. 而随着众多国家开始限制PFOS的生产和使用,与PFOS结构相似的CI-6:2 PFESA成为其替代品,产量进一步增加,而环境释放量也随之增加^[50].

印度洋的数据更少,仅有的数据显示,2005~2006年印度洋远洋表层海水中,传统的PFOS和PFOA浓度水平均在 $10^0\sim 10^2$ pg/L^[11,51]. 2011年印度洋海域表层海水中PFASs种类增加,包括FOSA, N-MeFOSA. 而传统PFOA, PFOS在该海域表层海水中的浓度较早期均有升高趋势(分别为 $2\times 10^1\sim 1\times 10^2$ 和 $10^1\sim 10^3$ pg/L)^[45].

1.2.2 海域分布特征

太平洋的数据显示, PFOA, PFOS在太平洋表层海水中的分布呈现出西高东低、北高南低的分布形势. 如2011年PFOA, PFOS浓度水平从西太平洋到东太平洋, 分别从16~94, 52~232 pg/L下降至13~42, 41.1~216 pg/L, 从北太平洋到南太平洋, 分别从13~94, 41.1~232 pg/L下降至17~35.1, 95.6~174 pg/L^[45]. 这主要是由于东亚太平洋沿岸国家和地区(如日本、韩国、中国)活跃的工业生产排放导致; 而北美地区西海岸的产业结构偏向农业等, 西部沿海地区鲜有大型入海河流汇入太平洋, 从而北美西部向太平洋海域贡献的PFASs排放少; 南半球较少的人类活动(包括工业活动等)使得南太平洋表层海水中的PFASs污染也远低于北太平洋.

21世纪初期, 在太平洋大部分海域呈现出 $C_{PFOA}/C_{PFOS}>1$ ^[11,21], 近年来太平洋远洋大部分海域该比值已经下降到1以下^[45]. Chu等人^[52]发现太平洋中部中途岛(Midway Island)的鸟类体内发现较高浓度的长碳链PFASs(如PFUnDA在肝脏中可以达到18.7 ng/g ww(湿重)), 并将其归因于这些PFAAs更高

的亲蛋白能力和太平洋垃圾带(the Great Pacific Garbage Patch, GPGP)带来的塑料垃圾被海鸟误食, 而GPGP受到来自东亚黑潮续流(Kuroshio Extension)影响较为显著^[53]. 这反映了东亚地区氟化工业结构可能发生改变, 即由早期PFOA大量使用, 到斯德哥尔摩公约在欧美地区广泛施行后, PFOS类原料及产品的主产区由欧美地区转移到中国等地区所致.

数据显示, 早期印度洋北部的PFASs污染可能与近海国家入海河流有关, 如2005年斯里兰卡(Sri Lanka)西部入海河流中PFOS, PFOA可达 $2\times 10^1\sim 1\times 10^2$ ng/L水平^[54]. 2005~2006年在印度洋东部和太平洋西部(菲律宾西部、印度尼西亚哥伦打洛省(Gorontalo)北部、南苏拉威西省(South Sulawesi)西南部、澳大利亚西部和西北部)表层海水中发现PFOS在 Σ PFASs中占比有较大差别(38.6%~84.6%), 表明这些海域附近可能存在不同类型的PFASs污染源^[51]. 而上述东南亚两国附近点位PFNA占比较大(21.4%~41.5%), 澳大利亚西部海域未有PFNA检出, 表明东南亚国家存在PFNA的潜在污染源^[51]. 随着纬度南移, 到与南大洋交界海域PFASs浓度均显著减少甚至低于检出限(PFOS: $<5\sim 8.6$ pg/L, PFOA: 6.4~11 pg/L), 表明印度洋东南部与南大洋交界海域不存在PFASs污染源, 且洋流对PFASs的稀释作用强^[51]. 2011年在南印度洋表层海水中发现由西往东(从南非到澳大利亚), PFOS浓度逐渐升高(83.8~511 pg/L), 在大洋洲相邻海域达到峰值, 这可能与澳大利亚的污染排放有关^[45]. 综上所述, 近年来印度洋海域的PFASs污染呈现加重态势.

1.2.3 近海污染

太平洋西北部与东亚相接海域存在严重PFASs污染, 其中以日本和中国近海较为突出. 近年来, 在PFOA浓度保持基本稳定的同时, PFOS浓度明显减少, 而短链PFCAs和PFASs浓度呈上升趋势. 2002年在日本东京湾、大阪湾表层海水中发现较高浓度($10^0\sim 10^3$ ng/L)的PFOS, PFOA, PFHxS, 到2010年PFOS及短链PFHxS, PFBS几乎均低于检测限, PFOA浓度保持稳定, 短链PFHxA浓度水平可达 $2\times 10^2\sim 1\times 10^3$ ng/L^[55~57]. 在中国的珠江口、渤海湾表层海水也发现了类似的规律, 从2003~2016年PFOA浓度水平一般保持在 $10^0\sim 10^2$ ng/L, PFOS浓度由 $1\times 10^1\sim 2\times 10^1$ 下降至 $10^0\sim 10^1$ ng/L及以下水平, 短链PFAAs浓度从鲜有检出上升到 $2\times 10^1\sim 1\times 10^2$ ng/L水平, PFHxS

浓度一直保持在 2×10^1 pg/L~ 2×10^1 ng/L水平^[46,56,58,59]。值得注意的是,2011年在中国东海和南海 $35^\circ 52.80' \sim 06^\circ 59.40' \text{N}$ 范围内,PFOS浓度均低于检测限(<0.07 ng/L)^[60],而PFNA在日本入海河流中的检出浓度较高(最高可达 $2 \times 10^1 \sim 1 \times 10^2$ ng/L),但是在近岸海域却鲜有检出^[47]。研究结果表明^[61],PFOS等传统PFASs被广泛限制使用的背景下,东亚地区氟化工业生产结构可能正在发生转变,即短链PFASs可能成为替代品在这些地区广泛使用。

随着与海岸的距离增加,PFASs浓度逐渐降低。在中国东海到白令海(the Bering Sea)跨30个纬度的海域,离岸距离 <135 km时,PFOA,PFOS浓度分别为777~1022,84~105 pg/L,离岸距离 >135 km的海域PFASs浓度显著减少(其中PFOA,PFOS浓度分别减少85%,56%),离岸距离 >155 km时,PFOA,PFOS浓度水平继续降低并分别稳定在70~80,10~20 pg/L^[62]。在中国南海,离岸距离 <65 km海域,PFOA浓度在 2×10^1 pg/L~ 1×10^1 ng/L水平,其他PFASs浓度在 $2 \times 10^1 \sim 1 \times 10^3$ pg/L水平,离岸距离 >65 km海域,仅有低浓度PFOA($<0.07 \sim 0.13$ ng/L)存在,再无其他PFASs检出^[60]。随离岸距离增加,表层海水中PFASs浓度呈现下降趋势,这可能主要是海水稀释效应导致^[45]。

1.3 PFASs在两极地区海水环境中的时空分布特征

2001年Giesy课题组^[10]首次在南北极动物组织中发现较高浓度的PFOS,其中美国阿拉斯加州(Alaska)北极熊肝脏中PFOS平均浓度可达350 ng/g ww,南极洲罗斯海特拉诺瓦湾(Terra Nova Bay)威德尔海豹(Weddell seal)肝脏中PFOS浓度 <35 ng/g ww。早期对于北冰洋海域的PFASs研究多关注其在雪、大气等环境介质中的分布特征^[63]。2007年之后的报道开始关注北冰洋海水中PFAAs的分布特征,这一时期的报道发现北冰洋海域表层海水中的PFAAs污染以传统的PFAAs为主,绝大多数PFAAs浓度持续保持在 $2 \times 10^1 \sim 1 \times 10^2$ pg/L及以下水平,水溶性较高的较短碳链长度PFCAs普遍浓度高于PFSAs^[22,64],在某些近岸海域(如格陵兰岛(Greenland)附近海域等),短链PFCAs和FOSA浓度可达 $2 \times 10^2 \sim 1 \times 10^3$ pg/L水平^[65]。在2007年之前,南大洋海域(the Southern Ocean,即 50°S 以南的印度洋、大西洋和 $55^\circ \sim 62^\circ \text{S}$ 之间的太平洋组成的海域)表层海水中PFASs种类较少(仅有PFOA,

PFOS, PFDODA检出),且浓度普遍偏低($1 \times 10^1 \sim 2 \times 10^1$ pg/L及以下水平)^[51]。直到2011年,南大洋海域的PFASs污染种类和浓度较之前并未发生明显变化^[22]。

在两极地区,关于新型PFASs(如CI-6:2 PFESA, PFECHS, FTSs等)的报道多见于动物体内和北极地区的大气、雪等环境介质中。在动物体内,CI-6:2 PFESA, PFECHS浓度水平可达 $10^0 \sim 10^1$ ng/g(脂重)水平^[66,67];在北极地区大气中,FTACs, *N*-甲基全氟丁基磺胺(*N*-methyl perfluorobutane sulfonamide, *N*-MeFBSA)、*N*-甲基全氟丁基磺胺醇(*N*-methyl perfluorobutane sulfonamidoethanol, *N*-MeFBSE)的浓度可达 $1 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^0$ pg/L^[68];在雪中,FTACs, *N*-MeFBSA, *N*-MeFBSE浓度水平可达 $10^0 \sim 10^2$ pg/L^[68]。但在两极海水等环境介质中尚未有报道。

在北冰洋海域,表层海水中传统PFASs浓度均呈现出西低东高的趋势^[23,69]。以西半球海域为例,PFOA相比PFOS浓度更高,且 $C_{\text{PFOA}}/C_{\text{PFOS}}$ 比值与经度存在显著相关性(如加拿大北部北冰洋海域从兰卡斯特海峡(Lancaster Sound)向西到加拿大北极群岛(Canadian Arctic Archipelago)以西海域范围内)^[23]。这可能是来自低纬度大西洋海域的海水(其中 $C_{\text{PFOA}}/C_{\text{PFOS}} > 1$)随表层洋流向高纬度北冰洋海域传输的结果,也可能是由于北美和西欧大气中占主要比重的FTOH到达该海域上空后发生降解,然后沉降至表层海水,形成PFOA的大气来源^[65,68]。而加拿大北极群岛西部海域较高的海冰覆盖率,阻挡了PFASs通过大气向西传输,对 $C_{\text{PFOA}}/C_{\text{PFOS}}$ 比值随海域西移而降低有一定贡献^[23]。

在南大洋海域^[22,24,70],南极半岛(the Antarctic Peninsula)近岸海域表层海水中存在高浓度(2×10^2 pg/L~ 1×10^2 ng/L)的PFOA, PFHxA,可能是受当地人类科考活动的影响。在大西洋以南的南大洋海域仅发现低浓度($2 \times 10^1 \sim 1 \times 10^2$ pg/L及以下)的PFOS和PFOA,可能是由于南大洋北部边缘存在南极辐合带(Antarctic Convergence)和贯穿南大洋大部分海域的南极绕极流(Antarctic Circumpolar Current)的屏蔽作用所致,也有可能是通过大气传输而来^[71,72]。

1.4 PFASs在深层海水中的分布特征

表层海水中PFASs不能全面反映其在海洋环境中的归趋^[11],随海水深度的变化,PFASs的分布呈现一定的特点。自2001年以来,已在大西洋(探测水深

范围: 15~5500 m)^[11,25]、太平洋(0~5400 m)^[11,55]、北冰洋(1~4355 m)^[69]、南大洋(0~3730 m)^[11]等海域开展了关于PFASs随海洋垂直方向发生迁移的研究。

全球各大洋深层海水中的PFASs主要由PFOA, PFOS和其他较短碳链的PFCAs(C₆, C₇)和PFASs(C₄, C₆)组成, 少数海域有FOSA分布. 在垂直方向上, 随海水深度增加, PFASs浓度递减, 达到一定深度后(太平洋西北部约为1000~1500 m^[55], 大西洋中西部约为800 m^[11], 北冰洋海域约为150 m^[69]), PFASs浓度低于检出限. PFASs通过沉降流^[25]和垂直涡流扩散^[73]等, 或以海水中悬浮颗粒物、生物排泄物等为载体, 沿纵向向深海传输, 导致深海海水的污染^[74]. Yamashita课题组^[11]在假设汇入北大西洋拉布拉多海中年均水量恒定的前提下, 估算出该海域表层海水中的PFOA和PFOS向深海的年均沉积量分别可达1460和620 kg. 随深度加深, 浓度变低, 是深层海水的稀释作用造成: 各大洋温跃层(thermocline)或盐跃层(halocline)的下界往往成为阻碍PFASs随下向水流向

更深海域传输的屏障, 而不同大洋温/盐跃层厚度的差别, 造成PFASs在不同大洋深海传输极限深度的差异^[11,69]. 有趣的是, 在北大西洋拉布拉多海发现PFASs浓度随海水深度加深出现先降低后升高的形势, 研究者解释为是因深海复杂的地形造成的异向洋流带来的影响^[11].

2 海洋参与的PFASs全球传输机制

目前研究认为PFASs在全球大空间尺度上的迁移有4种途径(图1): (1) 可挥发性、中性前体物质(全氟烷基磺胺类(perfluoroalkyl sulfonamides, FASAs)、FTOHs等)通过远距离大气传输(long-range atmospheric transport, LRAT), 到达海洋、极地等偏远地区, 再降解形成PFASs^[12,75,76]; (2) 可电离的PFASs溶解在海水中, 并通过洋流的大范围流动而向高纬度偏远地区(包括北冰洋、南大洋等)迁移^[23,77]; (3) 溶解于海水中的PFASs盐以海洋气溶胶为载体向高纬度偏远地区传输^[78,79]; (4) 在生物体内富集的PFASs随食物

图1 (网络版彩色)PFASs的几种主要长距离传输机制

Figure 1 (Color online) The main long range transport of PFASs

链或生物迁徙向高纬度偏远地区传输^[12,72,80]。

洋流和海洋气溶胶传输是全氟辛酸盐(perfluorooctanoate, PFO)从低纬度地区向高纬度地区传输的主要途径。Armitage等人^[77]通过GloboPOP模型模拟,显示洋流的长距离传输方式对北极输送PFO量的贡献大于FTOH经LRAT后降解的方式。Gomis等人^[81]通过OECD Tool模型提出,亲水性的PFASs替代物(包括ADONA, HFPO-DA, 全氟三醚羧酸(perfluoro triether carboxylic acid, PFTECA), EEA, 6:2氟调羧酸(6:2 fluorotelomer carboxylic acid, 6:2 FTCA)和F-53B等)通过洋流作用而不是大气传输的方式向偏远地区传输。Ti等人^[82]同样通过模型(GloboPOP model)发现F-53B能通过洋流传输的方式由其主产区/主消费区如中国向北极地区转移,且与PFOS有类似的传输特征,它们的特征传输距离(characteristic travel distance)都约为1740 km,由此估算F-53B通过洋流从中国传输到北极的时间为1年多。因此,海水及海底沉积物作为PFASs全球自然环境中最大的“汇”,可能在更长时间跨度下成为全球PFASs循环的重要环节,而这又进一步证明了洋流传输作用是高纬度地区PFASs的主要来源途径。据估算,北半球大洋中PFO通过洋流传输至北极的量约2~12 t/a,远大于来自北半球的FTOH通过LRAT-降解-沉降方式向北极传输PFCAs的量约0.1~1 t/a^[11,12]。此外, Pickard等人^[83]通过分析北极冰芯中的PFASs发现,大气中的挥发性PFASs前体物质通过远距离大气传输-降解-沉降的过程为北极冰盖贡献了绝大多数的PFAAs,贡献量远远大于海洋气溶胶的贡献,以气溶胶作为载体向高纬度偏远地区输送PFASs的方式并非北极地区PFASs的主要来源。另外,通过各大洋深海海水柱采样分析,可以看出全球海水的温跃层循环是影响PFASs向深海纵向迁移的关键因素^[11,69]。

全球气候变暖是影响大气、海洋的PFASs传输机制的一个重要因素^[84,85]。随着气候变暖,吸附在极地海冰中的PFASs可能随着冰融化效应重新释放到海水中,形成PFASs新的来源^[22]。20世纪已有学者提出持久性有机污染物(POPs)可能通过食物链向南极大陆传输^[86],随着研究的深入, Bengtson Nash等人^[72]

发现南极迁徙物种如南极半岛的贼鸥(South Polar skua)、白额鹱(white-chinned petrel)等在南极寒季时迁徙到南美洲南部等更温暖处。这些迁徙鸟类在南极以外区域暴露和富集PFASs,回迁后通过产蛋、生物尸体、粪便使其体内的PFASs残留在南极地区。另外,更高营养级的南象海豹(southern elephant seal)觅食范围可由南极近海向北覆盖到几千千米以外的极锋带(Polar Front Zone),即南极辐合带的北缘,它们也是一种重要的生物载体将PFASs向南极传输^[72,80]。全球气候变暖可能打破南大洋绕极环流、极锋带等对南极地区的隔离,从而促进PFASs以生物迁移方式向南极传输,甚至存在早已暴露于PFASs污染的中低纬度栖息生物向南扩展觅食活动范围,从而向南极地区输入PFASs污染^[87]。但目前这种通过生物迁徙方式向南极地区传输PFASs的量相比洋流传输和LRAT要少^[80]。

3 总结和展望

在对已有研究成果进行综述的基础上,对PFASs在全球海洋水体中的分布研究提出如下思考和展望:(1)对PFASs在不同空间尺度和时间跨度上的监测调查亟待加强。PFASs稳定的理化性质和潜在的生态毒性,使其对环境的危害风险可能长期存在。海洋作为PFASs最大的“汇”,因其覆盖了地球绝大部分的表面积,在PFASs的全球迁移归趋中起到重要作用。而一些重点海域目前还存在研究空白,如:印度洋和北冰洋东半球海域周边新兴的氟工业主产区(如印度、俄罗斯等)是PFASs的潜在污染源。南大洋作为天然屏障,调控PFASs向南极地区传输,深海具有潜在且巨大的汇集PFASs的能力,故亟需加强在这些海域中PFASs的持续性监测,以期完善对PFASs全球传输机制的理解。(2)含氟替代品对海洋生态环境的潜在影响不容忽视。如聚醚类、环状PFASs等具有较高生物富集能力和难降解特性,虽然目前只在湖泊、河流和其入海口的海水或者动物体内、沉积物中有发现,但从长远来看,这些物质仍存在向远洋海域迁移的风险,故需要持续关注这些含氟替代品在海洋环境的动态变化。

参考文献

- 1 Buck R C, Franklin J, Berger U, et al. Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in the environment: Terminology, classification, and

- origins. *Integr Environ Assess Manage*, 2011, 7: 513–541
- 2 Buck R C, Murphy P M, Pabon M. Chemistry, properties, and uses of commercial fluorinated surfactants. In: Knepper T P, Lange F T, eds. *Polyfluorinated Chemicals and Transformation Products*. Heidelberg: Springer, 2012. 1–24
 - 3 Wang Y W, Cai Y Q, Jiang G B. Research processes of persistent organic pollutants (POPs) newly listed and candidate POPs in Stockholm Convention (in Chinese). *Sci Sin Chim*, 2010, 40: 99–123 [王亚韡, 蔡亚岐, 江桂斌. 斯德哥尔摩公约新增持久性有机污染物的一些研究进展. *中国科学: 化学*, 2010, 40: 99–123]
 - 4 Wang Z, Cousins I T, Scheringer M, et al. Global emission inventories for C₄–C₁₄ perfluoroalkyl carboxylic acid (PFCA) homologues from 1951 to 2030, Part I: Production and emissions from quantifiable sources. *Environ Int*, 2014, 70: 62–75
 - 5 Guo R, Cai Y Q, Jiang G B, et al. Current research of perfluorooctane sulfonate (in Chinese). *Prog Chem*, 2006, 18: 808–813 [郭睿, 蔡亚岐, 江桂斌, 等. 全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)的污染现状与研究趋势. *化学进展*, 2006, 18: 808–813]
 - 6 Lau C, Anitole K, Hodes C, et al. Perfluoroalkyl acids: A review of monitoring and toxicological findings. *Toxicol Sci*, 2007, 99: 366–394
 - 7 DeWitt J C, Blossom S J, Schaidler L A. Exposure to per-fluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances leads to immunotoxicity: Epidemiological and toxicological evidence. *J Exposure Sci Environ Epidemiol*, 2019, 29: 148–156
 - 8 Shi Z, Zhang H, Ding L, et al. The effect of perfluorododecanonic acid on endocrine status, sex hormones and expression of steroidogenic genes in pubertal female rats. *Reprod Toxicol*, 2009, 27: 352–359
 - 9 Pedersen K E, Letcher R J, Sonne C, et al. Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs): New endocrine disruptors in polar bears (*Ursus maritimus*)? *Environ Int*, 2016, 96: 180–189
 - 10 Giesy J P, Kannan K. Global distribution of perfluorooctane sulfonate in wildlife. *Environ Sci Technol*, 2001, 35: 1339–1342
 - 11 Yamashita N, Taniyasu S, Petrick G, et al. Perfluorinated acids as novel chemical tracers of global circulation of ocean waters. *Chemosphere*, 2008, 70: 1247–1255
 - 12 Prevedouros K, Cousins I T, Buck R C, et al. Sources, fate and transport of perfluorocarboxylates. *Environ Sci Technol*, 2006, 40: 32–44
 - 13 Ju X D. Progress in research on marine environmental pollution of perfluorinated chemicals (in Chinese). *Mar Sci*, 2010, 34: 93–99 [鞠晓东. 海洋环境中全氟有机污染物研究的若干进展. *海洋科学*, 2010, 34: 93–99]
 - 14 Liu Y, Ruan T, Lin Y, et al. Chlorinated polyfluoroalkyl ether sulfonic acids in marine organisms from Bohai Sea, China: Occurrence, temporal variations, and trophic transfer behavior. *Environ Sci Technol*, 2017, 51: 4407–4414
 - 15 Zhang H, Lu Y, Luo B, et al. Proteomic analysis of mouse testis reveals perfluorooctanoic acid-induced reproductive dysfunction via direct disturbance of testicular steroidogenic machinery. *J Proteome Res*, 2014, 13: 3370–3385
 - 16 Liu Y, Richardson E S, Derocher A E, et al. Hundreds of unrecognized halogenated contaminants discovered in polar bear serum. *Angew Chem Int Ed*, 2018, 57: 16401–16406
 - 17 Wang Z, DeWitt J C, Higgins C P, et al. A never-ending story of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs)? *Environ Sci Technol*, 2017, 51: 2508–2518
 - 18 Wang Z, Cousins I T, Scheringer M, et al. Global emission inventories for C₄–C₁₄ perfluoroalkyl carboxylic acid (PFCA) homologues from 1951 to 2030, Part II: The remaining pieces of the puzzle. *Environ Int*, 2014, 69: 166–176
 - 19 Wang Z, Cousins I T, Berger U, et al. Comparative assessment of the environmental hazards of and exposure to perfluoroalkyl phosphonic and phosphinic acids (PFPA and PFPiAs): Current knowledge, gaps, challenges and research needs. *Environ Int*, 2016, 89–90: 235–247
 - 20 Wang Z, Cousins I T, Scheringer M, et al. Fluorinated alternatives to long-chain perfluoroalkyl carboxylic acids (PFCAs), perfluoroalkane sulfonic acids (PFSA) and their potential precursors. *Environ Int*, 2013, 60: 242–248
 - 21 Yamashita N, Kannan K, Taniyasu S, et al. A global survey of perfluorinated acids in oceans. *Mar Pollut Bull*, 2005, 51: 658–668
 - 22 Zhao Z, Xie Z, Möller A, et al. Distribution and long-range transport of polyfluoroalkyl substances in the Arctic, Atlantic Ocean and Antarctic coast. *Environ Pollut*, 2012, 170: 71–77
 - 23 Benskin J P, Muir D C G, Scott B F, et al. Perfluoroalkyl acids in the Atlantic and Canadian Arctic Oceans. *Environ Sci Technol*, 2012, 46: 5815–5823
 - 24 Ahrens L, Xie Z, Ebinghaus R. Distribution of perfluoroalkyl compounds in seawater from Northern Europe, Atlantic Ocean, and Southern Ocean. *Chemosphere*, 2010, 78: 1011–1016
 - 25 Ahrens L, Barber J L, Xie Z, et al. Longitudinal and latitudinal distribution of perfluoroalkyl compounds in the surface water of the Atlantic Ocean. *Environ Sci Technol*, 2009, 43: 3122–3127
 - 26 Zhao Z, Xie Z, Tang J, et al. Seasonal variations and spatial distributions of perfluoroalkyl substances in the rivers Elbe and lower Weser and the North Sea. *Chemosphere*, 2015, 129: 118–125
 - 27 Xie Z, Zhao Z, Möller A, et al. Neutral poly- and perfluoroalkyl substances in air and seawater of the North Sea. *Environ Sci Pollut Res*, 2013, 20: 7988–8000

- 28 Heydebreck F, Tang J, Xie Z, et al. Correction to alternative and legacy perfluoroalkyl substances: Differences between European and Chinese river/estuary systems. *Environ Sci Technol*, 2015, 49: 14742–14743
- 29 Heydebreck F, Tang J, Xie Z, et al. Alternative and legacy perfluoroalkyl substances: Differences between European and Chinese river/estuary systems. *Environ Sci Technol*, 2015, 49: 8386–8395
- 30 Posner S, Roos S, Poulsen P B, et al. Per and Polyfluorinated Substances in the Nordic Countries. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2013
- 31 Ritter S K. Fluorochemicals go short. *Chem Eng News*, 2010, 88: 12–17
- 32 Lin Y F, Ruan T, Jiang G B. Progress on analytical methods and environmental behavior of emerging per- and polyfluoroalkyl substances (in Chinese). *Chin Sci Bull*, 2017, 62: 2724–2733 [林泳峰, 阮挺, 江桂斌. 新型全氟和多氟烷基化合物的分析、行为与效应研究进展. *科学通报*, 2017, 62: 2724–2733]
- 33 Chu S, Letcher R J, McGoldrick D J, et al. A new fluorinated surfactant contaminant in biota: Perfluorobutane sulfonamide in several fish species. *Environ Sci Technol*, 2016, 50: 669–675
- 34 De Silva A O, Spencer C, Scott B F, et al. Detection of a cyclic perfluorinated acid, perfluoroethylcyclohexane sulfonate, in the Great Lakes of North America. *Environ Sci Technol*, 2011, 45: 8060–8066
- 35 Lohmann R, Belkin I M. Organic pollutants and ocean fronts across the Atlantic Ocean: A review. *Prog Oceanogr*, 2014, 128: 172–184
- 36 Stemmler I, Lammel G. Pathways of PFOA to the Arctic: Variabilities and contributions of oceanic currents and atmospheric transport and chemistry sources. *Atmos Chem Phys*, 2010, 10: 9965–9980
- 37 Benskin J P, Ahrens L, Muir D C G, et al. Manufacturing origin of perfluorooctanoate (PFOA) in Atlantic and Canadian Arctic seawater. *Environ Sci Technol*, 2012, 46: 677–685
- 38 Essumang D K, Eshun A, Hogarh J N, et al. Perfluoroalkyl acids (PFAAs) in the Pra and Kakum River basins and associated tap water in Ghana. *Sci Total Environ*, 2017, 579: 729–735
- 39 Ololade I A. Spatial distribution of perfluorooctane sulfonate (PFOS) in major rivers in southwest Nigeria. *Toxicol Environ Chem*, 2014, 96: 1356–1365
- 40 Mudumbi J B N, Ntwampe S K O, Muganza F M, et al. Perfluorooctanoate and perfluorooctane sulfonate in South African river water. *Water Sci Technol*, 2013, 69: 185–194
- 41 Möller A, Ahrens L, Surm R, et al. Distribution and sources of polyfluoroalkyl substances (PFAS) in the River Rhine watershed. *Environ Pollut*, 2010, 158: 3243–3250
- 42 McLachlan M S, Holmström K E, Reth M, et al. Riverine discharge of perfluorinated carboxylates from the European continent. *Environ Sci Technol*, 2007, 41: 7260–7265
- 43 Strynar M, Dagnino S, McMahan R, et al. Identification of novel perfluoroalkyl ether carboxylic acids (PFECAs) and sulfonic acids (PFESAs) in natural waters using accurate mass time-of-flight mass spectrometry (TOFMS). *Environ Sci Technol*, 2015, 49: 11622–11630
- 44 Houde M, Douville M, Despatie S P, et al. Induction of gene responses in St. Lawrence River northern pike (*Esox lucius*) environmentally exposed to perfluorinated compounds. *Chemosphere*, 2013, 92: 1195–1200
- 45 González-Gaya B, Dachs J, Roscales J L, et al. Perfluoroalkylated substances in the global tropical and subtropical surface oceans. *Environ Sci Technol*, 2014, 48: 13076–13084
- 46 Chen H, Han J, Zhang C, et al. Occurrence and seasonal variations of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) including fluorinated alternatives in rivers, drain outlets and the receiving Bohai Sea of China. *Environ Pollut*, 2017, 231: 1223–1231
- 47 Takemine S, Matsumura C, Yamamoto K, et al. Discharge of perfluorinated compounds from rivers and their influence on the coastal seas of Hyogo prefecture, Japan. *Environ Pollut*, 2014, 184: 397–404
- 48 Li L, Zhai Z, Liu J, et al. Estimating industrial and domestic environmental releases of perfluorooctanoic acid and its salts in China from 2004 to 2012. *Chemosphere*, 2015, 129: 100–109
- 49 Zhu C H. FC-80 chromium for inhibitor (in Chinese). *Plating Finishing*, 1985, (2): 28–30 [朱楚汉. FC-80 铬雾抑制剂. *电镀与精饰*, 1985, (2): 28–30]
- 50 Wang S, Huang J, Yang Y, et al. First report of a Chinese PFOS alternative overlooked for 30 years: Its toxicity, persistence, and presence in the environment. *Environ Sci Technol*, 2013, 47: 10163–10170
- 51 Wei S, Chen L Q, Taniyasu S, et al. Distribution of perfluorinated compounds in surface seawaters between Asia and Antarctica. *Mar Pollut Bull*, 2007, 54: 1813–1818
- 52 Chu S, Wang J, Leong G, et al. Perfluoroalkyl sulfonates and carboxylic acids in liver, muscle and adipose tissues of black-footed albatross (*Phoebastria nigripes*) from Midway Island, North Pacific Ocean. *Chemosphere*, 2015, 138: 60–66
- 53 Lebreton L, Slat B, Ferrari F, et al. Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic. *Sci Rep*, 2018, 8: 4666

- 54 Guruge K S, Taniyasu S, Yamashita N, et al. Occurrence of perfluorinated acids and fluorotelomers in waters from Sri Lanka. *Mar Pollut Bull*, 2007, 54: 1667–1672
- 55 Yamashita N, Kannan K, Taniyasu S, et al. Analysis of perfluorinated acids at parts-per-quadrillion levels in seawater using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Environ Sci Technol*, 2004, 38: 5522–5528
- 56 So M K, Taniyasu S, Yamashita N, et al. Perfluorinated compounds in coastal waters of Hong Kong, South China, and Korea. *Environ Sci Technol*, 2004, 38: 4056–4063
- 57 Taniyasu S, Kannan K, Horii Y, et al. A survey of perfluorooctane sulfonate and related perfluorinated organic compounds in water, fish, birds, and humans from Japan. *Environ Sci Technol*, 2003, 37: 2634–2639
- 58 Shao M, Ding G, Zhang J, et al. Occurrence and distribution of perfluoroalkyl substances (PFASs) in surface water and bottom water of the Shuangtaizi Estuary, China. *Environ Pollut*, 2016, 216: 675–681
- 59 Zhang Y, Lai S, Zhao Z, et al. Spatial distribution of perfluoroalkyl acids in the Pearl River of Southern China. *Chemosphere*, 2013, 93: 1519–1525
- 60 Zheng H, Wang F, Zhao Z, et al. Distribution profiles of per- and poly fluoroalkyl substances (PFASs) and their re-regulation by ocean currents in the East and South China Sea. *Mar Pollut Bull*, 2017, 125: 481–486
- 61 Lam J C W, Lyu J, Kwok K Y, et al. Perfluoroalkyl substances (PFASs) in marine mammals from the South China Sea and their temporal changes 2002–2014: Concern for alternatives of PFOS? *Environ Sci Technol*, 2016, 50: 6728–6736
- 62 Li L, Zheng H, Wang T, et al. Perfluoroalkyl acids in surface seawater from the North Pacific to the Arctic Ocean: Contamination, distribution and transportation. *Environ Pollut*, 2018, 238: 168–176
- 63 Young C J, Furdui V I, Franklin J, et al. Perfluorinated acids in Arctic snow: New evidence for atmospheric formation. *Environ Sci Technol*, 2007, 41: 3455–3461
- 64 Rosenberg B, DeLaronde J, MacHutchon A, et al. Spatial and vertical distribution of perfluorinated compounds in Canadian Arctic and sub-Arctic ocean water. *Organohalogen Compd*, 2008, 70: 386–389
- 65 Busch J, Ahrens L, Xie Z, et al. Polyfluoroalkyl compounds in the East Greenland Arctic Ocean. *J Environ Monit*, 2010, 12: 1242–1246
- 66 Gebbink W A, Bossi R, Rigt F F, et al. Observation of emerging per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in Greenland marine mammals. *Chemosphere*, 2016, 144: 2384–2391
- 67 Lescord G L, Kidd K A, De Silva A O, et al. Perfluorinated and polyfluorinated compounds in lake food webs from the Canadian high Arctic. *Environ Sci Technol*, 2015, 49: 2694–2702
- 68 Xie Z, Wang Z, Mi W, et al. Neutral poly-/perfluoroalkyl substances in air and snow from the Arctic. *Sci Rep*, 2015, 5: 8912
- 69 Yeung L W Y, Dassuncao C, Mabury S, et al. Vertical profiles, sources, and transport of PFASs in the Arctic Ocean. *Environ Sci Technol*, 2017, 51: 6735–6744
- 70 Cai M, Yang H, Xie Z, et al. Per- and polyfluoroalkyl substances in snow, lake, surface runoff water and coastal seawater in Fildes Peninsula, King George Island, Antarctica. *J Hazard Mater*, 2012, 209–210: 335–342
- 71 Corsolini S. Industrial contaminants in Antarctic biota. *J Chromatogr A*, 2009, 1216: 598–612
- 72 Bengtson Nash S, Rintoul S R, Kawaguchi S, et al. Perfluorinated compounds in the Antarctic region: Ocean circulation provides prolonged protection from distant sources. *Environ Pollut*, 2010, 158: 2985–2991
- 73 Lohmann R, Jurado E, Dijkstra H A, et al. Vertical eddy diffusion as a key mechanism for removing perfluorooctanoic acid (PFOA) from the global surface oceans. *Environ Pollut*, 2013, 179: 88–94
- 74 Sanchez-Vidal A, Llorca M, Farr M, et al. Delivery of unprecedented amounts of perfluoroalkyl substances towards the deep-sea. *Sci Total Environ*, 2015, 526: 41–48
- 75 Martin J W, Ellis D A, Mabury S A, et al. Atmospheric chemistry of perfluoroalkanesulfonamides: Kinetic and product studies of the OH radical and Cl atom initiated oxidation of *N*-ethyl perfluorobutanesulfonamide. *Environ Sci Technol*, 2006, 40: 864–872
- 76 Ellis D A, Martin J W, De Silva A O, et al. Degradation of fluorotelomer alcohols: A likely atmospheric source of perfluorinated carboxylic acids. *Environ Sci Technol*, 2004, 38: 3316–3321
- 77 Armitage J, Cousins I T, Buck R C, et al. Modeling global-scale fate and transport of perfluorooctanoate emitted from direct sources. *Environ Sci Technol*, 2006, 40: 6969–6975
- 78 Mader B T. Comment on “Aerosol enrichment of the surfactant PFO and mediation of the water–air transport of gaseous PFOA”. *Environ Sci Technol*, 2009, 43: 1232–1233
- 79 McMurdo C J, Ellis D A, Webster E, et al. Aerosol enrichment of the surfactant PFO and mediation of the water–air transport of gaseous PFOA. *Environ Sci Technol*, 2008, 42: 3969–3974
- 80 Wild S J. Investigating input pathways of persistent organic pollutants to Eastern Antarctica. Doctor Dissertation. Doctor Dissertation. Brisbane: Griffith University, 2016

-
- 81 Gomis M I, Wang Z, Scheringer M, et al. A modeling assessment of the physicochemical properties and environmental fate of emerging and novel per- and polyfluoroalkyl substances. *Sci Total Environ*, 2015, 505: 981–991
- 82 Ti B, Li L, Liu J, et al. Global distribution potential and regional environmental risk of F-53B. *Sci Total Environ*, 2018, 640-641: 1365–1371
- 83 Pickard H M, Criscitiello A S, Spencer C, et al. Continuous non-marine inputs of per- and polyfluoroalkyl substances to the High Arctic: A multi-decadal temporal record. *Atmos Chem Phys*, 2018, 18: 5045–5058
- 84 Kallenborn R, Halsall C, Dellong M, et al. The influence of climate change on the global distribution and fate processes of anthropogenic persistent organic pollutants. *J Environ Monit*, 2012, 14: 2854–2869
- 85 Galbán-Malagón C, Berrojalbiz N, Ojeda M J, et al. The oceanic biological pump modulates the atmospheric transport of persistent organic pollutants to the Arctic. *Nat Commun*, 2012, 3: 862
- 86 Sladen W J L, Menzie C M, Reichel W L. DDT residues in Adelie penguins and a crabeater seal from Antarctica. *Nature*, 1966, 210: 670
- 87 Fraser C I, Morrison A K, Hogg A M, et al. Antarctica’s ecological isolation will be broken by storm-driven dispersal and warming. *Nat Clim Change*, 2018, 8: 704–708
-

补充材料

表 S1 文献中全球各大洋及相关水域水体中 PFASs 浓度分布特征汇总

本文以上补充材料见网络版 csb.scichina.com. 补充材料为作者提供的原始数据, 作者对其学术质量和内容负责.

Summary for “全氟/多氟烷基化合物在全球海洋水体中的污染演变趋势研究进展”

The distribution of per- and poly-fluoroalkyl substances in the global marine water

Qian Xiang, Guoqiang Shan, Wei Wu & Lingyan Zhu*

Tianjin Key Laboratory of Environmental Remediation and Pollution Control, Key Laboratory of Pollution Processes and Environmental Criteria of Ministry of Education, College of Environmental Science and Engineering, Nankai University, Tianjin 300350, China

* Corresponding author, E-mail: zhuly@nankai.edu.cn

Per- and poly-fluoroalkyl substances (PFASs) are a family of artificial organic compounds with at least one hydrogen atom along the carbon backbone substituted with fluorine. They are widely used as surfactants and additives in industries including electroplating, firefighting, coating, textile and so forth because they are chemically and thermally inert and both hydrophobic and oleophobic. PFASs are ubiquitous in various environmental matrix and have caused great concerns on their global transport and adverse impacts on environment. Hence, perfluorooctane sulfonate acid (PFOS) and related substances were listed under Annex B of the Stockholm Convention in 2009. In the recent two decades, an increasingly variety of PFASs are found in the environment (e.g., shorter-chain PFAAs, fluorotelomers, perfluoropolyethers, perfluoroalkyl phosphonic acids, perfluoroalkyl phosphinic acids, polyfluoroalkyl phosphate esters, chlorine or hydro substituted polyfluoroalkyl substances, etc.). They occur not only in inland areas but also in oceans and seas, even in remote areas such as polar areas. This prompts the necessity to figure out the fate of PFASs all over the world. Regarded as one of the crucial sinks of pollutants, oceans and seas play a pivotal role in PFASs transport in the environment. Researches on the marine pollution of PFASs are increasing in the recently years. In this paper, we summarized the recent researches on the spacial and temporal trends of legacy and emerging PFASs in the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and the Southern Ocean from 2002 to 2016, respectively. We also summarized the researches on the occurrence of PFASs in water at different depths in the middle of the Atlantic Ocean, in the south and northwest of the Pacific Ocean, in the Southern Ocean and in the Arctic Ocean, respectively. The results indicate that a variety of emerging PFASs as substitutes of legacy PFASs are being detected in the oceans, and they are transported from offshore areas to remote areas via currents. The concentrations of PFASs in the seawater decrease gradually with the distance from the coast increasing. The PFASs in the surface seawater of the Arctic Ocean are mainly derived from the North Atlantic Ocean via currents and the degradation of PFASs precursors via atmospheric transport. The occurrence of PFASs in the deep seawater implies that the global thermocline and/or halocline circulation influences the three dimensional transport of PFASs in the oceans and seas. The PFASs transport globally via the following pathways: (1) long-range atmospheric transport (LRAT) plus degradation and precipitation for neutral PFASs precursors; (2) currents and thermocline and/or halocline circulation for ionic PFASs; (3) marine aerosols for perfluorooctanoate; (4) food chain and migratory biota acting as biovectors. In future, more attention should be paid on PFASs in the Indian Ocean and the Southern Ocean, where there is a large data gap on the occurrence of PFASs, which hampers understanding of global transport of PFASs via seas and oceans. Further researches are warranted on the emerging PFAS pollutants in seawater in seas and oceans giving that they are increasingly produced and applied globally.

per- and poly-fluoroalkyl substances, oceans, surface seawater, deep sea water, oceanic currents

doi: 10.1360/N972019-00033